بسته بندی جدید محصولات

برای اولین بار دارای QR کد روی بلیستر و جعبه

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

کارتن پلاست شامل سه سینی ۶۴ جعبه = ۱۹۲ جعبه



سینی شامل ۶۴ جعبه کپسول ۲۰ عددی

با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید

جعبه کپسول ۲۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه



سینی شامل ۵۲ جعبه کپسول ۳۰ عددی

با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید

جعبه کپسول ۳۰ عددی

کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه

سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰عددی

با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید

جعبه قرص ۱۰۰عددی

کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰عددی

با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید

جعبه قرص ۱۰۰عددی

www.marhamdaruco.ir

فهرست

صفحه	
	Oncology
15	Agryplete
	Anesthetics
12	Hisulin
	Cardiology
دو جلد	Delcor
پشت جلد	Arbicor
سه جلد	Pyasidin
29	Pozzarex
	Dental
30	Hexomex
	Endocrine
24	P-Bran
26	Metformin
36	Empajent
	Food Suppriment
5	Cyctine b6 zinc
7	Zinc Plus
9	Renal aid
17	Liposofer
21	Pedilact
27	Vitamin C

صفحه	
	Gastrology
22	Mebendazole
	Neurology
1	Gabapentin
3	Phenobarbital
11	Repizapin
23	Chlordiazepoxide
	Ophthalmology
روی جلد	Xiloial
	Respiratory System
19	Sinkast
	Urology
10	Detrolit

Phenobarbital

- Sedative
- Anticonvulsant
- Enzyme Inducer
  (P450, in neonatal hyperbilirubinemia)

شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

یادداشت

افسردگی چیست؟

علل، علائم و روش‌های درمان

افسردگی، یک اختلال شایع اما جدی در جامعه امروز است. این اختلال منجر به برهم خوردن زندگی طبیعی فرد و ایجاد احساسات منفی مانند غم، اضطراب، ناامیدی و عصبانیت در فرد می‌شود. افسردگی بر فکر، احساس و عمل فرد تأثیر گذاشته و زندگی وی را مختل می‌کند. درصورتی‌که علائم شایع افسردگی بیش از دو هفته در فرد ادامه داشته باشد بهتر است که به متخصص اعصاب و روان مراجعه کرده و درخواست کمک کند. مهم است که افراد دچار افسردگی بدانند که علائم و احساسات فعلی آن‌ها تنها به خاطر بیماری‌شان هستند و نه خود واقعی آن‌ها. مهم نیست که چقدر احساس ناامیدی، یاس و افسردگی می‌کنید؛ با درک علل و درمان آن می‌توانید اولین قدم برای داشتن احساس بهتر و غلبه بر مشکلات را بردارید.

احساس ناامیدی و غم در برخی مواقع، جزوی از زندگی طبیعی انسان است اما وقتی عواطفی مانند ناامیدی و ترس با گذشت زمان در فرد از بین نروند و تشدید شوند ممکن است فرد دچار افسردگی شود. افسردگی نه‌تنها باعث داشتن احساس غم و اندوه در تمامی مراحل زندگی فرد می‌شود بلکه توانایی وی در پاسخ به مشکلات زندگی، انجام فعالیت‌های روزانه و عملکرد جسمی و عقلانی را تحت‌الشعاع قرار داده و در خوردن، خوابیدن و لذات زندگی فرد اخلال ایجاد می‌کند تا حدی که حتی گذراندن یک روز معمولی نیز برای وی سخت و طاقت‌فرسا می‌شود. درحالی‌که برخی افراد افسردگی را تحت عنوان «زندگی در سیاه‌چاله» یا داشتن عذاب همیشگی تفسیر می‌کنند برخی احساس بی‌جانی، خالی بودن و بی‌تفاوتی می‌کنند. افسردگی ممکن است منجر به عصبانیت و بی‌قراری شده و میزان طاقت افراد در برابر مشکلات را بسیار کم می‌کند. در صورت عدم درمان، افسردگی ممکن است منجر به بروز اختلالات شدید جسمی و روحی در فرد شود.

انواع افسردگی و میزان شدت آن

افسردگی به اشکال و فرم‌های مختلفی درمی‌آید. در حالیکه تشخیص افسردگی پیچیده است، دانستن این‌که بیمار به کدام نوع افسردگی مبتلا شده است به مدیریت علائم توسط متخصص و ارائه بهترین راهکار کمک شایانی می‌کند. انواع افسردگی بر اساس نوع و شدت عبارتند از:

افسردگی خفیف تا متوسط

افسردگی خفیف، شایع‌ترین نوع افسردگی است. این نوع از افسردگی می‌تواند در زندگی روزمره فرد اختلال ایجاد کرده و شادی و انگیزه فرد را از بین ببرد. این علائم معمولاً برای افسردگی متوسط، شدت بیش‌تری پیدا کرده و به کاهش اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس بیمار منجر می‌شود.

افسردگی دوره‌ای مزمن (کج‌خلقی یا دیستایمی)

دیستایمی نوعی افسردگی مزمن ولی درجه پایین است. در این مدل از افسردگی، فرد معمولاً احساس خفیف و دائمی افسردگی را داشته و گاه‌به‌گاه نیز علائم آن کاملاً برطرف می‌شود. علائم افسردگی دیستایمی شدید نیست اما دوره ابتلای آن طولانی است (۲سال یا بیشتر). در این مدل از افسردگی، علائم به‌گونه‌ای با زندگی فرد آمیخته می‌شوند که فرد حس می‌کند بی‌حال و بی‌حوصله بودن جزوی از شخصیت وی است و همیشه روحیه ضعیفی داشته است. برخی افراد در کنار افسردگی‌های دوره‌ای ممکن است دچار افسردگی مضاعف نیز شوند که در صورت عدم درمان ممکن است هر دوره از افسردگی مزمن تا ۶ ماه نیز افزایش یابد.

ادامه دارد...

Cystine B6 Zinc

Supplement

سیستین ب ۶ زینک

مکمل

ال – سیستین: این ترکیب از اجزای ضروری در ساختار مو (۱۸%)، ناخن(۱۴%) و پوست (۲-۴%) می‌باشد. ال - سیستین به کراتین مو و ناخن متصل می‌شود. این اتصال سبب تسریع تکثیر این سلول‌ها شده و تاثیر مثبتی بر رشد مو و ناخن دارد.

ویتامین ب ۶: این ترکیب به اتصال ال - سیستین به ناحیه دارای کراتین کمک می‌نماید.

ال – آرژنین: این ترکیب یک آمینو اسید است که با غلظت بالا در فولیکول‌های فعال مو یافت می‌شود. ال - آرژنین در کنار ال - سیستین باعث تکمیل اثر آن می‌گردد.

زینک: این ترکیب برای تشکیل کراتین مو مورد نیاز است. علاوه برآن آنزیم‌هایی که باعث ریزش مو می‌شوند را مهار می‌کند.

رامو فارمین

شرکت داروسازی **راموفارمین**

کلام برتر

مدیریت برند Brand Management

نکات مهم در مدیریت برند را بیاموزید!

Dr. Kamran Sehat
DBA in marketing from London,
www.SehatLearning.ir
info@SehatLearning.ir
021 880 29 922
09121008545

پنج استراتژی مهم برای دستیابی به یک برند جهانی موفق (ادامه از شماره قبل)

۲-در بازاریابی بی حد و مرز رفتار کنید.

با توسعه رسانه های دیجیتالی دیگر پس از این امکان بکارگیری استراتژی های مختلف برای برندها در راستای پیشرفت در سطح جهان وجود خواهد داشت. درشرایط کنونی برندها ملزم به اجرای یک روش بازاریابی منسجم تر برای بقای خود هستند.

فعالان در بازار باید نگاهی دوباره به واژه جهانی شدن داشته باشند. ایده تفکر جهانی و فعالیت در داخل کشور در عصر دیجیتال کنونی دیگر کاربرد ندارد. عصر دیجیتال حد و مرز نمی‌شناسد.

برندهایی که استراتژی تجارت بی حد و مرز را نمی‌پذیرند باید خطر در حاشیه قرار گرفتن را قبول کنند. مردم کمتر از قبل از مرز بین المللی آگاهی دارند. رسانه های دیجیتالی حد ومرز نمی‌شناسند بنابراین برندهایی که از این طریق فعالیت می‌کنند احساس نفوذ بیشتری کرده و خود را بخشی از جهان می‌دانند.

با نگاهی به برندهایی نظیر نایک، آدیداس، کوکا کولا و مک دونالد درمی‌یابید که آنها در همه جای جهان شعبه داشته و علی رغم دستیابی به موفقیتی بزرگ در کشور خود، در بازارهای جهانی نیز اسم ورسمی دارند.

تبلیغات جدید نایک برای لباس های بازی فوتبال همزمان با برگزاری جام جهانی یک نمونه عالی از بازاریابی جهانی به حساب می‌آید. در این تبلیغات شرکت نایک فوتبالیست های معروف از سرتاسر جهان را گرد هم آورده و از آنها استفاده می‌کند. این کار چند ملیتی بودن نایک را اثبات نمی‌کند بلکه آن را به عنوان یک برند بین‌المللی معرفی خواهد کرد.

سابقن یک برند می‌توانست جمعیت هدف خود را فقط مردم یک کشور خاص در نظر بگیرد اما امروزه هر کسی می‌تواند از طریق اینترنت به سایت یک برند معروف دسترسی یابد. این امکان برندهای مختلف را به این فکر وامی‌دارد که چگونه می‌توانند به بازارهای بین‌المللی راه پیدا کنند.

تمرکز برندهای جهانی امروزه از طبقه بندی به یکسان سازی تغییر رویکرد داده است. به جای تلاش برای تقسیم بندی مصرف‌کنندگان برندها باید به راههایی برای ایجاد نقاط مشترک میان آنها بیاندیشند. در سال های دور بازاریابی به تفاوت ها و دسته بندی ها می‌اندیشید. در دنیای امروز توجه برندها به دغدغه‌های مردم این اختلاف ها را از بین خواهد برد.

۳-یک مرکز در داخل کشور برای خود ایجاد کنید.

نیاز به تشکیل یک سیستم بازاریابی متحد هم‌اکنون بیشتر از همیشه احساس می‌شود. اعمال استراتژی پوشش دادن تمام بازارها توسط یک برند جهانی یک نوع ارتباط بین‌المللی به وجود می‌آورد. فقط ارائه یک استراتژی خاص نمی‌تواند تضمینی برای موفقیت یک برند باشد. مدیران برندها باید احساس کنند که شانسی برای اجرای آن و بحث پیرامون این سیاست به ویژه شخصا با دیگر روسای برند را دارند. به طور خلاصه آنها بایدیک نوع احساس مسئولیت و مالکیت مشترک را با دیگر مدیران برد داشته باشند. برندهای جهانی موفق چند وقت یک بار تمام مدیران مراکز بین‌المللی خود را از سرتاسر جهان دور هم جمع کرده و این امکان را برای آنها فراهم می‌کنند تا چکیده بهترین روش‌ها، اطلاعات و دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند.

ادامه دارد...

Zinc Plus®

Zahravi
B-Complex

Beautiful Skin

Healthy Hair

- جبران کمبود روی در بدن
- تامین ویتامین های گروه B
- حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن

60 Soft gelatin capsules

Each capsule contains :

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1. 6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg

Strong Nails

5mg Zinc

Zahravi Pharmaceutical Company
Tel & Fax: (+98) 2144993193
WhatsApp: (+98) 9026080548

ZAHRAVI PHARMACEUTICAL CO.
شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

گردآوری

مروری بر تاریخچه صنعت داروسازی ایران و جهان و آشنایی با معروفترین کارخانجات تولید دارو در جهان

تاریخچه امتحان اطباء و داروسازان و داروفروشان

آنچنان که در قبل از قلم دکتر علی پرتو گفته شد، دارودهی و شفابخشی از ورای جم مرکز خلافت جمشید شروع گردیده است و این سرزمین نخستین جایگاه این دانش و محل آموزش به داوطلبان بوده است. از همان زمان پادشاهان به این نکته پی برده بودند که اگر کسی بخواهد در بیماری و تندرستی مردم دخالت داشته باشد، باید صلاحیت کامل داشته باشد و از این رو قانونی گذراندند تا افراد ناصالح به این مهم نپردازند و آن قانون بدینگونه بود که هر کس از آریان ها بخواهد پیشه خود را پزشکی یا جراحی قرار دهد، می باید پیش از اینکه به معالجه یکی از بومی ها و یا همشهری ها بپردازد، دستورهای خود را در سه نفر از دیوها تجربه نماید. اگر پس از سومین آزمایش، هر سه نفر درمی گذشتند، داوطلب پزشکی تا پایان عمر از این پیشه برکنار می شد و اگر مجدداً دست به این کار می زد، سخت مجازات می شد. در دوره ساسانی، اجازه طبابت به افرادی داده می شد که مدتی نزد اطباء دانشگاه جندی شاپور خدمت می کردند و پس از مدت‌ها خدمت حق طبابت و اشتغال به داروفروشی را کسب می کردند. ولی بیشتر این داروفروشان به طور رسمی طبابت می کردند و در حقیقت حد و مرزی برای پزشکان و داروسازان آن زمان وجود نداشت.

برای اولین بار در مورد داروسازان در زمان خلافت معتصم فرزند هارون الرشید، امتحان گرفته میشد. علت وجود امتحان در آن زمان بدین گونه بود که داروسازان و داروفروشان بدینگونه عمل می کردند که هر که را هر چه خواست، می دادند. اعم از آنکه آن دارو را داشته باشند یا نداشته باشند.

امتحان بدین صورت بود که نامی خیالی را خلیفه در نظر می گرفت و مأموران به نزد داروسازان و داروفروشان می رفتند آن نام را به عنوان دارویی به کار میبردند و درخواست دارو می کردند. عده ای می گفتند که از این دارو بی اطلاع هستند که این افراد حق ادامه داروفروشی را داشتند ولی عده ای دیگر ادعای آشنایی با داروی فرضی را می‌کردند و چیزی نامعلوم به فرستاده خلیفه می دادند و این افراد دیگر حق ادامه داروفروشی را نداشتند.

در مورد اطباء نیز در زمان خلافت مقتدر عباسی (-۳۲۰ -۲۹۵ ه ق) سنان بن ثابت بن قره حرانی صامی که رئیس بیمارستان سیده بغداد بود، از طرف خلیفه مأمور شد که از اطباء امتحان به عمل آورد و این امتحان به دلیل وقایع ناگواری که رخ داده بود، توسط سنان به عمل می آمد.

این امتحان نیز به نوبه خود دارای اشکالاتی بود که یک نمونه آن بدین صورت است که مردی در لباس پاک و هیئتی باوقار در مجلس امتحان سنان وارد می شود و کاغذی که حاوی چند دینار بود، جلوروی سنان قرار داد و گفت: از نوشتن و خواندن عاجزم و به سنان گفت امیدوارم قطع معاش من و عیال و اولادم را روا نداری. سنان به او گفت مانعی ندارد، به شرط آنکه در مورد بیماران آنچه را که می دانی عمل نکنی و مرد به سنان قول داد که از دادن سکنجبین و شربت تجاوز نکند.

با تمام این اشکالات می توان گفت که از زمان خلیفهٔ المقتدر به سال ۲۹۵ هجری، امر طبابت و داروفروشی تحت قاعده و ضابطه خاصی قرار گرفت.

ادامه دارد...

Come along with

RozaVit

Keep Pace With *All Changes*

Renal aid

Multivitamin & Zinc for ***Kidney Patients***

Supplement Facts: Serving size: 1 Tablet

Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

***RDA:** Recommended Daily Allowance, **mg:** milligram, **µg:** micrograms

RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since:1963
Quality is our ***Commitment***

ارتباط با ما:
Rozavit.ir
تماس: ۸۲۷۱۱-۰۲۱

Detrolit® ER

Tolterodin Tartrate 2, 4mg

- **Significant reduction in urinary leakage and urgency nocturia**
- **Easily tolerated by geriatric patients**
- **Lower incident of dry mouth compared to immediate release forms**
- **Convenient once daily use**
- **Indicated in patients with severe renal dysfunction (CrCl > 10mL/min)**

tekaje

Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

Repizapin®

Mirtazapine

7.5, 15, 30, 45 mg

- Effective treatment in major depression with insomnia or restlessness
- Sexual adverse effects equal to placebo (less than SSRIs)
- More rapid onset of action compared to SSRIs and SNRIs
- Sleep, energy and appetite improvement within the first 1-2 weeks
- Fewer cardiovascular adverse effects compared to Trazodone

tekaje

Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6

@tekajeco

www.tadbirkala.ir

LOGHMAN
PHARMACEUTICAL & HYGIENIC CO.

Wisdom of Health

Since 1967

Xypident®
(Lidocaine/Epinephrine)

Hisulin®
(Human Insulin)
RECOMBINANT DNA ORIGIN

Biotech Injectable liquid Vial form

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی(سهامی عام)

حکمت سلامتی

تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین‌و پنم‌ها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مصلی امام خمینی(ره)، سالن F ، غرفه F/138

www.loghmanpharma.com

آناگرلید کپسول ۰/۵ و ۱ میلی گرمی

آناگرلید از جمله داروهای آنتی پلاکت و مهارکننده آنزیم فسفودی استراز ۳ می باشد.
این دارو برای کاهش تعداد پلاکت های افزایش یافته در بیماران در معرض خطر Essential Thrombocythemia که به درمان فعلی خود عدم تحمل دارند یا افزایش تعداد پلاکت ها با درمان فعلی آن ها به سطح قابل قبولی کاهش نمی یابد، تجویز می شود.

مکانیسم اثر:

آناگرلید، فسفودی استراز حلقوی نوکلئوتیدی و آزادسازی اسید آراشیدونیک از فسفولیپاز را، احتمالاً با مهار فسفولیپاز A2، مهار می‌کند. همچنین وابسته به دوز باعث کاهش تولید پلاکت می‌شود که ناشی از کاهش megakaryocyte hypermaturation است. (مرحله بلوغ پس از میتوتیک را مختل می‌کند.)

جایگاه در درمان:

برای درمان Essential Thrombocythemia تجویز هیدروکسی اوره و آسپرین نسبت به آناگرلید ارجحیت دارد. با این وجود امکان بروز مشکلات عفونی، لکوپنی و کم خونی در افرادی که هیدروکسی اوره مصرف می‌کردند شایع تر می باشد، در حالی که حوادث قلبی (مانند فشار خون بالا، تپش قلب، تاکی کاردی) در افرادی که آناگرلید مصرف می کردند شایع تر می باشد.همچنین در مطالعه‌ای روی ۷۹ بیمار مبتلا به ET، درمان با آناگرلید منجر به کاهش قابل‌توجه در تعداد پلاکت‌ها و همچنین کاهش عوارض ترومبوآمبولیک شریانی و وریدی عمده و جزئی شد. حدودا یک چهارم بیماران مبتلا به ET که تحت درمان با هیدروکسی اوره هستند مقاومت یا عدم تحمل نشان می دهند، خط بعدی درمان استفاده از یک داروی non-leukemogenic مانند آناگرلید می باشد.

آگریپلت®

AGRYPLETE®

Anagrelide 0.5mg / 1mg

برای اولین بار در ایران

موثرترین دارو در کاهش تعداد پلاکت

بهترین جایگزین هیدروکسین اوره

بهترین انتخاب برای درمان درازمدت در بیماران جوان

پارس دارو

پیشرو و متمایز

صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳ pars_darou parsdarou.ir

شیرینی یک قطره

لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقرآهـــن و آنمی ناشـــی از آن در کودکـــان

Help your child breath easier with:

SINKAST® (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having astma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children as young as six months old and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children over age 2.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- Sinkast is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of Sinkast did not change with long-term use.
- Sinkast has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that Montelukast oral granules does not affect the growth rate of pediatric patients.

Sinkast®

14 Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

Help
Your
Child
Breathe

Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



مهـــر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰

* درمان کرمک ، کرم‌های شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار
* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز
*عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده

www.mehrdarou.com

پی برن®

- ملین حجمی گیاهی
- کاهش دهنده اشتها
- کمک درمان چاقی
- کمک به کاهش کلسترول

دینه

QMS ISO 9001: 2015 ISO 10002: 2014 ITALIA ISO 10004: 2012

DINEH

DINEHIRAN.COM

P-Bran

پی-برن ملین گیاهی مؤثر و بی ضرر، سرشار از فیبر گیاهی خوراکی غیر قابل جذب پوسته گندم و پوسته پسیلیوم است، این فرآورده جهت مصرف با مایعات فرموله شده است و نوشیدن آن به صورت مخلوط با مایعات، مطبوع است و عبور آن از مری به راحتی صورت می‌گیرد. پی-برن با دارا بودن درصد بالای فیبرهای خوراکی، پس از جذب آب در معده، متورم می‌شود و بخشی از معده را پر می‌کند، که این امر باعث کاهش احساس گرسنگی می‌گردد. از طرف دیگر این افزایش حجم، آنزیم‌های معدی را رقیق می‌کند و با جلوگیری از واکنش ماده غذایی با آنزیم‌ها موجب افزایش ماندگاری مواد و طولانی‌تر شدن احساس سیری می‌گردد، و از طریق این دو مکانیسم به روشی کاملاً طبیعی با کاهش مصرف مواد غذایی می تواند در رژیم‌های لاغری همراه با ورزش‌های مناسب، نتایج مطلوب ظاهر نماید. پی-برن به علت وجود پوسته پسیلیوم و پوسته گندم، با جذب آب و افزایش حجم مدفوع، موجب تحریک حرکات دودی روده می‌گردد و ضمن کاهش زمان عبور به علت افزایش حجم، به عنوان ملین حجمی مؤثر و ایمن، عمل دفع را تسهیل می‌کند. به علاوه ترکیباتی مانند اسیدهای صفراوی و سموم را جذب و خارج می‌نماید. این فرآورده نه تنها در درمان یبوست بلکه در رفع سایر بی نظمی‌های دستگاه گوارش، مانند دیورتیکول روده بزرگ و سندروم روده تحریک پذیر (IBS) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

DINEH
DINEHIRAN.COM

دینه
QMS ITALIA ISO 9001: 2015 ISO 10002: 2014 ISO 10004: 2012

Metformin 500

Diabetes care, today more than ever

Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran

مهر دارو
مهر سلامتی

به وقت ویتامین C

بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی

تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵

www.mehrdarou.com

Pozzarex®

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy): 25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment (GFR < 60 ml/min/1.73 m^2)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hypernatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled Blood Pressure

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25 mg

50 mg

PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

سلامتی را با رایحه خوش تجربه کنید

- ضد عفونی کننده دهان
- تقویت کننده مینای دندان
- پیشگیری از پوسیدگی دندان
- ایجاد تازگی و طعم خوشایند در دهان
- تنوع در طعم و رایحه

info@shaharedaru.com
www.shahredaru.com

داروسازی شهردارو
Shahre Daru Pharmaceutical

مگافن®

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم

مگافن®
۳۲۵

- تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط
- **ترکیبات:**
  استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم

مگافن®
۵۰۰

- تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط
- **ترکیبات:**
  استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

مگافن®

با مگافن
دلیلی برای تحمل درد نیست

megafen.ir
www.megafen.ir

گزینه برتر

سوال اول:

کـودک ۶ سـاله افغانی بـه علت ضعف اندامها به بیمارسـتان آورده شـده اسـت.ضعف وی از ۳ روز پیـش از اندامهای تحتانـی شـروع شـده و در عرض ایـن مدت بـه اندامهای فوقانی گسـترش پیدا کرده اسـت.

در معاینـه اختـلال حسـی عمقـی و از بیـن رفتـن رفلکسـهای تاندونی دیده مـی شـود.کودک ۲ ماه قبـل به علت گلـودرد و وجـود مامبـران کاذب در حلـق تحـت درمان هـای مختلف قـرار گرفت.

تشخیص چیست؟

۱- نوروپاتی دیفتری

۲- سندرم گیلن باره

۳- نوروپاتی دارویی

۴- نوروپاتی جذام

سوال دوم:

دختر ۲۰ ساله ای به دلیل پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک قرار است تحت عمل جراحی اسپلنکتومی قرار گیرد. میزان پلاکت وی در آزمایشات شب قبل از عمل ۲۵۰۰۰ در میلیمتر مکعب می باشد. در معاینه غیر از علایم ظاهری کوشینگ ناشی از کورتیکوتراپی و تعدادی پورپورا در زانوی سمت نکته ای ندارد.در آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی کدام اقدام صحیح است؟

۱- اصلاح پلاکت شب قبل از عمل

۲- اصلاح پلاکت بلافاصله قبل از عمل

۳- تزریق FFP قبل از عمل

۴- نیاز به اقدام خاص ندارد.

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱ج،۲ب.

لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)

دکتر فاطمه علوی لنگرودی


IR-MCI
13:03
46%
entk_bartar 9+
92
Posts
11K
Followers
59
Following
کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation
Edit Profile
Promotions
Insights
Contact
New
خدمات ویژه
سوختگی
صرع
TOMS
APOTEX

entk_bartar

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شماره پروانه:۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیربازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیرمالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح گرافیک:** علیرضا دریغ

- **همکاران مجله:**

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیا، دکتر مهران زمان‌زاده، دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفا جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.

مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.

جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.

پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.

پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.

پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد۱
تلفن:۲۶۴۰۳۱۵۴-۲۶۴۰۳۹۹۴-۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

بنیان سلامت کسری
www.bskco.ir

پورسینا
www.pursinapharma.com

پارس دارو
www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم
www.tadbirkala.ir

تولید دارو
www.toliddaru.ir

داروسازی عبیدی
www.abidipharma.com

روز دارو
www.rouzdarou.com

راموفارمین
www.ramopharmin.com

رازک
www.razakpharma.com

زهراوی
www.zahravi.com

زیست تخمیر
www.zisttakhmir.com

شهر دارو
www.shahredaru.com

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

لقمان
www.loghmanpharma.com

مصون دارو
www.masoondarou.com

یاس دارو
www.yasdaru.co.ir

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- کاهنده عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- افزایش پذیرش درمان در بیماران
- مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا