



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



صفحہ

20	Antibiotic
	Zithrotrex
	Cardiology
سہ جلد	Brilavus
3	Natamide
26	Bizopex
دو جلد	Valzo family
1	Ropixon
36	Xalerban
پشت جلد	Elaquit
15	Pozzarex
	Endocrine
5	Lirenta
	Erectile
روی جلد	Viagra-SDF
	Food suppiement
25	Hematofer

صفحہ

18	Novofer
7	B-complex
9	Nephrotonic
	Herbal
28	Curcumin
	Nasal
16	Rinosaltin
12	Mintonex
	Neurology
10	Agoleep
11	rezamelt
	Oncology
22	Eximex
23	Nolvamon
	Psychology
14	Herbicalm



24 HOURS UNDER CONTROL

“Extended Release Formulation ”

- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**

- Natriuretic diuretic effect
- Calcium antagonist-like vasorelaxant activities

- **Extended release**

- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**

- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**



غذاهای سالم برای مدیریت دیابت

به گفته‌ی انجمن دیابت آمریکا، اکثر افراد حتی حداقل مقدار توصیه شده‌ی فیبر را که برای زنان ۲۵ گرم و برای مردان ۳۸ گرم در روز است را مصرف نمی‌کنند. برخی از افراد مبتلا به دیابت ممکن است به خوردن گلوتن که در برخی غذاهای پر فیبر وجود دارد مانند نانهای تهیه شده از چند غله، حساسیت داشته و با هضم آن مشکل داشته باشند. آنها می‌توانند به جای آن از سایر کربوهیدراتهای فیبردار مانند: سیب زمینی شیرین، کینوا، گندم سیاه، لوبیا، حبوبات، نخود سبز و ذرت استفاده کنند. بسیار مهم است که از فیبر موجود در میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات در این برنامه ۷ روزه دیابتی استفاده شود، زیرا مصرف فیبر موجب کند شدن روند هضم و کاهش خطر ابتلا به مشکلات وعوارض اصلی نظیر بیماری قلبی و سرطان می‌شود. شما می‌توانید از مقدار محدودی چربیهای غیراشباع با یک پیوند دوگانه، مانند روغن زیتون یا کانولا و آووکادو و یا روغن‌های غیراشباع با چند پیوند دوگانه، نظیر روغن کنجد یا روغن انواع آجیل‌ها برای تهیه‌ی غذاهایی نظیر ماهی یا سبزیجات استفاده کنید.

شمارش کربوهیدرات‌ها روش موثر دیگری است که برای طراحی برنامه‌ی غذایی افراد دیابتی بکار می‌رود، در این روش بیماران با کمک یک متخصص تغذیه مقدار کربوهیدراتی را که می‌توانند بطور ایمن در هر روز استفاده کنند، شمارش کرده و مقدار صحیح کربوهیدراتی را که می‌توانند در هر وعده‌ی غذایی میل کنند، تعیین می‌کنند. نشانه‌ها را جدی بگیرید

نشانه‌های افت قند؛ رنگ پریدگی، لرزش، تغییر در خلق، عصبانیت، تاری دید و گرسنگی است که اگر ادامه پیدا کند ممکن است کودک را تا مرز تشنج یا کما برساند. افت قند خون به طور ناگهانی ظاهر می‌شود. ممکن است کودک تان در حالی که مشغول فوتبال بازی کردن است قندش به یک باره پایین بیاید و حتی ممکن است نیمه شب و به دور از چشمان شما دچار افت قند شود و به یکباره از خواب بپرد.

نتایج پژوهش‌های موجود حاکی است که استعداد، فراگیری و دیگر توانایی‌های دانش‌آموزان دیابتی با سایر دانش‌آموزان تفاوتی ندارد اما زندگی افراد دیابتی به دلیل دیابت وجود دستورات درمانی، از محدودیت خاص خود برخوردار است، اگر اولیای مدارس و دانش‌آموزان اطلاعات کافی در مورد دیابت داشته باشند، شرایط برای دانش‌آموزان دیابتی مناسب‌تر خواهد شد.

اولیای مدرسه و همکلاسی‌ها باید بدانند یک کودک یا نوجوان دیابتی در بین ایشان است، به همین دلیل لازم است اطلاعات کافی درباره دیابت و علائم آن، به خصوص «هیپوگلیسمی یا کاهش قند خون» و چگونگی درمان آن داشته باشند. علاوه بر این، اولیای محترم مدرسه باید درک کنند یک فرد دیابتی در زمان‌های مشخص، نیاز به تغذیه و یا رفتن به دستشویی دارد، حتی حین آموزش در کلاس!

با توجه به شروع سال تحصیلی و تغییر در شیوه زندگی دانش‌آموز دیابتی و پی‌آمد آن، احتمال اختلال در کنترل قند خون فرد دیابتی، توصیه می‌شود والدین تربیتی دهند که هفته آخر شهریور ماه با استفاده از روش شبیه‌سازی حضور در مدرسه، شرایط هفته اول مهر را در خانه بازسازی نمایند تا تغییرات، تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد.



One Dose Fits All



* GFR; Glomerular Filtration Rate



چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم؟

داشتن اعتماد به نفس به شما کمک می کند تا در بسیاری از زمینه های زندگی شخصی و حرفه ای تان موفق باشید. اما بسیاری از مردم با حس اعتماد به نفس پایین خود دست و پنجه نرم می کنند. ممکن است بهبود حس اعتماد به نفس مشکل به نظر آید، اما کارهای بسیار ساده ای وجود دارد که می توانید آنها را انجام دهید، مانند استفاده از تایید مثبت خویشتن، مبارزه با افکار منفی، و سعی در انجام کارهای جدید. برای یادگیری بیشتر در مورد چگونگی بدست آوردن اعتماد به نفس، مقاله زیر را مطالعه نمایید.

روش اول: ترکیب عادات مفید

۱- از افکار و باورهای منفی خود آگاه باشید.

برای ایجاد حس اعتماد به نفس، شما باید به برخی از افکار و باورهای منفی خود توجه کنید. یک دفتر یادداشت روزانه انتخاب کنید تا بتوانید هرگونه افکار و باور منفی خود که در طول روز به ذهنتان خطور می کند، را یادداشت نمایید. آنگاه به آنچه که نوشته اید نگاه کرده و سعی کنید بفهمید که این افکار و باورها از کجا سرچشمه می گیرند. در نظر داشته باشید که به آنچه که فکر می کنید ممکن است شما را به داشتن اینگونه افکار و باورها مجبور کند.

۲- خود را تشویق کنید.

تاییدهای مثبت روزانه می تواند به شما در بهبود اعتماد به نفستان کمک کند. هر روز چند دقیقه ای زمان صرف کرده، در آینه نگاه کنید و به خود چیزهایی بگویید که باعث تشویقتان می شود. همچنین می توانید به خودتان چیزهایی بگویید که در مورد آنها نسبت به خود باور دارید یا می خواهید باور داشته باشید. این کار به شما کمک می کند که تاییدهای خود را نوشته و آنها را در جایی قرار دهید که اغلب به آنجا نگاه می کنید، مانند درون کیف پول یا صفحه خوشامدگویی تلفن همراهتان. چند مثال از تاییدهای مثبت خود به شرح زیر است:

a. من باهوش هستم.

b. من پدر خوبی هستم.

c. من کار های مهم زیادی در زندگی ام انجام داده ام.

d. مردم از وقت گذراندن در کنار من لذت می برند.

۳- یاد بگیرید خود را ببخشید.

افرادی که دارای اعتماد به نفس پایینی هستند اغلب نسبت به خود بسیار عیب جو هستند. یک روش که می توانید به واسطه آن بر حس انتقاد کننده درونی خود غلبه کنید، این است که یاد بگیرید چگونه خود را هنگام اشتباهات ببخشید، درست مانند اینکه دوست خود را می بخشید.

• دفعه بعدی که شما مرتکب اشتباهی می شوید، نفس عمیقی کشیده و از سرزنش و توهین به خود دست بردارید. در عوض، گفتن جملاتی مانند "من اشتباه کردم اما این باعث نمی شود که من آدم بدی باشم" را تمرین کنید.

ادامه دارد...

دکتر کامران صحت

B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential **B** vitamins

60

Soft gelatin capsules



Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



 **ZAHRAVI**
PHARMACEUTICAL CO.

B
Vitamin

SUPPLEMENT

شرکت Roche اعلام کرد که رژیم درمانی شامل داروی Tecentriq آن شرکت در ترکیب با یک داروی قدیمی خودش Avastin و شیمی درمانی، توانست در بیماران مبتلا به سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC) پیشرفت بیماری را کاهش داده و بقای بدون پیشرفت بیماری را افزایش دهد.

داروی TECENTRIQ® (atezolizumab) در حال حاضر، در دو اندیکاسیون تاییدیه دارد: کارسینوم یوروتلیال و نوعی از NSCLC. نام کارآزمایی مورد صحبت IMpower 150 است و این نتایج، در صورت اثبات و اخذ تاییدیه رگولاتورها، می تواند به گسترش اندیکاسیون درمانی Tecentriq و رقابت آن با Keytruda در این حوزه بیانجامد. Roche قصد دارد داده های این مطالعه را به FDA و EMA تسلیم کند. همچنین، اطلاعات بیشتر و جزئیات مطالعه در 'کنگره ایمونو-انکولوژی انجمن انکولوژی پزشکی اروپا' ارائه شد. این مطالعه در سه بازو طراحی و انجام شد:

Tecentriq + Chemo -

Tecentriq + Avastin -

(Avastin + Chemo) Control Group -

آنالیز اعلامی تنها هر یک از دو بازوی درمان را با بازوی کنترل، مقایسه کرده است. در نتیجه، این پرسش وجود دارد که نتیجه درمانی بیماران هر یک از آن دو بازو به تنهایی چه بوده است.

نکته پر اهمیت دیگر آن است که داده های مربوط به survival تا حدود نیمه سال آینده آماده نخواهند بود.

در صورت اینکه پاسخ این پرسش ها خوب باشد آنگاه Tecentriq می تواند بازار رژیم درمانی کنونی شرکت Merck شامل Keytru- da و Pemetrexed را هدف بگیرد.

بازار ایمونوانکولوژی در اختیار دو شرکت Merck و Bristol-Myers Squibb است که با فاصله زیاد از بقیه از جمله Roche در پیشانی این بازار قرار دارند.

داروهای این دو شرکت یعنی Opdivo و Keytruda در هر سه ماهه مالی بیشتر از 'یک میلیارد دلار' فروش دارند.

در مجموع، پنج مهارکننده کنترلی تایید شده در بازار حضور دارند که همگی مسیر PD-L1 را هدف گرفته اند و بازار را برای ورود رقیبان جدید تنگ و رقابت را دشوار کرده اند.

در درمان خط اول سرطان ریه Merck به تنهایی جلوتر از همه ایستاده است و با داروی خود Keytruda (چه به تنهایی و چه در ترکیب با شیمی درمانی) با قدرت پیشتاز است.

لیکن، اگر جزئیات مطالعه IMpower 150 خوب باشند آنگاه این شرکت باید شاهد سرعت گرفتن Roche از دور باشد.

در تصویر بزرگ تر این بازار می توان تجسم کرد که نتایج کارآزمایی های دو شرکت Roche و Merck مسیر را برای رژیم های ترکیبی دیگر از مهارکننده های کنترلی با شیمی درمانی هموار خواهد کرد.

دو شرکت Bristol-Myers و AstraZeneca هر کدام بر روی رژیم ترکیبی شامل دو ایمونوتراپی نیز تمرکز کرده اند.

ترکیب Yervoy (و Opdivo هر دو از شرکت بریستول-مایرز) تبدیل به یکی از درمان های استاندارد ملانوما شده است.

همچنین، بریستول-مایرز در حال مطالعه رژیم ترکیبی داروی Opdivo با شیمی درمانی در سرطان ریه سلول غیر کوچک نیز است.

اما، آسترانکا در ترکیب Imfinzi و یک ایمونوتراپی آزمایشی به نام tremelimumab موفق نبود.

به هر حال، خبر اعلامی Roche آنقدر مهم بود که در همان روز ارزش سهام شرکت را نزدیک به ۷٪ بالا برد و همزمان موج احساسی ناشی از گمانه زنی فروش آتی آن، ارزش سهام رقیبانش یعنی Merck و بریستول-مایرز را به طور موقت کاهش داد.

رژیم های ترکیبی شامل یک داروی جدید و یک داروی قدیمی، در واقع، در دو وجه سود اضافه ای را برای شرکت ها به ارمغان می آورند زیرا هم بازار داروی جدید را گسترده تر می کند و هم داروهای قدیمی تر آنها را در طول چرخه عمر محصول به عقب می کشد و دوباره فروش آنها را در مرحله رشد قرار می دهد.

Nephrotonic®


100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.

Multivitamin for CKD patients

Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12	6 mcg
Vitamin B1	1.5 mg
Vitamin B2	1.7 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin E	50 mg
Vitamin B5	10 mg
Ascorbic acid	60 mg
Biotin	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide)	25 mg
Niacinamide	20 mg
Folic acid	1 mg



تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهراوی



Agoleep®

Agomelatine 25 mg



- ✓ اولین داروی آگوملاتین تولیدی در ایران
- ✓ موثر در درمان و پیشگیری از عود اختلال افسردگی مازور
- ✓ بهبود چشمگیر علائم Anhedonia شامل کندی احساسات (Affective Flattening) و Emotional blunting و کرختی احساسات (Emotional numbness)
- ✓ عدم تاثیر بر سطح سروتونین خارج سلولی و در نتیجه عوارض گوارشی کمتر در مقایسه با سایر داروهای ضدافسردگی
- ✓ عوارض جنسی در حد پلاسبو
- ✓ آلترناتیو میرتازاپین در بیمارانی که دچار عوارض جنسی ناشی از SSRI/SNRIs و یا TCAs شده اند
- ✓ عدم افزایش وزن، نداشتن عوارض قلبی عروقی
- ✓ پذیرش بهتر توسط بیمار نسبت به SSRI ها و ونلافاکسین و در نتیجه احتمال بیشتر تداوم درمان نسبت به آنها



Rizamelt®

Rizatriptan ODT 10 mg



- ✓ فرص باز شونده در دهان (ODT) با طعم نعنای
- ✓ ایجاد اثر تسکین درد سریع تر
- ✓ تأیید شده توسط FDA جهت کنترل حملات حاد میگرن در کودکان بزرگتر از ۶ سال و بزرگسالان
- ✓ بازگشت سریعتر عملکرد در افراد دچار اختلال عملکرد ناشی از میگرن
- ✓ بدون نیاز به نوشیدن آب و در نتیجه امکان مصرف سریعتر و شروع اثر زودتر دارو در موقعیت های
- ✓ مختلف که ممکن است آب در دسترس نباشد
- ✓ موثرترین داروی خوراکی جهت برطرف نمودن سریع سردرد ناشی از حمله میگرن حاد
- ✓ اثربخشی بهتر در برطرف نمودن سردرد در مقایسه با سایر تریپتان ها
- ✓ داروی ارجح در کنترل حملات میگرن حاد در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات بلع و یا
- ✓ دچار تهوع و استفراغ
- ✓ بدون نیاز به تنظیم دوز در مبتلایان به اختلالات کبدی و کلیوی
- ✓ موثر در سردرد میگرنی که به سوماتریپتان پاسخ نداده است

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سائتوکروم C_{450} میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.
- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.
- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

- فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.
توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری
استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU



Herbicalm
Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



Rapid Calmness
with
Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021) - 44981001-5

(021) - 44986866



Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surge and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children >2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.



Nasal Spray

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%



52nd Blvd, 15th Kilometer Karaj Makhsoos Road,
Tehran - Iran

Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603

Post Code: 1388167311

www.sinadarou.com

Email: info@sinadarou.com

Nasal Spray

RINOSALTIN®

Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال



**شکل دارویی و بسته بندی:**

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولید ها بوده که با مهار رشد باکتری سبب درمان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی • فراهمی زیستی بیشتر • تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر • مصرف یکبار در روز • طول مدت درمان کوتاه

ماکرولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهایی نظیر تئوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:
پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل
پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.
بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.
پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.
2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.
3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.



زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی

درمان پر قدرت
در زمان کوتاه

ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی

Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزیمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۷۶۷

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۳ (۲۱)

فکس: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، مهیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.
Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

خودین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

شرکت داروسازی کیش مدیفارم (سهامی خاص) از سال ۱۳۸۱ با حضوری مستمر در منطقه آزاد کیش به عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان و یکی از فعالترین واحدهای صنعتی مستقر در جزیره زیبای کیش با بهره گیری از متخصصین کارآزموده و خطوط تولید مجهز و مطابق با استانداردهای روز داروسازی دنیا و با رعایت کامل اصول و قوانین GMP، آمادگی خود را جهت تولید انواع محصولات در اشکال جامدات (قرص، کپسول، پودر و ساشه)، مایعات خوراکی (گیاهی، طبیعی، محلول های لوسیون)، موضعی و انواع مکمل) اعلام می دارد.

همچنین این شرکت با داشتن سایت تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی (کارخانه سورینت)، آمادگی لازم جهت تولید انواع محصولات در اشکال مختلف اسپری های تحت فشار، دنودرانت، ژل، کرم، لوسیون، عطر، ادکلن و دستمال مرطوب و ... را دارد.

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com



KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com



آدرس:
جزیره کیش، شهرک صنعتی شماره ۳، بلوک ۶۴
صندوق پستی: ۶۶۶
تلفن مستقیم بخش تولید قراردادی:
(داخلی ۲۰۸) ۰۲۱-۸۶۰۳۵۴۲۰
۰۹۱۲ ۵۵۸۴ ۱۸۴
www.kishmedipharm.com
info@kishmedipharm.com

Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me

First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.) **6.Special warnings and precautions:** Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Fluctafenine, Methacholine, Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست



Pharmaceutical Labs Co.



CURCUMIN RAZAK



CURCUMIN RAZAK



Helps Relieve Joint Pain & Inflammation



Each Capsule Contains:

Curcuminoids (as dried extract of turmeric root 370 mg)





شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک



کورکومین رازک

فرآورده طبیعی

هر کپسول حاوی کورکومینوئید به صورت عصاره خشک ریشه گیاه زردچوبه با دوز ۳۷۰ میلی گرم می باشد



درمان درد مفاصل ناشی از التهابات روماتیسمی



کمک به بهبود درد مفاصل، التهابات و دارای خواص آنتی اکسیدان قوی





The Syndicate of Iranian
Pharmaceutical Industries



Food and Drug
Administration



Ministry of Health
and Medical Education

The 6th Int'l Exhibition on Pharmaceuticals & Related Industries

7-9 August 2021 Tehran, IRAN



ششمین نمایشگاه بین‌المللی

ایران فارما دارو و صنایع وابسته

۱۶ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ تهران، مصلی امام خمینی (ره)

www.iiphexpo.com



TRCO



Tazeh Pharmaceutical Group



سازده



آذریژان



ACTOVER GROUP



کرمشاهی داروسازی



Tehran Chemie
Pharmaceutical Co.



میخک فارما
MIKHAK



MDPK



شرکت همون دارو



F&D Magazine
www.fdmag.ir



mPharma
www.mPharma.ir



همران

دیروخانه انحصاری نمایشگاه: موسسه رسایش
تهران - خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی
خیابان پیرو، تویچ همدانی، پلاک ۶۶، ساختمان رسایش
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۳۸۴۵-۶، ۸۸۶۰۳۸۴۵-۸۸۱۹۸۵۴۰



ROSHAYESH



نداشتن نگرانی از دیابت حق همه و رویای ماست،
برای تحقق این رویا کنار هم باشیم.

75shahr.gabric.ir



استان های هدف پوشش

سیستان و بلوچستان | ایلام | کهگیلویه و بویراحمد | کردستان
خراسان جنوبی | هرمزگان | بوشهر | آذربایجان غربی | زنجان | لرستان

کمک های مردمی

گزینه برتر

سوال اول:

پسر ۷ ساله ای که قصد مسافرت به نواحی مالاریا خیز را دارد؛ تحت پروفیلاکسی مالاریا گذاشته شده است. پس از آن دچار رنگ پریدگی، ضعف و بیحالی و ادرار تیره شد.

- در بررسی CBC، هموگلوبین از ۲/۱۴ به ۹ تقلیل یافت.
- کدامیک از روشهای زیر را جهت تشخیص بیماری وی توصیه می کنید؟
- ۱- تست شکنندگی اسموتیک
 - ۲- بررسی فعالیت های آنزیمی
 - ۳- الکتروفورز هموگلوبین
 - ۴- تست کوکیز مستقیم

سوال دوم:

خانم ۲۵ ساله ای با نازایی اولیه ۵ ساله و پریودهای مرتب، دیسمنوره و لکه بینی قبل از پریود مراجعه نموده است. در هیستروسالپنگوگرافی لوله باز است. اسپرموگرام همسر وی طبیعی است.

- اقدام بعدی کدام است ؟
- ۱- تست بعد از نزدیکی
 - ۲- تحریک تخمک گذاری
 - ۳- لاپاروسکوپی جهت رد آندومتریوز
 - ۴- معرفی جهت انجام IVF

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ۲، ۳، ۴.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیقاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع





- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمان زاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت‌هایی که در این شماره با ما همکاری داشته‌اند:

زهرای

www.zahravi.com

آفا شیمی

www.afachemi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

اکسیر

www.exir.co.ir

سبحان دارو

www.sobhandarou.com

ایران هورمون

www.iranhormone.ir

عبیدی

www.abidipharma.com

پورسینا

WWW.pursinapharma.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.ir

مهر دارو

www.mehrdarou.com

دارو پخش

www.dp-pharma.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

رازک

www.razakpharma.com



Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients¹

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.

