

**Ropixon**[®]
Rosuvastatin

Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.

صفحہ		صفحہ	
25	Antibiotic Zithrotrex	23	Nasal Rinosaltin
		19	Mintonex
سہ جلد	Cardiology		Neurology
29	Brilavus	10	Parkoheal
11	Bizopex	روی جلد	Ozapex
دو جلد	Macitentan		(Cns)
1	Valzo family		central nervous system
36	Ropixon	14	Neuropetin
35	Xalerban		Muscle Relaxant
21	Elaquit	15	Methocarbamol
	Pozzarex		Oncology
	Endocrine	26	Eximex
3	Gloripa	27	Nolvamon
5	Glorenta		Psychology
پشت جلد	Novocare	20	Herbicalm
	Food suppiement		
7	Geriviton		
16	Cystin b6		
30	Hematofer		
12	Novofer		
9	Nephrotonic		

Get to the HEART of Diabetes

The First OAD with FDA-approved
Cardiovascular Benefits¹

Lifesaving cardiovascular benefits of Empagliflozin²



↓38% Cardiovascular death



↓35% Heart failure admission



↓32% all-cause mortality

1. Empagliflozin: FDA label 2018; Reference ID: 4195030

2. N Engl J Med. 2015; 373: 2117-2128

OAD: Oral Anti-Diabetes Drugs
FDA: Food & Drugs Administration

 **Gloripa**[®]
Empagliflozin

 **Synoripa**[®]
Empagliflozin / Metformin

 **abidi**
Diabetes

دیابت و واکسن کرونا

دیابت و واکسن کرونا - یکی از چیزهایی که باید در مورد بیماری کوید ۱۹ بدانیم این است که این بیماری جدید است و ما هنوز درباره آن در حال جمع آوری اطلاعات و تحقیقات هستیم. با این حال در طی این مدت تحقیقات زیادی صورت گرفته است و اکنون میدانیم که بیماران دیابت به موارد شدیدتر کرونا مبتلا میشوند. با این حال چنین نیست که کسانی که دیابت دارند بیشتر مستعد بیماری کرونا باشند بلکه اگر مبتلا شوند علائمشان شدیدتر بوده و پیشرفت بیماری در آنها سریعتر است. به نظر میرسد این امر در مورد هر دو نوع دیابت نوع ۱ و ۲ صادق است. اگر چه چنین به نظر میرسد که عملکرد بدن بیماران دیابت نوع یک بهتر است چرا که این بیماران معمولاً سن کمتری نسبت به دیابت نوع دو دارند.

• دیابت نوع یک اختلالی است که در آن بیشتر سلولهای که انسولین تولید میکنند، توسط فرایند ایمنی بدن سرکوب شده و از بین رفته اند.

• دیابت نوع دو اختلالی است که در آن حساسیت سلولها به انسولین کاهش یافته است. در دیابت نوع ۲ عوامل محیطی و ژنتیکی نقش دارند. عوامل ژنتیکی به این صورت تاثیر میگذارند که باعث میشوند بنا به دلایلی فرد تمایل بیشتری به خوردن داشته باشد، فعالیت بدنی کمتری داشته باشد و در نتیجه دچار وزن اضافه باشد.

آیا بیماران دیابت بیشتر در خطر عوارض بیماری کرونا (کوید ۱۹ (COVID-19)) قرار دارند؟

کسانی که دیابت دارند بیشتر از دیگران دچار عوارض ناشی از بیماری کرونا میشوند به همین علت واکسیناسیون این قشر از مردم در مقابل این بیماری حائز اهمیت است.

بیشتر بدانید: درمان زخم ها و عفونت های پای دیابتی

چرا بیماران دیابتی بیماری کرونایشان ممکن است شدیدتر از دیگران باشد؟

کسانی که دیابت دارند التهاب بیشتری در بدنشان وجود دارد. از این رو در زمان ابتلا به کرونا، این التهاب شدیدتر شده و سریعتر پیش میرود.

دلیل دیگر این پدیده این است که افراد دیابتی بیشتر دچار مشکلات گردش خون هستند. بسیاری از این افراد پیش از این مشکل ضعیف بودن گردش خون در پاها، مشکل قلبی یا حتی سکته داشته اند. مشکل ضعیف بودن گردش خون و تشکیل لخته در این بیماران، با ابتلا به کرونا ممکن است بدتر شود.

بیماران دیابتی باید مراقب چه علائمی باشند؟

کسانی که دچار بیماری کرونا شده اند طیف گسترده ای از علائم را تجربه کرده اند، برخی علائم بسیار خفیف و برخی بسیار شدید. علائم ظرف دو تا چهارده روز پس از قرار گیری در معرض ویروس بروز میکند. اگر علائم زیر را دارید، به پزشک مراجعه کنید:

- تب یا لرز
- سرفه
- نفس نفس زدن یا تنگی نفس
- خستگی
- درد بدن یا عضله
- سردرد
- از دست دادن حس بویایی یا چشایی
- گلودرد
- آبریزش بینی یا گرفتگی بینی
- حالت تهوع یا استفراغ
- اسهال

ادامه دارد...

برگرفته از سایت مقالات دیابت

All Paths Lead to **ONE**

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**¹



Once Daily² |



Heart Protection² |



Kidney Protection²

- Highly efficient **HbA1c** reduction^{3,4}
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes^{3,4}
- Weight loss**^{3,4}



References:

- (Empagliflozin/Linagliptin) FDA Label
- Diabetes Care 2015; 38 (3): 384-393
- Diabetologia 2018; 61: 2461-2498
- Mayo Clin. Proc 2010; 85 (12): 515-526

... ادامه دارد

مدیریت تحول سازمانی

تعاریف:

تحول سازمانی فعالیت یا تلاشی بلندمدت است که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می شود. این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چم انداز فعلی و آی سازمان، توانمند سازی اعضا، یادگیری فرایند حل مساله، از طریق مدیریت فرهنگ سازمان با تاکید خاص بر فرهنگ گروه های کاری رسمی و دیگر اواع گروه ها و به کارگیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت گیرد. (فرنچ و بل، ۱۳۸۹:۲۹)

ریچارد بکهارد، توسعه سازمانی را یک تلاش برنامه ریزی شده در پهنه سازمان، تحت نظر مدیریت ارشد برای افزایش اثربخشی و درمان سازمان از طریق مداخلات برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری می داند. (Beckhard, 1969).

در تعریف دیگری از توسعه سازمانی، توسعه سازمانی یا تحول سازمانی، کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای توسعه برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها، ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان، تعریف شده است. (Cummings, 2009).

الگوی تحول کامینگز و ورلی (Cummings & Worley, 2009)

این مداخلات فرد، گروه یا سازمان را نخستین سطح سازمانی تاثیرگیرنده فرض می کند. دخالت های فرایند انسانی در داخل سازمانها و فرایندی که به وسیله آن اهداف سازمانی را اجرا کنند، متمرکز شده است. این فرایندها شامل ارتباطات، حل مشکلات، تصمیم گیری گروهی و رهبری اند. دخالت های فنی ساختاری بر روی تکنولوژی به طور مثال روش های کار و طراحی شغل و ساختار مانند تقسیم کار و سلسله مراتب سازمانها متمرکز شده اند. دخالت های مدیریت منابع انسانی بر فعالیت های پرسنلی که برای پیوند افراد با سازمان به کار می روند، متمرکز می شود. دخالت های استراتژیک، عملکرد داخلی سازمان را به محیط بزرگتر مرتبط می کند و سازمان را برای همگامی با شرایط تغییر یابنده متحول می کند. (Cummings & Worley, 2009)

• مدل تحول سازمانی وانر بورک

این مدل به شرح زیر می باشد:

نمودار شماره ۴: مدل وانر بورک (Warner Burke.W and Lake.Dale G and Paine.Jil)

رویکرد پذیرنده برای کاهش مانع احساسی و رویکرد تسهیل کننده برای کمک کردن به افراد در مواجه شدن با موقعیت های معین به منظور انجام بهتر کار استفاده می شود. رویارویی و تجویز در موقعیت ایستا و منجمد با ارائه گزینه هایی بسیار مفید می باشد. از اصول، تئوری ها و مدل ها برای فهم پیش بینی محیط فیزیکی، تکنولوژی جدید و توسعه اجتماع به طور چشمگیری استفاده می شود.

ادامه دارد...

دکتر کامران صحت

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما هستیم.

ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژربویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548

ZAHRAVI
PHARMACEUTICAL CO.

شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

گیاهان دارویی و مکمل های غذایی برای دیابتی ها

مکمل های غذایی برای دیابتی ها - دیابت نوع ۲ قبلاً دیابت بزرگسالان نامیده می شد ، اما در حال حاضر شیوع آن در کودکان رو به افزایش است . این شکل از دیابت زمانی ایجاد می شود که بدن ، یا در برابر انسولین مقاومت می کند یا به اندازه کافی انسولین تولید نمی کند و باعث عدم تعادل سطح گلوکز خون می شود.

هیچ درمان قطعی برای دیابت وجود ندارد. با این حال ، بسیاری از افراد با رژیم و ورزش قادر به کنترل سطح گلوکز خون خود هستند. در غیر این صورت ، پزشک می تواند داروهایی را تجویز کند که سطح قند خون را کنترل کنند. برخی از این داروها عبارتند از:

- انسولین درمانی
- متفورمین (گلوکوفاز ، گلوزا ، ...)
- سولفونیل اوره ها
- مگلیتینیدها رژیم غذایی سالم ، فعالیت بدنی و حفظ وزن سالم اولین و گاه مهمترین قسمت درمان دیابت است. با این حال ، وقتی این موارد برای کنترل قند خون، کافی نیستند ، پزشک ممکن است تصمیم به تجویز دارو بگیرد
- در کنار این روش های درمانی ، افراد دیابتی گیاهان و مکمل های زیادی را برای بهبود دیابت خود امتحان میکنند. این درمان های جایگزین قرار است به کنترل سطح قند خون ، کاهش مقاومت به انسولین و جلوگیری از عوارض مربوط به دیابت کمک کنند.
- برخی از مکمل ها در مطالعات حیوانی نوید بخش بوده اند. با این حال ، در حال حاضر فقط شواهد محدودی وجود دارد که نشان دهد آنها از مزایای مذکور، در انسان نیز برخوردار هستند.
- استفاده از مکمل های غذایی برای درمان دیابت
- همیشه بهتر است اجازه دهید غذاهایی که می خورید ، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز شما را تأمین کنند. با این حال ، هر روز تعداد بیشتری از افراد به داروهای جایگزین و مکمل ها روی می آورند. در واقع ، طبق اعلام انجمن دیابت آمریکا ، دیابتی ها بیشتر از افراد فاقد این بیماری از مکمل ها استفاده می کنند.
- از مکمل ها نباید بعنوان جایگزین درمان استاندارد دیابت استفاده کرد. انجام این کار می تواند سلامتی شما را در معرض خطر قرار دهد.
- مهم است که قبل از استفاده از هرگونه مکمل با پزشک خود صحبت کنید. برخی از این محصولات می توانند در سایر درمان ها و داروها تداخل ایجاد کنند. طبیعی بودن یک محصول به معنای بی خطر بودن استفاده از آن نیست.


Nephrotonic®

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



Multivitamin for CKD patients



Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12	6 mcg
Vitamin B1	1.5 mg
Vitamin B2	1.7 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin E	50 mg
Vitamin B5	10 mg
Ascorbic acid	60 mg
Biotin	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide)	25 mg
Niacinamide	20 mg
Folic acid	1 mg



تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهراوی




Parkoheal[®] ER

Levodopa/Carbidopa 100/25



- ✓ موثرترین دسته دارویی در کنترل علائم بیماری پارکینسون
- ✓ خط اول درمان نگهدارنده در بیماری پارکینسون در افراد بالای ۶۵ سال
- ✓ خط اول درمان نگهدارنده در بیماری پارکینسون متوسط تا شدید در کلیه سنین
- ✓ تحمل بهتر در بیماران سالمند در مقایسه با داروهای آگونیست دوپامین
- ✓ عوارض نورولوژیک کمتر از داروهای آگونیست دوپامین
- ✓ ایجاد سطح پلاسمایی پایدارتر در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزاد شونده
- ✓ اثربخشی بیشتر در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزاد شونده طبق مطالعات بالینی
- ✓ ایجاد دوره نگهدارنده برای Global Motor Response برای مدت طولانی تر
- ✓ کاهش شدت دوره Wearing-off در بیماران مبتلا به پارکینسون متوسط تا شدید
- ✓ کاهش تعداد دفعات نیاز به مصرف دارو در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزاد شونده



Macitentan

24^H
Once
Daily



- ✓ مصرف یک بار در روز و بدون نیاز به تیتراسیون دوز
- ✓ نیاز کمتر به پایش آنزیمهای کبدی در مقایسه با بوستانان
- ✓ کاهش خطر پیشرفت بیماری و کاهش نیاز به بستری در مبتلایان به فشارخون بالای شریان ریوی (PAH)
- ✓ احتمال کمتر بروز عوارض جانبی در مقایسه با بوستانان
- ✓ عدم تفاوت قابل توجه کارایی و ایمنی این دارو در سالمندان و بیماران جوان
- ✓ کاهش موارد مرگ و میر بیماران مصرف کننده دارو در مقایسه با پلاسبو
- ✓ نیمه عمر طولانی تر، اثربخشی پایدار تر (اتصال طولانی مدت تر به گیرنده هدف) و نفوذ بافتی بیشتر در مقایسه با سایر آنتاگونیستهای اندوتلین مورد تایید FDA برای درمان فشارخون بالای شریان ریوی
- ✓ احتمال کمتر بروز ادم محیطی در مقایسه با بوستانان و امبرستانان

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال



قطره خوراکی مکمل آهن نوووفر برای اطفال



Neuropentin® Gabapentin



- درمان بیماری صرع و تشنج
- درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی مانند کمر درد و دردهای استخوانی
- کاهش دردهای دیابت و زونا (درد نوروپاتیک یا عصبی)
- جلوگیری از حملات میگرن و کاهش درد آن



مهر دارو
مهر سلامتی



مهر دارو
مهر سلامتی

Methocarbamol 500

F.C Tablet



- Muscle relaxant
- Use to muscle pain
- Film coated tablet

Mehr Darou Pharmaceutical

www.mehrdarou.com

Linkedin : mehr-darou

021 44543320-30

CYSTIN B6 + ZINC RAZAK[®]

Improve the health
of hair and nails
Nutritional Supplement



SCAN ME



Razak

Pharmaceutical Labs Co.

Scan Me



میتونکس

MINTONEX

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد در صد طبیعی نعنا فلفلی (*Mentha piperita L.*) با نام عمومی **Peppermint** تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۲-۳ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم P450 میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.

مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.

مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.

توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU

Herbicalm Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



هربی کالم
اسپری دهانی

موارد مصرف:

اضطراب و عصبانیت
استرس و تنش
حملات ترس (Panic attacks)
بی قراری
کج خلقی
ترس حضور در اجتماع

Indication: • Anxiety and nervousness
• Stress and tension • Panic Attacks
• Restlessness • Irritability • The presence of social phobia

25 ml Oral Spray

• Precipitation in herbal solutions do not reduce their therapeutic effects.
• Please keep this medicine out of reach of children.
• Shake container well before use.
• For more information please see the leaflet inside.
• Store in the box, below 30°C and protect from freezing.

**Rapid Calmness
with
Nature**

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surgery and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children > 2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.

Nasal Spray
Rinosaltin®
Sodium Chloride 0.65%



Nasal Spray
RINOSALTIN[®]
Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes

ZITHROTEX[®]

زیتروترکس[®]

آزیترومایسین ۵۰۰



شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولیدها بوده که با مهار رشد باکتری سبب در مان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
 - فراهمی زیستی بیشتر
 - تداخلات دارویی کمتر
 - نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
 - نیمه عمر طولانی تر
 - مصرف یکبار در روز
 - طول مدت درمان کوتاه
- ماکروولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهای نظیر تتوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

- آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:
- پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل
- پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.
- بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.
- پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکسترز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.

2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.

3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.

www.afachemi.com



تلفن: +۹۸ ۲۱ ۶۴۰۵۹



فکس: +۹۸ ۲۱ ۶۶۷۸۰۷۸۱

تهران، کیلومتر ۵ بزرگراه فتح



ابتدای خیابان نور، پلاک ۱۳

@afachemi.co



زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی



ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی



Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت:

دومین جوهره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.

Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه آشنهار به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۹-۴۴۹۰۵۵۱۷-۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

صدای مشتری: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۳۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

بخش فردوس، داروکستر نخچیان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.)**6.Special warnings and precautions:**Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Floctafenine, Methacholine Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX®

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست

Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me



First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.



شرکت های محترم دارویی

**فروش انواع ماسک و محلول ضد عفونی
با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت**

Instagram: azma_bartar

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمائید

جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۸۹۸ تماس حاصل نمائید

سوال اول:

بیمار پسر ۱۵ ساله ای است با درد شبانه در زانوی راست مراجعه نموده است. در بررسی رادیولوژی یک، منطقه ای گرد و شفاف و با کلسیفیکاسیون مرکزی با قطر کمتر از ۲ سانتی متر در قسمت پروگزیمال استخوان تیبیا مشاهده شد. در بررسی هیستوپاتولوژیکی تراپیکول های استخوانی نامنظم در هم تنیده شده با حاشیه استئوبلاستی برجسته احاطه شده اند؛ دیده می شود. کدام تشخیص مطرح می شود؟

- ۱- استئوبلاستوما
- ۲- استئوئید استئوما
- ۳- استئوما
- ۴- استنوکندروما

سوال دوم:

کودک ۳ ساله ای را به دلیل پلاک های خارش دار اریتماتو همراه با تشدید خطوط پوستی در نواحی گردن و چین های آنتی کوبیتال نزد شما آورده اند. وی سابقه پلاک های قرمز رنگ مترشح روی گونه ها و چانه بدون درگیری نواحی اطراف دهان و بینی را نیز در دوران شیرخوارگی دانسته است.

کدام تشخیص محتمل تر است؟

- ۱- درماتیت اتوپیک
- ۲- درماتیت سبورئیک
- ۳- ضاگزمای سکه ای
- ۴- پسوریازیس فلکسورال

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج ۱، ب ۲.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

سبحان دارو
www.sobhandarou.com

عبیدی
www.abidipharma.com

کوبل دارو
www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم
www.kishmedipharm.com

مهر دارو
www.mehrdarou.com

نوو نور دیسک
www.novonordisk.com

نیکان فارمد مهر
www.nikanpharma.com

یاس دارو
www.yasdaru.co.ir

آفا شیمی
www.afachemi.com

اکسیر
www.exir.co.ir

ایران هورمون
www.iranhormone.ir

پورسینا
www.pursinapharma.com

توسعه تجارت قطره حیات
Office@tghpharma.com

تدبیر کالا جم
www.tadbirkala.ir

دارو پخش
www.dp-pharma.com

رازک
www.razakpharma.com

زهرای
www.zahravi.com

سینا دارو
www.sinadarou.com



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمان زاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



Master Savior

The only NOAC:

- Superior to warfarin in stroke/systemic embolism prevention
- Superior to warfarin in major bleeding risk reduction
- Superior to warfarin in all-cause mortality risk reduction



 **ELAQUIT**
Apixaban

 **abidi**
Cardio Thrombosis



Xalerban[®]
Rivaroxaban

Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients¹

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.



abidi
Cardio Thrombosis

