



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



صفحہ

23	Antibiotic Zithrotrex
	Cardiology
سہ جلد	Brilavus
3	Natamide
27	Bizopex
دو جلد	Valzo family
1	Ropixon
36	Xalerban
19	Pozzarex
14	sevelamer
	(cns) central nervous system
روی جلد	Gabapentin
11	Neuropetin
	Endocrine
5	Glorenta
پشت جلد	Novocare
	Food suppiement
31	Hematofer
12	Novofer
7	B-complex

صفحہ

9	Zinc plus
	Herbal
28	CYSTINE B6+ZINC
	Muscle Rlaxant
10	Methocarbamol
	Nasal
20	Rinosaltin
16	Mintonex
	Oncology
24	Eximex
25	Nolvamon
	Psychology
18	Herbicalm
	Respiratory
15	divantin



24 HOURS UNDER CONTROL

“Extended Release Formulation”

- **Two different mechanisms of action to lower blood pressure:**
 - Natriuretic diuretic effect
 - Calcium antagonist-like vasorelaxant activities
- **Extended release**
- **Protecting effects in diabetes, LVH, Nephropathy and stroke**
- **No adverse impact on glucose and lipid metabolism**



دیابت و واکسن کرونا

آیا بیماران دیابت میتوانند واکسن کرونا بزنند؟

بله. در واقع برای بیماران دیابت نوع ۱ و دیابت نوع ۲ دریافت واکسن کرونا مهمتر از افراد عادی جامعه است چون به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای امریکا (سی دی سی) این قشر در خطر بیشتر شدید بودن بیماری کرونا و مرگ ناشی از آن قرار دارند. دکتر رابرت گبی، رئیس علوم و پزشکی انجمن دیابت امریکا (ADA) میگوید: کسانی که دیابت دارند باید به محض در دسترس بودن واکسن، هر چه سریعتر آن را دریافت کنند.

چرا واکسن زدن برای کسانی که دیابت دارند اهمیت بیشتری دارد؟

دیابت و واکسن کرونا □ در یک پژوهش که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای امریکا (سی دی سی CDC) در اوایل شیوع بیماری کرونا جدید (کوید ۱۹) انجام داد مشخص شد تقریباً نیمی از افراد زیر ۶۵ سال که در اثر بیماری کوید ۱۹ جان خود را از دست دادند، مبتلا به دیابت بودند.

به همین خاطر خاصیت محافظتی واکسن کرونا برای این قشر از مردم که بیشتر در خطر عوارض کرونا و مرگ ناشی از آن قرار دارند، حیاتی است. پژوهشی که در دسامبر ۲۰۲۰ Diabetes Care منتشر شد نشان میدهد کسانی که دیابت نوع یک یا دو دارند سه برابر دیگران در زمان ابتلا به بیماری کرونا نیاز به بستری پیدا میکنند یا علائم بیماری شان شدید میشود.

دو پژوهش در بریتانیا نیز نتایج مشابهی را نشان داد. در پژوهش سال ۲۰۲۰ که در The Lancet Diabetes & Endocrinology منتشر شد مشاهده شد کسانی که دیابت نوع یک یا دو داشتند دو تا سه برابر دیگران که دیابت نداشتند در اثر بیماری کرونا در بیمارستان جان خود را از دست دادند. در پژوهش دیگر همین سال که در همین نشریه منتشر شد، چنین مشاهده شد که در افرادی که به دلیل بیماری کرونا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری بوده اند، بیماران دیابت نوع یک یا دو بیشتر از دیگران جان خود را از دست دادند.

آیا همه واکسن های کرونا برای بیماران دیابت بی خطر هستند؟

در حال حاضر چند نوع واکسن کرونا در سرتاسر دنیا وجود دارد و در دسترس عموم قرار گرفته است. برخی از آنها نیاز به دو نوبت تزریق وجود دارد تا حداکثر ایمنی حاصل شود و برخی تنها با یک نوبت ایمنی ایجاد میکنند. فاصله بین دو نوبت واکسن معمولاً ۲۱ روز (مانند واکسن فایزر) یا ۲۸ روز (مانند واکسن مدرنا) است. پس از دریافت هر دو نوبت، تا حدود ۹۰ درصد ایمنی در مقابل بیماری کرونا حاصل میشود. تا کنون عوارض جانبی جدی از زدن واکسن کرونا برای بیماران دیابتی گزارش نشده است. هنوز هیچ گزارش مرگ یا نیاز به بستری در اثر زدن واکسن کرونا گزارش نشده است. توجه داشته باشید اگر علاوه بر دیابت، بیماری دیگری هم دارید یا به تازگی عمل جراحی انجام داده اید، باید در مورد زدن واکسن نظر پزشک خود را بپرسید.

زدن واکسن کرونا در افراد دیابتی چه عوارضی ممکن است ایجاد کند؟

به طور کلی شایعترین عارضه ورم، درد و قرمز شدن محل تزریق است. عوارض جانبی شایع دیگر لرز، خستگی، ناخوشی و سردرد هستند. برخی از این عوارض خفیف هستند اما برخی افراد ممکن است واکنش شدیدتری نسبت به آن نشان دهند. به طور کلی میتوان گفت عوارض این واکسن مشابه واکسن آنفلوانزا است. کسانی که دیابت دارند بهتر است داروهای خود را همراه داشته باشند تا در صورت لزوم استفاده کنند. ممکن است تزریق واکسن کرونا باعث شود قند خونتان بالا برود. هنگامی که محتویات واکسن وارد بدن میشود، واکنش سیستم ایمنی شروع میشود. این فرایند است که باعث میشود عوارض خفیفی را تجربه کنید. به دلیل فعال شدن ایمنی بدن، ممکن است قند بیشتری در خون آزاد شود و این امر میتواند منجر به بالا رفتن قند خون شود. به همین خاطر باید داروهای خود را همراه داشته باشید. واکسن کرونا از چه چیزی ساخته میشود؟

واکسن های کرونا حاوی هیچ ذره ای از گوشت، تخم مرغ یا هر محصول حیوانی دیگری نیستند، بنابراین کسانی که به این مواد حساسیت دارند نباید نگران باشند. مکانیسم اثر واکسن، تحریک سیستم ایمنی به تولید پادتن (آنتی بادی) هایی برای مقابله با ویروس کرونا است. بنابراین بدن که به اشتباه تصور میکند مورد هجوم ویروس واقعی قرار گرفته شروع به ساخت پادتن میکند. این پادتنها باعث میشوند در صورتی که بدن بعداً در معرض این ویروس قرار گرفت، کاملاً آماده باشد و بتواند از خود محافظت کند و بیمار نشود. این واکسن همچنین حاوی موادی است که برای پایدار کردن ترکیب و عملکرد بهتر مورد استفاده قرار میگیرد. ترکیبات معمول واکسن کرونا شامل ساکروز (نوعی قند) و نمک است. این ترکیبات به مقدار بسیار اندک اضافه میشوند و هیچ تاثیری بر بدن ندارند.

All Paths Lead to ONE

The novel combination of **Empagliflozin** and **Linagliptin**¹



Once Daily²



Heart Protection²



Kidney Protection²

- Highly efficient **HbA1c** reduction^{3,4}
- Lower risk of **hypoglycemic** episodes^{3,4}
- **Weight** loss^{3,4}



پرسنل نمایشگاهی موثر

پرسنل نمایشگاهی

به خاطر داشته باشید که انتخاب کارکنان غرفه و آموزش آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت های زیادی را در نمایشگاه دیده ام که با صرف هزینه های گزاف حضور در نمایشگاه، متأسفانه به علت عدم استفاده از کارکنان حرفه ای و یا عدم آموزش مهارت های ارتباطی ایشان، بهره چندانی از حضور در نمایشگاه نبرده اند. در عوض، بسیاری از غرفه داران نمایشگاهی، مدیران تصمیم گیر را در غرفه ها می آرایند تا سرعت عقد قراردادهای را حتی در محل خود نمایشگاه افزایش دهند.

می توان با قاطعیت ادعا کرد که بسیاری از شرکت هایی که در نمایشگاه های بازرگانی حاضر می شوند (به خصوص شرکت های ایرانی) از اهمیت و نقش حضور مناسب پرسنل نمایشگاهی غافل می مانند. برای درک اهمیت نقش پرسنل نمایشگاهی در موفقیت حضور نمایشگاهی شرکت ها به ویژه برای صادرکنندگان کشور، به ذکر چند نکته مهم و مفید در رابطه با پرسنل نمایشگاهی می پردازم.

برای هر غرفه باید یک مدیر یا سرپرست در نظر بگیرید. به علاوه وجود یک مترجم، کارشناس فنی فروش و یک کارگر که همگی از آراستگی ظاهری و رفتار مناسبی برخوردار باشند نیز در غرفه ضرورت دارد. البته هر یک از این افراد باید آموزش های لازم را در مورد فعالیت های نمایشگاهی ببینند و نسبت به اهداف شرکت در نمایشگاه نیز توجیه شده باشند. افراد مزبور علاوه بر داشتن حوصله کافی، انگیزه و تعهدی قوی، باید در مجموع از اطلاعات عمومی، اجتماعی، فنی و بازاریابی کافی برخوردار باشند. رعایت نکات زیر توسط پرسنل نمایشگاهی، موفقیت موسسات شرکت کننده را افزایش می دهد:

پرسنل نمایشگاهی در غرفه ها ننشینند. نشستن پرسنل نمایشگاهی در غرفه ها، این احساس را در بازدید کنندگان به وجود می آورد که پرسنل نمایشگاهی اهمیتی به حضور آنها نمی دهند و یا اینکه دوست ندارند وقت خود را در اختیار آنها قرار دهند. باید توجه داشت که بازدید کنندگان به دنبال نقاط ضعف شرکت شما هستند. پس به خاطر داشته باشید که از میز در غرفه به عنوان سنگر استفاده نکنید. به خاطر داشته باشید که کوتاه ترین نوع مذاکره با بازدید کنندگان، مذاکره ایستاده است.

پرسنل نمایشگاهی باید از مطالعه در داخل غرفه ها اجتناب کنند. برای جلب توجه بازدید کنندگان فرصت بسیار کم است. بنابراین، فرصت ها نباید به خاطر خواندن روزنامه یا مجله از دست بروند.

پرسنل نمایشگاهی باید از سیگار کشیدن، خوردن، آشامیدن و جویدن آدامس در داخل غرفه اجتناب کنند، چرا که بازدید کنندگان علاقه مند و موثر را از پرسیدن منصرف می کنند.

پرسنل نمایشگاهی باید با تمام بازدید کنندگان رفتاری مودبانه داشته و حتی الامکان به پرسش های هر یک از بازدید کنندگان با حوصله پاسخ دهند.

پرسنل نمایشگاهی می بایست با روی خوش و تبسم با بازدید کنندگان ایجاد ارتباط نموده و در شروع مذاکره با ایشان محکم و قاطعانه دست داده و مذاکره را موثر برگزار نمایند.

پرسنل نمایشگاهی باید از مکالمه تلفنی در غرفه خودداری کنند چرا که ممکن است بازدید کنندگان را از دست بدهند. پرسنل نمایشگاهی باید به گونه ای در غرفه ها بایستند که مانع دید بازدید کنندگان نگردند. بهترین جا برای ایستادن گوشه های راست و چپ غرفه است.

به خاطر داشته باشید که هر پرسنل نمایشگاهی می بایست بیزنس کارت به نام خود یا بیزنس کارت فرد تصمیم گیر در سازمان را به هر بازدید کننده اهدا نمایند. (ر. ج. بیزنس کارت موثر)

مطالب نوشتاری تهیه شده جهت نمایشگاه (کاتالوگ، بروشور و ...) را نباید در اختیار هر بازدید کننده ای قرار داد، زیرا که برخی از آنان بلافاصله یا بعد از چند قدم، آن را دور می ریزند و نظر به صرف هزینه برای تهیه بروشورها، آرایه آن به هر بازدید کننده ای به صرفه نیست.

ادامه دارد ...

B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential **B** vitamins



60

Soft gelatin capsules

Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



B

Vitamin

SUPPLEMENT

... ادامه

- تعدادی از مکمل ها به عنوان درمان های کمکی دیابت نویدبخش هستند:
- دارچین
- طب چینی صدها سال است که از دارچین برای اهداف دارویی استفاده می کند. مطالعات زیادی برای تعیین اثر دارچین بر سطح گلوکز خن انجام شده است. یک مطالعه معتبر در سال ۲۰۱۱ نشان داده است که دارچین ، چه به صورت کامل و یا عصاره ، به کاهش سطح قند خون ناشتا کمک می کند. مطالعات بیشتری در حال انجام است ، اما دارچین برای کمک به درمان دیابت، امیدوار کننده است
- اسید آلفا-لیپوئیک
- آلفا لیپوئیک اسید (ALA) یک آنتی اکسیدان قوی است. که در غذا هایی مانند:
- اسفناج
- کلم بروکلی
- سیب زمینی
- وجود دارد.
- ALA ممکن است آسیب عصبی مربوط به دیابت (نوروپاتی دیابتی) را کاهش دهد. برخی مطالعات استفاده از این مکمل برای نوروپاتی را پشتیبانی می کنند.
- همچنین برخی مطالعات نشان داده که ممکن است:
- استرس اکسیداتیو را کاهش دهد
- سطح قند خون ناشتا را کاهش دهد
- مقاومت به انسولین را کاهش دهد
- با این حال ، تحقیقات بیشتری لازم است. علاوه بر این ، ALA باید با احتیاط مصرف شود ، زیرا ممکن است سطح قند خون را به سطوح خطرناکی کاهش دهد.
- چای سبز
- چای سبز حاوی پلی فنول ها (گروهی از آنتی اکسیدان ها) است.
- آنتی اکسیدان اصلی موجود در چای سبز به عنوان اپی گالوکاتکین گالات (EGCG) شناخته می شود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است که EGCG ممکن است دارای مزایای سلامتی زیادی باشد از جمله:
- کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی
- پیشگیری از دیابت نوع ۲
- بهبود کنترل گلوکز
- فعالیت بهتر انسولین

ادامه دارد....

دکتر محسن پرورش

Zinc Plus[®]



Beautiful Skin

Zahraui
B-Complex



Healthy Hair

- ✓ جبران کمبود روی در بدن
- ✓ تامین ویتامین های گروه B
- ✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Strong Nails

60

Soft gelatin capsules

Each capsule contains :

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Zahraui Pharmaceutical Company
Tel & Fax: (+98) 2144993193
WhatsApp: (+98) 9026080548



ZAHRAUI
PHARMACEUTICAL CO.

تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی



مهر دارو
مهر سلامتی

Methocarbamol 500

F.C Tablet



- Muscle relaxant
- Use to muscle pain
- Film coated tablet

Mehr Darou Pharmaceutical

www.mehrdarou.com

Linkedin : mehr-darou

021 44543320-30

Neuropentin[®]

Gabapentin



- درمان بیماری صرع و تشنج
- درمان دردهای مزمن ناشی از آسیب عصبی مانند کمر درد و دردهای استخوانی
- کاهش دردهای دیابت و زونا (درد نوروپاتیک یا عصبی)
- جلوگیری از حملات میگرن و کاهش درد آن



مهر دارو
مهر سلامتی

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids



- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره: ۸۸۸۳۴۶۲۴ صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

IRC:1601323671161723

www.novofer.ir

توزیع شده توسط شرکت پخش ممتاز و بهستان پخش

نوووفر®

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال





Sevelamer carbonate Genthon 800

Sevelamer carbonate 800mg Tablet



- ✓ کاهش میزان مرگ و میر در مبتلایان به CKD
- ✓ بهبود کلسیفیکاسیون عروق کرونر
- ✓ کاهش خطر مرگ و میر قلبی عروقی ناشی از آریتمی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش چشمگیر بستری شدن در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش خطر بروز هیپرکلسمی و دارای خواص ضدالتهابی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ دارای خاصیت کاهش سطح خونی کلسترول تام، LDL و اسیداوریک
- ✓ کاهش دهنده سرعت کلسیفیکاسیون در پیچه های قلب در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات در CKD



Diventin®

Budesonide/Formoterol fumarate 320/9 mcg



- ✓ قابل استفاده در آسم ناشی از ورزش
- ✓ دارای کاربرد در همه درجات بیماری آسم (از نظر شدت)
- ✓ دارای اثرات بهتر نسبت به بودزونايد تنها (در آسم متوسط تا شديد)
- ✓ تنها ترکیب کورتون و برونکودیلاتور با قابلیت کاربرد به عنوان تسکین حملات
- ✓ حاد آسم و درمان نگهدارنده بدون نیاز به تجویز اسپری سالیوتامول
- ✓ بطور همزمان در آسم خفیف
- ✓ تنها ترکیب کورتیکواستروئید و بتا آگونیست قابل استفاده به عنوان داروی
- ✓ در صورت لزوم (as-needed) در آسم تثبیت شده خفیف
- ✓ سرکوب کمتر محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال نسبت به سایر اشکال
- ✓ ترکیبی حاوی فلوتیکازون

مصرف استنشاقی:

در صورت گرفتگی بینی و سرماخوردگی اطفال یا بزرگسالان میتوان چند قطره از محلول را روی دستمال یا داخل ماسک ریخته و آنرا جلوی بینی گرفته و به دفعات استشمام نمود. و یا چند قطره از دارو را روی یقه یا آستین لباس یا دو طرف بالش بزرگسالان یا کودکان قرار داد.

عوارض جانبی:

در افرادی که به اسانس نعنا فلفلی حساسیت دارند ممکن است باعث بروز یکسری واکنشها مانند راش پوستی، سردرد، کاهش ضربان قلب، لرزش ماهیچه، سوزش سر دل و عدم تعادل شود.

تداخلات دارویی:

براساس تعدادی از مطالعات، به نظر میرسد اسانس نعنا فلفلی موجب مهار ایزوآنزیم سایتوکروم C_{450} میشود، در نتیجه مصرف همزمان آن با داروهایی که متابولیسم آنها تحت تاثیر این آنزیم است، موجب تغییر کلیرنس دارو میشود. بنابراین لازم است زمان مصرف دارو حداقل یکساعت بعد از غذا بوده و حداقل دو ساعت با مصرف سایر داروها فاصله داشته باشد.

نکات قابل توصیه و منع مصرف:

- این دارو نباید با زخم باز تماس پیدا کند.
- مصرف خوراکی این دارو در افرادی که دچار التهاب لوله های گوارشی، سنگ صفرا یا انسداد مجاری صفراوی بوده و یا دچار اختلال عملکرد کبدی هستند ممنوع است.
- مصرف دارو در افرادی که حساسیت به اسانس نعنا فلفلی دارند ممنوع است.

- فرآورده های حاوی اسانس نباید با صورت، چشم و یا حتی پوست ناحیه لب و بینی تماس پیدا کند.
توجه: برای مصرف خوراکی میتوان مقدار مصرف را روی یک حبه قند یا داخل مقداری آب، آب میوه، چای و یا سایر نوشیدنیها ریخته و میل نمود.

مصرف در حاملگی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

مصرف در شیردهی:

مطالعات کافی در این مورد انجام نشده است بنابراین بهتر است فقط در صورت لزوم و تحت نظر پزشک مصرف شود.

بسته بندی:

دارو در بطری شیشه ای ۳۰ میلی لیتری با برچسب و داخل جعبه حاوی بروشور بسته بندی گردیده است.

شرایط نگهداری:

دور از نور و درجای خشک و خنک نگهداری شود.

میتونکس دارویی است که با استفاده از اسانس صد صد طبیعی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) با نام عمومی Peppermint تهیه گردیده از جمله گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی و استفاده غذایی از دیرباز مورد توجه بوده و از دو هزار سال قبل تاکنون به عنوان ادویه و دارو استفاده می شود.

ترکیبات مهم:

مهمترین ترکیبات موجود در گیاه نعنا فلفلی، اسانس آن است که ۳۵-۴۵ درصد آن را منتول، ۲۰-۱۵ درصد آنرا منتون و ۵-۳ درصد آنرا منتیل استات تشکیل میدهند. لیمونن و پولگون نیز سایر ترکیباتی هستند که با درصدهای کمتری در آن دیده میشوند. داروی میتونکس بر اساس وجود منتول (مهمترین ترکیب موجود در اسانس)، استاندارد گردیده است.

موارد مصرف:

داروی میتونکس به دو صورت خوراکی و استنشاقی قابل مصرف میباشد.

بصورت خوراکی: جهت درمان نفخ، سوء هاضمه، تهوع زمان مسافرت و همچنین رفع خستگی بعد از ورزشهای سنگین مثل کوهنوردی، اسکی و دوچرخه سواری
استنشاقی: جهت رفع گرفتگی بینی و سرماخوردگی

فارماکولوژی:

اسانس نعنا فلفلی رشد بسیاری از باکتریها را مهار میکند. این اسانس موجب شل شدن عضلات صاف شده و به این ترتیب موجب کاهش انقباضات دستگاه گوارش و ایجاد اثر ضد تهوع و کاهش دل درد میشود. همچنین با اثر کاهش کشش سطحی موجب اثر ضد نفخی میگردد. لازم به ذکر است که در اثر نفوذ بسیار سریع، باعث رفع گرفتگی بینی نیز می شود.

مقدار و روش مصرف:

مصرف خوراکی:

بزرگسالان: سه بار در روز، هر بار ۷-۸ قطره از دارو را در مقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.
کودکان بالاتر از ۶ سال: سه بار در روز هر بار ۳-۲ قطره از دارو را درمقداری آب یا آب میوه حل کرده، یک تا دو ساعت بعد از غذا و سایر داروها مصرف شود.



MINTONEX

مینتونکس

قطره خوراکی
و استنشاقی



حاوی اسانس نعنا فلفلی
خوراکی: رفع نفخ و سوءهاضمه
استنشاقی: رفع گرفتگی بینی و
سرماخوردگی
محصول جدید شرکت داروسازی یاس دارو

www.yasdaru.co.ir





SOBHAN DAROU



Herbicalm
Oral Spray

- اولین اسپری زیر زبانی گیاهی ضد استرس و اضطراب در ایران
- اثربخشی سریع برای اضطراب و استرس های آبی
- دارای سه عصاره گیاهی و اثبات اثرات هر یک از عصاره ها در مطالعات و مقالات متعدد
- عدم ایجاد وابستگی دارویی



Rapid Calmness
with
Nature

Sobhandarou.co

Sobhan Darou co.

سبحان دارو پیشرو در تولید داروهای اعصاب و روان

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021) - 44981001-5

(021) - 44986866



Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%

Nasal Spray

Category:

Lubricant, decongestant.

Composition:

Rinosaltin® is a topical solution for nasal use. Each 100mL contains 0.65g Sodium Chloride as active ingredient and Benzalkonium Chloride as preservative.

Clinical Pharmacology:

Sodium Chloride nasal spray provides a soothing way to dilute thick secretions and aids their removal from the nose and sinuses.

Indications:

Rinosaltin® restores vital moisture to provide prompt relief for dry, crusted and inflamed nasal membranes due to chronic sinusitis, cold, low humidity, over use of decongestant drops, allergies, minor nose bleeds, air travel, pregnancy, sinus surge and other minor nasal irritations.

Contraindications:

This product is contraindicated in individuals with known or suspected hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: A)

Problem in people have not been documented.

Adverse Reactions:

Possible side effects include:

Burning, stinging, sneezing, dryness, local irritation and nasal discharge.

Dosage and Administration:

Children >2 years and adults:

Intranasal: 2-3 sprays in each nostril as needed.

How supplied:

Rinosaltin® nasal sprays are available as clear and colorless solution of sodium chloride 0.65% in 20 mL plastic bottle with pump sprays and protective cap.

Storage:

Store below 30°C. Protect from freezing. Keep out of reach of children.



Nasal Spray

Rinosaltin®

Sodium Chloride 0.65%



52nd Blvd, 15th Kilometer Karaj Makhsoos Road,
Tehran - Iran

Tel: +98 21 44194521 - 23 Fax: + 98 21 44196603

Post Code: 1388167311

www.sinadarou.com

Email: info@sinadarou.com

Nasal Spray

RINOSALTIN[®]

Sodium Chloride 0.65%



سينادارو
Sina Darou

Provide prompt relief for
dry, crusted and inflamed
nasal membranes



شکل دارویی و بسته بندی:

هر ویال حاوی ۵۰۰ میلی گرم آزیترومایسین می باشد.

مکانیسم اثر و موارد مصرف:

آزیترومایسین آنتی بیوتیکی از گروه ماکرولید ها بوده که با مهار رشد باکتری سبب درمان عفونت های باکتریایی نظیر پنومونی و عفونت های لگن می شود. آزیترومایسین اثر بخشی مناسبی در فارنژیت ناشی از استرپتوکوک، سینوزیت حاد، عفونت مجاری تنفسی، عفونت بافت نرم، عفونت های مجاری ادراری، عفونت های لگن و عفونت ناشی از کلامیدیای ژنیتال دارد.

آزیترومایسین در مقایسه با ماکرولیدهای قدیمی:

آزیترومایسین دارای مزایای فراوانی نسبت به ماکرولید های قدیمی نظیر اریترومایسین می باشد از جمله:

- اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی
- فراهمی زیستی بیشتر
- تداخلات دارویی کمتر
- نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی
- نیمه عمر طولانی تر
- مصرف یکبار در روز
- طول مدت درمان کوتاه

ماکرولیدهای قدیمی نظیر اریترومایسین به دلیل خاصیت مهارکنندگی سیتوکروم P450، دارای تداخلات بسیاری با داروهایی نظیر تئوفیلین، کاربامازپین، وارفارین، سیکلوسپورین و ارگوتامین می باشد؛ در صورتی که مطالعات نشان داده آزیترومایسین با این آنزیم کبدی تداخل کمتری داشته و تاثیری در متابولیسم داروهای ذکر شده ندارد، به همین دلیل تداخلات دارویی آزیترومایسین نسبت به سایر ماکرولیدها کمتر است.

مقدار مصرف:

آزیترومایسین در بزرگسالان و سالمندان بصورت وریدی در موارد زیر بکار می رود:

پیشگیری قبل از سزارین: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز یک ساعت قبل از عمل

پنومونی ناشی از جامعه: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز برای حداقل دو روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۵۰۰ میلی گرم برای ۷ تا ۱۰ روز ادامه دهید.

بیماری التهابی لگن: ۵۰۰ میلی گرم به صورت تک دوز ۱ تا ۲ روز. در ادامه درمان را از طریق داروی خوراکی به صورت تک دوز ۲۵۰ میلی گرم برای ۷ روز ادامه دهید.

پنومونی بیمارستانی: ۵۰۰ میلی گرم روزانه

نحوه مصرف:

جهت آماده سازی محتویات ویال را در ۴/۸ میلی لیتر آب سترون قابل تزریق حل نموده، سپس مجدداً با ۲۵۰-۵۰۰ میلی لیتر از محلول های قابل تزریق سدیم کلراید ۰/۹ یا ۰/۴۵ درصد یا دکستروز ۵ درصد یا رینگر لاکتات تزریقی رقیق نموده و با غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت ۳ ساعت یا ۲ میلی گرم در میلی لیتر طی مدت حداقل ۱ ساعت انفوزیون گردد.

1. Kanatani MS, Guglielmo BJ: The new macrolides-Azithromycin and clarithromycin. West J Med 1994; 160:31-37.
2. Nahata M1. Drug interactions with azithromycin and the macrolides: an overview. J Antimicrob Chemother. 1996 Jun;37 Suppl C:133-42.
3. Watkins VS1, Polk RE, Stotka JL. Drug interactions of macrolides: emphasis on dirithromycin. Ann Pharmacother. 1997 Mar;31(3):349-56.



زیتروترکس®

آزیترومایسین ۵۰۰

ویال تزریقی

درمان پر قدرت
در زمان کوتاه

ZITHROTREX®

Azithromycin 500

مبارزی قدرتمند علیه هموفیلوس آنفولانزا

موارد مصرف:

- ◀ پروفیلاکسی سزارین
- ◀ عفونت لگن
- ◀ پنومونی بیمارستانی
- ◀ پنومونی ناشی از جامعه

اثر بخشی بیشتر علیه باسیل های گرم منفی

فراهمی زیستی بیشتر / نیمه عمر طولانی تر

تداخلات دارویی کمتر / مصرف یکبار در روز

نفوذ بیشتر به درون بافت در نتیجه غلظت بافتی بالاتر نسبت به غلظت پلاسمایی



Pledge for Health
پیمانی برای سلامتی

Afa chemi
داروسازی آفاشیمی



Eximex Tab.

Exemestane 25mg

قرص اگزیمکس

اگزیمستان ۲۵ میلی گرم

تنها مهار کننده استروئیدی استروژن سنتتاز، مقاوم در برابر مقاومت دارویی

The only Steroidal Aromatase (estrogen synthetase)

Inhibitor which is resistant to breast cancer drug resistance



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۳۱۸۵-۱۷۶۷

تلفن: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲

فکس: ۰۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) ۴۴۹۰۵۵۱۲

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com info@iranhormone.com





کاهش بازگشت سرطان پستان

قرص نولوامون ۱۰ و ۲۰
تاموکسیفن

Nolvamon 10 & 20 Tab.
Tamoxifen



دارای گواهینامه ISO 9001: 2015

دارای گواهینامه استاندارد به کیفیت

خوبین دوره جایزه ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران

تهران: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، صندوق پستی: ۱۷۶۷-۱۳۱۸۵

تلفن: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۱) فکس: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۲

پخش مرکزی: ۰۲۱-۴۴۹۰۵۵۱۷-۹ (۲۵۸)

توزیع و پخش در داروخانه های سراسر کشور توسط شرکت های:

پخش فردوس، داروگستر نخبگان، رازی، قاسم ایران، محیا دارو

www.iranhormone.com

info@iranhormone.com

BIZOPEX[®]

The most cardio selective beta blocker, Possess the highest β_1 selectivity

1-Effectively controls high blood pressure, angina & Regression of left ventricular hypertrophy

2-Cardioprotective; protect myocardium from ischemic-related damages

3-Long elimination half-life, once daily dose which cause patients medication adherence

4-High bioavailability (80%) of Bisoprolol, Effective in both resting and exercise induced hypertension

5-No effect on lipid profile, blood sugar metabolism & lungs

6-No sexual dysfunction

1-Name of the medical product and composition: Bisoprolol 2.5, 5, 10 mg Film-coated Tablets, Each tablet contains 2.5, 5, 10 mg Bisoprolol Fumarate. **2. Indication and dosage administration:** Management of hypertension 2.5 to 10 mg once daily **3.Therapeutic indications:** Treatment of hypertension. **4.Posology and method of administration:** Adults: Oral: Initial: 2.5 to 5 mg once daily; titrate as needed based on patient response to 10 mg once daily and then up to no more than 20 mg once daily; usual dosage range: 2.5 to 10 mg once daily Geriatric: No dose adjustment is required. It may be administered without regard to meals. **5. Contraindications:** Cardiogenic shock; overt cardiac failure; marked sinus bradycardia or heart block greater than first-degree (except in patients with a functioning artificial pacemaker.) **6.Special warnings and precautions:** Anaphylactic reactions, Bronchospastic disease, Conduction abnormality, Diabetes, Heart failure (HF), Myasthenia gravis, Peripheral vascular disease (PVD) and Raynaud disease, Pheochromocytoma, Prinzmetal variant angina, Psoriasis, Thyroid disease, Abrupt withdrawal, Major surgery. **7.Interactions: Combinations contraindicated:** Bromperidol, Fluctafenine, Methacholine, Rivastigmine, Combinations not recommended: Alpha2-Agonists, Amifostine, Ceritinib, CYP3A4 Inducers (Strong), Dabrafenib, Dronedarone, Enzalutamide, Ergot Derivatives, Fingolimod, Grass Pollen Allergen Extract (5 Grass Extract), Lorlatinib, Mitotane, Obinutuzumab. **8. Pregnancy and lactation:** Pregnancy: category C, Lactation: unknown. **9. Adverse effects:** Frequent adverse effects: Chest pain (1%), Fatigue (7%), hypoesthesia (1%), Diarrhea (3%), vomiting (1%), Increased serum alanine aminotransferase ($\leq 4\%$), increased serum aspartate aminotransferase ($\leq 4\%$), Upper respiratory tract infection (5%), dyspnea (1%). **10. Overdose: Symptoms:** bradycardia, hypotension, bronchospasm, acute cardiac insufficiency and hypoglycemia.

Retrieve Your heart

BIZOPEX[®]

Bisoprolol Fumarate



NEW



www.exir.co.ir

EXIR
PHARMACEUTICAL CO.
سلامتی رویا نیست

CYSTINE B6 + ZINC

RAZAK[®]

Improve the health
of hair and nails
Nutritional Supplement



SCAN ME



Pharmaceutical Labs Co.

Scan Me





The Syndicate of Iranian
Pharmaceutical Industries



Food and Drug
Administration



Ministry of Health
and Medical Education

The 6th Int'l Exhibition on Pharmaceuticals & Related Industries

23-25 August 2021 Tehran, IRAN



ششمین نمایشگاه بین‌المللی
ایران فارما دارو و صنایع وابسته

۱ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰ تهران، مصلی امام خمینی (ره)

www.iphexpo.com



دیرخانه انحصاری نمایشگاه: موسسه رسانای
تهران - خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان نظامی گهروی
خیابان پیرو، تویچ همدانی، پلاک ۶۶، ساختمان رسانای
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۰۸۸۶۵ -۰۲۱-۸۸۱۹۸۵۴۰



Hematofer[®]

To Flow In Your Vessels

Iron Sucrose



www.hematofer.com

Scan me

First-Line IV iron for adult pre-dialysis CKD Patients
Greater tolerability than oral iron



Darou Pakhsh
Pharmaceutical Mfg. Co.

گزینه برتر

سوال اول:

خانم مسنی به ما مراجعه می نماید. سابقه دیابت ۵ ساله را ذکر می کند.

در شرح حال مأخوذه از بیمار معلوم می شود که به دنبال یک ترک پوستی در گوشه بینی به سرعت دچار یک پلاک اریتماتو و دردناک در گونه سمت چپ همراه با تب و لرز شده است، در آزمایشات خونی لکوسیتوز همراه با $ESR=35$ و تیترا ASO در حد نرمال گزارش شده است. محتملترین تشخیص کدامست؟

۱- اکتیما

۲- آکنه روزاسه

۳- هرپس زوستر

۴- باد سرخ

سوال دوم:

پسر بچه ۸ ساله ای به دنبال تب و سرفه چند روزه دچار ضایعات اروزو دهانی شده است.

این ضایعات در دهان، لبها، چشم و ناحیه ژنیتالیا همراه با پلاک اریتماتو و ادماتوی تاولی روی اندامها و شکم شده است.

محتملترین تشخیص کدامست؟

۱- درماتیت هرپتی فرم

۲- هرپس اولیه

۳- پمفیگوس ولگاریس

۴- سندرم استیونز جانسون

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲. ب. لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع



انتخاب ویژه اطلاعات دارویی
شماره ۲۰ - سال یازدهم - نیمه دوم آبان ۱۴۰۰

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

Antibiotics
Cardiology
CNS
Endocrine
Food Supplement
Gastroenterology
Gynecology
Infections
Neurology
Oncology
Respiratory system
Rheumatology

Gabapentin
(Structurally related to GABA neurotransmitter)

Indicated in:
Postherpetic Neuralgia
Adjunctive therapy in treatment of partial onset of seizures

www.marhamdaru.co

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح و گرافیک:** امیر روشنی



نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمان زاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

سینا دارو

www.sinadarou.com

سبحان دارو

www.sobhandarou.com

عبیدی

www.abidipharma.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

مهر دارو

www.mehrdarou.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

مرهم دارو

www.marhamdaruco.ir

نوونوردیسک

www.novonordisk.com

آفا شیمی

www.afachemi.com

اکسیر

www.exir.co.ir

ایران هورمون

www.iranhormone.ir

پورسینا

WWW.pursinapharma.com

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.ir

دارو پخش

www.dppharma.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرآوی

www.zahravi.com



Savior on the way



- Rivaroxaban is proven 32% superior to Enoxaparin/Placebo in reducing VTE-related events in medically ill patients¹

1- J Thromb Haemost. 2018;16(7):1278-1287.

