

COLLAGEN GOLD

Protect and Restore
Your Beauty from Within

Improves skin firmness and delays skin aging

- ✓ Reduces skin wrinkle depths
- ✓ Eliminates blemishes and inflammation caused by laser and sun
- ✓ Improvement in effects of gels and fillers and other skin cares
- ✓ Cellulite reduction
- ✓ Reduces stretch marks



2500 mg Marine Collagen
(per serving size)



5000 mg Marine Collagen
80 mg Vitamin C, 50 mg Hyaluronic Acid

صفحه

16	Analgesic
	Pyasidin
	Cardiology
10	Sevelamer carbonate
24	Pozzarex
9	Ropixon
دو جلد	Valzo
سه جلد	Brilavus
	CNS (Central Nervous System)
11	Parkoheal
	Dermal
1	Collagen Gold
	Endocrine
21	Angipars
پشت جلد	Novomix
36	Empajent
3	Gloripa
28	Metformin
22	Sitagliptin

صفحه

	Food Suppriement
17	Ekolife
5	Geriviton
7	ZincPlus
	Gastroenterology
20	Biocarbon
	Herbal
26	Palminavir
	Respiratory system
روی جلد	Satika
18	Catosin Plus
14	Sinkast

Get to the HEART of Diabetes

The First OAD with FDA-approved
Cardiovascular Benefits¹

Lifesaving cardiovascular benefits of Empagliflozin²



↓38% Cardiovascular death



↓35% Heart failure admission



↓32% all-cause mortality

1. Empagliflozin: FDA label 2018; Reference ID: 4195030

2. N Engl J Med. 2015; 373: 2117-2128

OAD: Oral Anti-Diabetes Drugs
FDA: Food & Drugs Administration

Gloripa®
Empagliflozin

Synoripa®
Empagliflozin / Metformin

abidi
Diabetes

اکثر بیماران مبتلا به دیابت تمایلی به رژیم غذایی ندارند و گاهی به طور منظم از انسولین استفاده نمی کنند. از طرفی منابع انسولین در سراسر جهان رو به کاهش است و مطالعات جدید دانشگاه استنفورد نشان می دهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی، نیمی از ۷۹ میلیون بیمار مبتلا به دیابت با کمبود انسولین مواجه می شوند و به این دارو دسترسی نخواهند داشت. محققان احتمال می دهند بزرگترین کمبود انسولین در آفریقا خواهد بود و تعداد بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در آن منطقه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، از ۷۰۰ هزار نفر به بیش از پنج میلیون نفر می رسد.

تحریک سلول های بتا برای ترشح انسولین یکی از روش های هوشمندانه برای درمان دیابت است. سلول های بتای مسئول ترشح انسولین در پانکراس هستند.

در حال حاضر محققان موفق به استخراج سلول های بنیادی پرتوان القایی از سلول های پوست شده اند. این سلول ها قابلیت تبدیل به انواع سلول ها را دارند. در تازه ترین تحول، محققان دانشگاه واشنگتن این سلول ها را به سلول های بتای ترشح کننده انسولین تبدیل کرده اند. البته این فناوری چندی پیش توسط محققان دیگری نیز انجام شد، ولی سلول های بتای تولید شده به این روش اولاً در پاسخ به گلوکز، انسولین تولید می کنند، ثانیاً انسولین تولید شده به این روش بسیار بیش از حد نیاز یا بسیار کمتر از حد نیاز است.

در مطالعه جدید، محققان سلول های موثرتری تولید کرده اند که میزان مناسبی انسولین تولید می کنند. این سلول ها با انتقال به بدن موش های مبتلا به دیابت، عملکرد دقیق و مناسبی داشته اند؛ ولی محققان بر این باورند که تضمینی برای عملکرد صحیح این سلول ها در بدن انسان وجود ندارد.

یکی از معایب این روش، سرکوب سیستم ایمنی برای پذیرش این سلول ها در بدن است که می تواند برای انسان خطرناک باشد. محققان در تلاش برای بهینه سازی این روش هستند.

این روش در صورت موفقیت می تواند بیمار را از مصرف دارو بی نیاز کند.

دیابت به علت ناتوانی بدن در تولید یا مصرف انسولین بوجود می آید. انسولین هورمونی است که توسط سلول های بتا در لوزالمعده تولید می شود و نقش آن استفاده از قند به عنوان عظیم ترین منبع انرژی بدن است. قند خون بالا به مرور زمان بر تمام ارگان های بدن تاثیر می گذارد و منجر به بیماری های قلبی، سکنه مغزی، نارسایی کلیه، نابینایی، ناتوانی جنسی و عفونت های منتهی به نقص عضو می شود.

دیابت هزینه سنگینی را به خانواده ها تحمیل می کند، در بسیاری از کشورها، هزینه تزریق انسولین و نظارت روزانه قند خون، نیمی از درآمد خانواده را صرف می کند، از طرفی نیروی کار مفید خانواده را متوقف می کند.

سازمان جهانی بهداشت و فدراسیون بین المللی دیابت به مناسبت روز جهانی دیابت در سال ۲۰۱۸ آمار قابل تاملی منتشر کرد:

- بیش از ۴۲۵ میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت مبتلا هستند؛ اکثر این آمار به دیابت نوع ۲ اختصاص دارد که به راحتی با فعالیت بدنی منظم و رژیم غذایی سالم قابل کنترل است.

- از هر دو بیمار مبتلا به دیابت، یک مورد هنوز تشخیص داده نشده است که به راحتی با تشخیص اولیه و رعایت موارد ساده مربوط به سبک زندگی قابل کنترل است.

- از هر چهار خانواده، کمتر از یک مورد به برنامه های آموزشی کاربردی در زمینه دیابت دسترسی دارند. در حالی که آموزش های اولیه نقش مهمی در کنترل بیماری، بهبود نتایج و کاهش هزینه ها دارد.

نتایج این مطالعه در نشریه Stem Cell Reports منتشر شده است.

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوآنزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

با شما مییم.

اکنون

ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارتات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company
Tel & Fax: (+98) 2144993193
WhatsApp: (+98) 9026080548

ZAHRAVI
PHARMACEUTICAL CO.

شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

داروخانه یک صنعت بسیار خوب برای اجرا برنامه های استراتژیک افزایش فروش و بازاریابی است. شما به راحتی می توانید با کسب دانش در مورد فروش بیشتر و طراحی بازاریابی مناسب با کسب و کار خود اقدام به افزایش درآمد کنید. در ادامه با شما در مورد ۷ نکته مهم افزایش فروش داروخانه صحبت خواهیم کرد. با احسان حسینی همراه باشید.

تبدیل نقاط ضعف به قوت

یکی از مهم ترین عوامل پیروزی در بازاریابی و فروش، بررسی و مشاهده دقیق رقیبان و عملکرد آن ها است. این کار معمولاً به فراموشی سپرده می شود. شما باید سیستمی طراحی کنید تا بتوانید نسبت به عملکرد رقیبان، به سرعت عکس العمل نشان دهید. شما باید روش فروش آن ها و تغییراتی را که در بازار ایجاد می کنند تحت نظر داشته باشید. پس مراحل کار به این صورت است که ابتدا لیستی از تمامی رقیبان تهیه کنید و سپس قوی ترین و فعال ترین های آنان را انتخاب کنید.

حالا شما لیستی دارید که می توانید با آن شروع به واکاوی کنید. شما باید همه نقاط ضعف و قوتی که از رقیبانتان متوجه شدید را یادداشت کنید و سپس به تحلیل هر کدام بپردازید. ببینید کدام یک از این موارد را شما می توانید در داروخانه خودتان اجرایی کنید. بهترین راه تبدیل نقاط ضعف رقیبان مخصوصاً رقیب هایی که نزدیک به شما داروخانه دارند به نقاط مثبت خود است.

حالا سوال پیش میاد که چطور به این اطلاعات از رقیبان دست پیدا کنیم؟

اولین مورد و بهترین آن این است که مراجعه حضوری داشته باشید. به داروخانه های آن ها بروید و هر چه که می بینید یادداشت کنید. اگر می توانید از قبل یکسری از مزایا و معایب را یادداشت کنید تا ببینید کدام از یک موارد را دارند.

تاثیر قیمت در افزایش فروش

هیچ گاه تلاش نکنید با قیمت پایین تر با رقیبان مبارزه کنید، زیرا معمولاً این استراتژی به شکست می انجامد. به جای قیمت پایین تر، سعی کنید بر ارزش محصول خود بیفزایید، مثلاً مشاوره رایگان پوست و مو در داروخانه خود داشته باشید. یا اگر داروسازی می کنید بعضی از دارو ها که زمان بر است را ارسال رایگان داشته باشید تا نیاز نباشد مخاطب شما مراجعه حضوری کند.

داروخانه خود را کامل نگه دارید!

منظور از کامل چیست؟ اینجا می خواهیم در مورد کامل بودن جنس صحبت کنیم. به این منظور که مخاطب شما دوست دارد که نسخه ای که پیش شما میارَد بطور کامل تحویل بگیرد. برای همه ما حداقل یکبار پیش آمده که نسخه ای را به داروخانه بردیم و به ما گفتند که مثلاً یک دارو موجود در نسخه را نداریم. خوب این می تواند لطمه بسیار بزرگی به کسب و کار شما باشد. چون مخاطب شما برای بار دوم رغبت کمتری برای مراجعه دارد و همچنین ترس از اینکه مجدد شما دارویی را نداشته باشید زیاد است.

فروش بیشتر بدون افزایش تعداد مشتری داروخانه

یکی از روش هایی که شما می توانید فروش خود را در داروخانه غیر از قسمت دارویی زیاد کنید آن پیشنهاد خرید کالا های جانبی است. بطور مثال زمانی که مشتری شما بدنال کرم مرطوب کننده هست شما می توانید علاوه بر آن به او پیشنهاد کرم روز و شب نیز بدهید و یا اگر بدنال لوازم آرایشی هست می توانید دستمال پاک کننده آرایش به او پیشنهاد دهید. یک عامل مهم در این قسمت است که شما باید حتماً آن را رعایت کنید آن هم این است که زمانی باید این پیشنهاد کالای جانبی را بدهید که مشتری شما کالای اصلی خود را انتخاب کرده و در حالت خرید است. به خاطر این است که مشتری زمانی که در ذهن خود این خرید را انجام شده در نظر می گیرد آن حالت دفاعی در برابر درد پرداخت پول از بین رفته یا کاهش یافته و شما به راحتی می توانید پیشنهاد های خود را بدهید و مخاطب شما با شدت کمتری در برابر آن می تواند مقاومت کند.

۱-

۲-



دکتر کامران صحت

Zinc Plus[®]

Zahraui
B-Complex



Beautiful Skin

- ✓ جبران کمبود روی در بدن
- ✓ تامین ویتامین های گروه B
- ✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Healthy Hair

60 Soft gelatin capsules

Each capsule contains :

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Strong Nails

5mg
Zinc

Zahraui Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



ZAHRAUI
PHARMACEUTICAL CO.

تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

این سرزمین روایی را شکسته‌اند. هیچ یک از این شرکت‌ها نیز قرار نیست تنها به تک اندیکاسیون کنونی‌اشان محدود بمانند و همگی در فکر گسترش به انواع دیگری از سرطان‌ها و بیماری‌های ایمنی هستند.

اما، باز هم خرید به دو برابر market cap زیاده روی به نظر می‌رسد.

آنچه از سمت Celgene می‌توان با اطمینان تحلیل کرد آن است که این شرکت نقدینگی بالایی دارد؛ بالاتر از آنچه برای بازار منطقی و درست باشد. یک نگاه کلی و ساده به نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری آنها در سه سال متوالی این را نشان می‌دهد:

$$2014 = 46\%$$

$$2015 = 47\%$$

$$2016 = 36\%$$

این نسبت به طور متوسط ۴ برابری، برای هر شرکتی بیش از اندازه است و انتقاد بازار و سهام‌داران را در پی دارد که چگونه مدیریت شرکت نمی‌تواند از این میزان دارایی استفاده کند.

در حقیقت، از زاویه تحلیلی یک آنالیست این میزان دارایی می‌تواند نشانه‌ای از بن بست فکری مدیران شرکت برای آینده باشد مگر دلیل محکمی برای نگه داری این حجم نقدینگی داشته باشند (میزان نقدی شرکت نیز بالا است).

همچنین، فاصله بین حاشیه سود ناخالص این شرکت با حاشیه سود عملیاتی‌اش بالا است که دلیل آن تمرکز هزینه‌ای شرکت بر R&D بوده که البته موفقیت زیادی هم نداشته است. متوسط حاشیه سود خالص Celgene در چند سال گذشته ۹۵٪ بوده است که حتی از داروئی‌هایی مانند Gilead بالاتر قرار می‌گیرد اما با سودآوری کمتر به دلیل سود عملیاتی پائین‌ترش و این خود یک دلیل دیگر است که Celgene باید با خرید شرکت‌ها و تقویت پایپلاین و مالکیت محصولاتی که نزدیک‌تر به بازار باشند، بتواند حاشیه سود عملیاتی خود را بهبود ببخشد.

به هر روی، در یکی از مطالب اخیر اشاره کردیم که با تصویب قانون مالیاتی جدید آمریکا و افزایش ناگهانی حاشیه سود شرکت‌ها، باید منتظر موج جدیدی از M&A باشیم.

اعلام خبر این خرید با اینکه هنوز انجام نشده است، ارزش سهام Juno را نزدیک به ۵۵٪ به بالا شلیک کرد و ارزش بازار آن را به نزدیک ۸ میلیارد دلار رساند. قیمت سهام Celgene نیز ۲/۲٪ پائین رفت که واکنشی طبیعی از بازار است.

اگر مالکیت ده درصدی Celgene در شرکت هدف را به یاد داشته باشیم می‌بینیم که نه‌بایت کاهش قیمت سهام Celgene با این میزان افزایش در سهام شرکت Juno جبران شده است.

موج مثبت این خبر قیمت سهام شرکت‌های دیگر که در حال توسعه CAR-T هستند را نیز به بالا راند که می‌توان به اینها اشاره کرد:

- Cellectis,
- Bellicum Pharmaceuticals,
- Adaptimmune,
- Crispr Therapeutics,
- Editas Medicine

چندی پیش که شرکت Celgene خبر داد قصد دارد شرکت Impact Biomedicines را به قیمت ۷ میلیارد دلار، بخرد.

خبر خرید دوم این شرکت نیز در بازار پیچیده است.

هدف جدید Juno Therapeutics همان شرکتی که نخستین بار توسعه روش درمانی CAR-T Cell را آغاز کرد اما نتوانست نخستین شرکتی باشد که آن را به بازار می‌رساند.

گفته می‌شود قیمت خرید جدید ۱۱ میلیارد دلار، خواهد بود که البته برای جیب شرکتی مانند Cel-gene با کوهی از نقدینگی که در اختیار دارد، پرداخت این رقم هنگفت هم راحت است.

این خبر هیجانی در بازار و میان آنالیست‌ها به راه انداخت و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در پی داشته است.

برای ورود به این مبحث ابتدا، چارچوبی را ترسیم می‌کنیم از شریطی که این دو شرکت در آن قرار دارند.

شرکت Juno پیشروی مسیر CAR-T بود لیکن، با شکست در یکی از کارآزمایی‌های کلیدی‌اش و مرگ ۵ نفر از بیماران در اثر نوروپاتی و توقف کارآزمایی توسط FDA، راه را برای رقیبان پشت سرش باز کرد تا پیش بيفتند؛ یعنی Novartis که نخستین داروی این گروه نوین را به تایید رساند و شرکت Kite که توسط Gilead خریده شد و دومین شرکتی شد که یک داروی CAR-T را به بازار رساند.

پس، Juno که آسیب زیادی را در راه توسعه این دارو تحمل کرده است و مقام‌های اول و دوم را دو دستی تقدیم دیگران نموده است جایی برای تعلل و اشتباه بیشتر ندارد.

همچنین، شرکتی در اندازه Juno می‌داند در میدان بازی غول‌هایی مانند Gilead و Novartis امکان رقابت و بقا ندارد. در نتیجه، تنها راه پیش روی این شرکت پذیرش M&A از یکی از بزرگان بازار است و منطقی است که این خریدار Celgene باشد.

چرا؟

چون شرکت Celgene نزدیک به ۱۰٪ از کل سهام شرکت Juno را در اختیار دارد و در توسعه درمان CAR-T این شرکت همکاری داشته است و در واقع، چند سال است که برای این M&A برنامه ریزی کرده و منتظر است و با مالکیت یک بلوک سهام ده درصدی راه نزدیک‌تری از بقیه به این هدف دارد. از سوی دیگر، Celgene به طور جدی نیاز به بازسازی و کامل کردن pipeline خود دارد.

این شرکت از دو جهت زیر فشار جدی نیاز به محصولات جدید قرار دارد:

۱. منبع درآمد این شرکت وابستگی زیادی به تنها یک دارو دارد یعنی Revlimid و در سال گذشته نیز بیشتر افزایش فروش این دارو ناشی از بالا رفتن قیمت آن بود.
۲. ماه اکتبر پیش، یکی از امیدهای pipeline این شرکت در کارآزمایی‌اش شکست خورد و توسعه داروی بیماری کرون آن متوقف شد.

می‌بینیم که Celgene نیاز سریع به ترمیم و تنوع سازی در پایپلاین خود دارد و با خبر دو خرید اخیر، این پیام را برای بازار و سهام‌دارانش مخابره کرده است که در اجرای این استراتژی هم جدی است و هم آماده به واکنش.

تا دو روز پیش ارزش بازار شرکت Juno پیرامون ۵/۳ میلیارد دلار بود. در نتیجه، یک پیشنهاد خرید ۱۱ میلیارد دلاری، موجب هر آنالیزی را به همراه خواهد داشت.

بازار M&A پرداخت تا حد اکثر ۵۰٪ اضافی برای یک خرید را می‌تواند بفهمد و بپذیرد اما، بیش از ۱۰۰٪ را دشوار می‌توان هضم کرد.

آیا Celgene می‌خواهد راه را بر وسوسه شرکت‌های دیگر برای خرید Juno ببندد که چنین مانع بلندی را بر پا کرده تا کسی هوس پریدن از روی آن را نکند؟

این امکان دور از ذهن نیست به ویژه آنکه دو داروی CAR-T دیگر تایید شده‌اند و خط ورود به



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:


1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.





Sevelamer carbonate Genthon 800

Sevelamer carbonate 800mg Tablet



- ✓ کاهش میزان مرگ و میر در مبتلایان به CKD
- ✓ بهبود کلسیفیکاسیون عروق کرونر
- ✓ کاهش خطر مرگ و میر قلبی عروقی ناشی از آریمی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش چشمگیر بستری شدن در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ کاهش خطر بروز هیپرکلسمی و دارای خواص ضدالتهابی در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات
- ✓ دارای خاصیت کاهش سطح خونی کلسترول تام، LDL و اسید اوریک
- ✓ کاهش دهنده سرعت کلسیفیکاسیون در بچه های قلب در مقایسه با داروهای کلسیمی متصل شونده به فسفات در CKD



Parkoheal[®] ER

Levodopa/Carbidopa 100/25, 200/50



- ✓ موثر ترین دسته دارویی در کنترل علائم بیماری پارکینسون
- ✓ خط اول درمان نگهدارنده در بیماری پارکینسون در افراد بالای ۵۶ سال
- ✓ خط اول درمان نگهدارنده در بیماری پارکینسون متوسط تا شدید در کلیه سنین
- ✓ تحمل بهتر در بیماران سالمند در مقایسه با داروهای آگونیست دوپامین
- ✓ عوارض نورولوژیک کمتر از داروهای آگونیست دوپامین
- ✓ ایجاد سطح پلاسمایی پایدار تر در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزادشونده
- ✓ اثربخشی بیشتر در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزادشونده طبق مطالعات بالینی
- ✓ ایجاد دوره نگهدارنده برای Global Motor Response برای مدت طولانی تر
- ✓ کاهش شدت دوره Wearing-off در بیماران مبتلا به پارکینسون متوسط تا شدید
- ✓ کاهش تعداد دفعات نیاز به مصرف دارو در مقایسه با فرمولاسیون سریع آزادشونده

شرکت داروسازی دانش بنیان

میم دارو

mim
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

داروسازی میم دارو

با دارا بودن

خطوط جامدات (انواع قرص و کپسول)

خط پودر (انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش)

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت ، قطره ، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com



+982122146014
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

mim
Daroo

میم دارو

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت داروسازی میم دارو

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه
دانش بنیان میم دارو

- ✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز
- ✓ نیروی انسانی با تجربه
- ✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران
- ✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014
+982176250962



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com

Help your child breathe easier with: **SINKAST[®] (MONTELUKAST)**

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and
efficacy profile to Singlair

**Manufactured in Iran
for the first time**



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866



Pharmaceutical Labs Co.

Pyasidin300[®]

وقتی زانو ها صحبت میکنند!!!

www.razakpharma.com

Relief the Symptoms of Degenerative
Joint Disease and Osteoarthritis



Pharmaceutical Co



scan me



Ekolife®

razak

Food Supplement Tablets
For Beautiful Hair And Nails



Pharmaceutical Labs Co.
razakpharma

Nourishes, Strengthens And Stimulates Growth Of Hair And Nails

Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone 125 / Salmeterol 25 - Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Category:

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

Description:

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

Clinical Pharmacology:

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

Indications:

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

Contraindications:

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Precautions:

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chickenpox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

Dosage and Administration:

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

How Supplied:

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

Catosin Plus[®] 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Catosin Plus[®] 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



محصول شرکت ترنکا اتریش

زغال فعال (اکتیوشارکول)

بیوکرین®

BIOCARBON®

* درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی
* درمان اسهال، سوء هاضمه، کلسترولمیا و کمک به جذب گازهای روده که منجر
به نفخ می شوند.

* داروی کاملاً امن در حاملگی (گروه A داروها در حاملگی)

پخش توسط شرکت های پخش البرز، رازی، نخبگان و هلال احمر

شرکت وارد کننده

کیمیا گستر صبا

اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال بابلدشت
طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی حکیم شفا

تلفکس: ۰۳۱-۳۳۳۷۹۲۴۹

اس ام اس: ۰۵۰۰۲۰۶۰۰۰۶۰۲

Email: info@KimiaGostar.ir

<http://www.KimiaGostar.ir>

لطفاً از این صفحه دیدن فرمایید: www.kimiagostar.ir/biocarbon

F. Trenka

Chem. Pharm. Fabrik
Ges.m.b.H.

Goldeggasse 5, A-1040 Viena, Austria

Tel. (0043-1) 505 03 41-0 Fax (0043-1) 505 03 41-31

Email: office@eucarbon.at

<http://www.eucarbon.com>



ANGIPARS



حاوی عصاره گیاه *melilotus officinalis*

بسیار موثر در درمان:

- زخم پای بیماران دیابتی

- زخم بستر

- درمان عوارض اسکرودرمی



آدرس وب سایت: www.nanohayatdarou.com

Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فراورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B ۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فراورده توصیه می شود.

- درضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیٹاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی اگرما و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تروما، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به همدیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتیمیا شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین/متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمپلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، تریامترن، تریمتوپریم، وانکومایسین گلیبوریید، فوروزماید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی توئین، نیکوتینیک اسید، سیمپاتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرفنیکل و پروپنیدید

سیتاگلیپتین:

سیکلوپورین

- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.

- سولفونیل اوره ها مانند تولبوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگسمی) موثر باشد.

بسته بندی:

سیتاگلیپتین/متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار(سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید(متفورمین) می باشد که کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین/متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلول های انسولین ساز لوزالمعده نمی شوند علاوه بر این منجر به بقای بیشتر این سلول ها نیز می گردند.

مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱- Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاگون می تواند بر روی روند گلوکونئوز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونئوز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین/متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم بیمار تجویز گردد.

شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین/متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin / Metformin



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN
Tel: (+9821) 6117 1510
Fax: (+9821) 6662 0175
E-mail: phtd@toliddaru.ir*


Tolidaru
Pharmaceutical Company

Pozzarex[®]

Help your patients live **wholeheartedly** with **Pozzarex (Losartan Potassium)**

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021) - 44981001-5

(021) - 44986866



پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (CRP، WBC، CT Scan، PO_2 ، PCR، ESR، LDH) کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO_2 با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سیسی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر® PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری **کرونا**

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی




+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» **Two Components in one tablet**

Treatment of Type 2 Diabetes

***Double weapon against diabetes
for maximum effect.***

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ربخند سلامتی،
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۳۱۰۶۱۳۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

www.idpa.org.ir

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.



شرکت های محترم دارویی

فروش انواع ماسک و محلول ضد عفونی با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت

Instagram: azma_bartar

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمائید

جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۸۹۸ تماس حاصل نمائید

entk_bartar 9+

92
Posts11K
Followers59
Following

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

entk_bartar

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع



گزینه برتر

سوال اول:

بیمار مرد ۷۰ ساله ای است که به علت لتارژی به اورژانس بیمارستان آورده شده است. در تاریخچه بیماری نکته خاصی وجود ندارد. در معاینه بالینی نیز نکته خاصی مشخص نشد. در آزمایشات بیمار سدیم بیمار ۱۱۶ mEq/L گزارش شده است. همه موارد هایپوناترمی بیمار را توجیه میکند به جز:

- (الف) نارسایی غده فوق کلیه
- (ب) مصرف بی رویه دیورتیک
- (ج) دیابت بیمزه
- (د) سندرم ترشح نابجای هورمون ADH

سوال دوم:

پسر ۱۴ ساله ای متعاقب با اولین حمله تب روماتیسمی به دلیل کاردیت در بخش بستری است. در معاینه بیمار همه چیز به جز مورد زیر قابل انتظار است:

- (الف) سوفل نارسایی میترا
- (ب) سوفل تنگی میترا
- (ج) صدای سوم S3
- (د) فریکشن راب پریکارد

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲. ب.
لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیان، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سپیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

شرکت‌هایی که در این شماره با ما همکاری داشته‌اند

عبیدی

www.doctor-abidi.com

کوئل دارو

www.cobeldarou.com

کیمیا گستر صبا

www.eucarbon.com

لقمان

www.loghman-med.com

نانو حیات

www.nanohayatdarou.com

نوو نوردیسک

www.novonordisk.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

میم دارو

www.mimdaroo.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

الحوی

www.alhavipharma.com

ایران فارمیس

www.iranpharmis.org

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.com

تولید دارو

www.tolidaru.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

دینه

www.dinehiran.ir

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♥ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♥ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♥ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♥ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♥ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♥ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

