


COLLAGEN GOLD

Protect and Restore
Your Beauty from Within

Improves skin firmness and delays skin aging

- ✓ Reduces skin wrinkle depths
- ✓ Eliminates blemishes and inflammation caused by laser and sun
- ✓ Improvement in effects of gels and fillers and other skin cares
- ✓ Cellulite reduction
- ✓ Reduces stretch marks




2500 mg Marine Collagen
(per serving size)

5000 mg Marine Collagen
80 mg Vitamin C, 50 mg Hyaluronic Acid

صفحہ		صفحہ	
16	Analgesic Pyasidin	28	Metformin
		22	Sitagliptin
	Cardiology		Food Suppriement
17	Lozar-H	5	B-Complex
24	Pozzarex	7	Zinc Plus
9	Ropixon		Gastroenterology
	CNS (Central Nervous System)	20	Biocarbon
10	Rexopan		Herbal
11	Deprilax	26	Palminavir
		سوم جلد	Integra
	Dermal		Respiratory system
روی جلد	Masport	18	Catosin Plus
پشت جلد	Royal Collagen	14	Sinkast
1	Collagen Gold		
	Endocrine		
3	Ziptin		
21	Angipars		
36	Empajent		

Ziptin[®]
sitagliptin

Zipmet[®]
sitagliptin / metformin



**Safe Journey to
a Better Balance**

سال‌ها قبل، تولیدکنندگان داروهای ساخته‌شده در داخل تلاش می‌کردند تا با ایجاد انحصار، سهم بیشتری از بازار دارویی بگیرند. برای اعمال تعرفه روی واردات داروی مشابه لابی می‌کردند و آنها که زورشان می‌رسید، حتی جلوی واردات داروی مشابه را می‌گرفتند. تا این‌که شرکت‌های سازنده ماده اولیه از راه رسیدن و روی دست تولیدکنندگان داروی ساخته‌شده در داخل بلند شدند و آنها هم تلاش کردند که ضمن اعمال تعرفه روی واردات مواد اولیه، لابی کنند و به نوبه خود جلوی واردات لیستی از این مواد را بگیرند. اقدامی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر کیفی ضربه سنگینی به تولیدکنندگان زد و طبیعی بود که حالا تولیدکنندگان داروی ساخته شده مخالف انحصار و ... باشند!

• این دور باطل ادامه خواهد داشت و عنقریب هر کس ادعا کند که یکی از پیش‌سازهای ساخت ماده اولیه را تولید کرده می‌تواند به راحتی اسباب دردسر و ضرر برای تولیدکنندگان مواد اولیه شود.

• اعطای انحصار به شکل جاری در ایران، در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. کسی در دنیا برای کپی کردن از دیگران جایزه «انحصار» نمی‌گیرد. خوش‌بختانه در ایران قانون حمایت از اختراع و مالکیت معنوی داریم. اگر کسی کشفی کرده یا اختراعی، ثبت کند و حقوق مالکیت معنوی آن را به دست آورد. در این صورت هیچ‌کس نمی‌تواند در طول دوره‌ی انحصار موقت، مشابه محصول او را وارد کند یا بسازد.

• ولی اگر هنوز فکر می‌کنیم کارمان با انحصار راه می‌افتد، باید هر آن منتظر دیگران هم باشیم که با ایجاد انحصار برایمان مشکل ایجاد کنند، و این دور باطل همچنان از جیب و کیفیت زندگی مردم ارتزاق کند.

دکتر پیام دیندوست



B-Complex[®]

Zahravi

Help to provide essential B vitamins



60

Soft gelatin capsules

Each soft gelatin capsule contains :

Vitamin B1	9 mg
Vitamin B2	9 mg
Vitamin B3	31 mg
Vitamin B5	9 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin B12	9 mcg
Biotin	400 mcg
Folic acid	400 mcg

Other ingredients :

Soy-Bean Oil, Yellow Bees wax, Methylparaben sodium, Propylparaben sodium, Red iron oxide, Black iron oxide, Gelatin, Glycerine.



 **ZAHRAUI**
PHARMACEUTICAL CO.

B
Vitamin

SUPPLEMENT

گویماراز و آرمسترانگ (۱۹۹۸) استدلال می کنند که عمدتاً تحلیل های شخصی و سطحی در زمینه مدیریت تحول منتشر شده است و براساس تحقیق دوپل (۲۰۰۲) حتی شواهدی موجود است که نشان می دهد کارهای عملی کم و تئوری هایی که با فرضیه های غیرمسئولانه درباره ماهیت مدیریت تحول سازمانی معاصر پشتیبانی می شوند، وجود دارد. ادمونتون (۱۹۹۵) در این باره بیان می کند که بسیاری از فرایندهای تحول در طول ۲۵ سال اخیر منجر به نقص های اساسی و جلوگیری از موفقیت مدیریت تحول شده است. ر چند شناسایی اجماع در مورد چارچوب مدیریت تحول سازمانی سخت است، اما بر سر دو مساله توافق وجود دارد، اول اینکه سرعت تغییر هرگز به اندازه محیط تجاری فعلی نبوده است و دوم اینکه تغییر، که توسط عوامل داخلی و خارجی به وجود می آید در همه اشکال، فرم ها و اندازه ها اتفاق می افتد و بنابراین بر همه سازمانها در همه صنایع تاثیر می گذارند. در حالی که یک ادبیات عمومی در حال رشد وجود دارد که بر اهمیت تحول تاکید می کند و راه کارهایی برای نزدیک شدن به آن پیشنهاد می دهد، شواهد تجربی کمی در حمایت از تئوری ها و رویکردهای مختلف ارائه شده است. (Guimaraes and Armstrong, 1998). هدف از این مقاله ارائه نظریه ها و رویکردهای در حال حاضر در دسترس در مورد مدیریت تحول سازمانی می باشد.

تعاریف:

در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایده هایی است که برای سازمان، جدید است. بنابراین تمام نوآوری ها منعکس کننده یک تغییرند اما تغییر نوآوری نیستند. (آقایی فیشانی، ۱۳۷۷: ۲۶) مطابق با تعریف هنسن، تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی ها، منظورها یا بروندهای پاره ای از واحدهای سازمان رخ می دهد. (هنسن، ۱۳۷۰: ۳۳۰)

مدیریت تحول عبارت است از جهت دهی به اقدامات اصلاحی و هدایت اقدامی که در راستای ایجاد تغییرات سازمانی صورت می پذیرد به نحوی که موجبات حفظ کارایی سازمان و اثربخشی آن فراهم آید. (هی ز، ۱۳۸۴: ۱) به عقیده نیکلز، مدیریت تغییر خود دارای دو معنی است، اول به معنی مدیریت تغییر به ایجاد تغییرات با یک برنامه به روش سیستماتیک و مدیریت شده که هدف آن اثربخشی بیشتر سیستم ها و روش های جدید اجرایی در یک سازمان در حال پیشرفت است و دوم به معنی پاسخگویی در برابر تغییرات که در سازمان روی آن کنترل کمی دارد یا کنترلی ندارد. (Nicholls, 2004)

ادامه دارد...



دکتر کامران صحت

Zinc Plus[®]

Zahraui
B-Complex



Beautiful Skin

✓ جبران کمبود روی در بدن

✓ تامین ویتامین های گروه B

✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن

✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Healthy Hair

60

Soft gelatin capsules

Each capsule contains :

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Strong Nails

5mg
Zinc

Zahraui Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



ZAHRAUI
PHARMACEUTICAL CO.

تهران - تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

• مدتی پیش، شرکت Roche قصد خریدن یک شرکت تخصصی در حوزه ژن درمانی را به نام Spark اعلام کرد.

بهای آن تملک ۳/۴ میلیارد دلار خواهد بود.

چنین ادغام و تملک‌هائی همیشه باید از صافی نهادهای نظارتی نیز رد شوند و چراغ سبز آنها را بگیرند.

اما، ارتفاع و تعداد سرعت‌گیرهای نظارتی FTC (کمیسیون تجاری فدرال) امریکا، بیشتر از آنچه بود که پیش‌بینی می‌شد و Roche تا چهار ماه پیش، دو بار ناگزیر شد که تاریخ نهائی شدن معامله را تمدید کند.

تاخیر در روشن شدن چراغ سبز FTC مشکل دیگری را نیز بزرگ‌تر می‌کند؛ شرکت Roche هنوز موفق به کسب موافقت اکثریت سهام‌داران شرکت Spark نشده بود و به عقب افتادن زمان نهائی شدن خرید می‌تواند به تردید بیشتر سهام‌دارانی که هنوز تصمیم خود را نگرفته‌اند، بینجامد.

در آخرین بار تمدید، سوم ماه June (کمی بیش از یک ماه پیش) به عنوان تاریخ نهائی اعلام شد.

اما، نه تنها تا آن تاریخ بررسی و نظر نهادهای نظارتی اعلام نشد بلکه - با انتشار نامه امروز مدیرعامل رُش - به نظر می‌رسد این دو شرکت بایست، دست‌کم، تا نیمه نخست سال ۲۰۲۰ نیز منتظر بمانند.

امروز Severin Schwan، مدیرعامل Roche در نامه‌ای خطاب به کارکنان و سهام‌داران شرکت Spark به آنها درباره عزم راسخ خود به نهائی کردن آن معامله اطمینان داد و گفت در صورت نیاز آماده است که تا به نتیجه رسیدن در ۲۰۲۰ نیز صبر کند.

در توافق‌نامه نخست بین دو شرکت، هر دو این حق را دارند که در صورت نهائی نشدن معامله تا ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰، از آن خارج شوند. امروز مدیرعامل رُش اعلام کرد حتی تا پایان آپریل ۲۰۲۰ نیز صبر خواهد کرد و به این ترتیب، سه ماه بر ضرب‌العجل توافق‌نامه بین دو شرکت افزود.

• نگرانی مدیرعامل Roche و تلاش او برای مدیریت سهام‌داران و بازار سهام شرکت Spark قابل درک است.

هر چه زمان نهائی شدن معامله درازتر شود احتمال مایوس شدن بازار و در نتیجه خروج سرمایه‌گذاران از سهام شرکت Spark بیشتر می‌شود.

همچنین، در چنان فضائی سهام‌داران بزرگ‌تر شرکت نیز فرصت بازار گرمی و مذاکره با خریداران احتمالی دیگر را پیدا می‌کنند و ممکن است با ایجاد تاخیر بیشتر تلاش کنند تا تاریخ نهائی توافق‌نامه رد بشود و بتوانند با خریدار پنهان احتمالی کار را تمام کنند.

کمیسیون تجاری فدرال، مجدداً از Roche درخواست مدارک و اطلاعات بیشتر کرده است.

سخت‌گیری این چنینی نشانه نگرانی نهادهای نظارتی از دست‌یابی شرکت رُش به قدرت برتر و جایگاه انحصاری در بازار هموفیلی □ است.

رُش (Hemlibra emicizumab) را در بازار دارد و شرکت سپارک در پایلین خود دو محصول ژن‌درمانی در حوزه هموفیلی را در دست توسعه دارد.

اگر چه رقیبان دیگری در حوزه ژن‌درمانی هموفیلی در حال توسعه محصول هستند، نهاد نظارتی تلاش می‌کند تا حد امکان از تراکم قدرت و شکل‌گیری انحصار در بازار جلوگیری کند و زمین‌بازی را میان همه بازیگران عادلانه تقسیم کند.

به هر روی و به قول مدیرعامل Roche:

Good things almost always take time...

@PharMoney



Ropixon[®]

Rosuvastatin



Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



Rexopan[®] 20

Paroxetine Hydrochloride



- ✓ دارای تاییدیه FDA برای درمان اختلالات متعدد شامل افسردگی اساسی، پانیک، اضطرابی فراگیر، هراس اجتماعی، وسواسی-اجباری و اختلال اضطراب بعد از سانحه (PTSD)
- ✓ داروی خط اول شروع درمان افسردگی اساسی و افسردگی بعد از زایمان در مادران شیرده
- ✓ کارایی بیشتر نسبت به سایکو تراپی interpersonal در درمان نگهدارنده افسردگی در جلوگیری از عود و برگشت بیماری
- ✓ جزء داروهای خط اول اختلال خودبیمار انگاری (Illness anxiety disorder)
- ✓ موثرترین SSRIs در درمان انزال زودرس به عنوان خط اول درمان
- ✓ اولین داروی تایید شده توسط FDA در درمان اختلال هراس اجتماعی (SAD)
- ✓ قابل استفاده در درمان افسردگی بیماران پارکینسونی بدون اثر منفی بر عملکرد حرکتی
- ✓ داروی خط اول غیر هورمونی در مان گرگرفتگی متوسط تا شدید ناشی از یائسگی



Deprilax[®] ER

Venlafaxine 37.5, 75 mg



- ✓ کارایی معادل SSRIs در درمان اختلال اضطرابی فراگیر و اختلال هراس اجتماعی در بزرگسالان
- ✓ موثرترین دارو در افراد دچار افسردگی ماژور خفیف تا متوسط مقاوم به SSRI ها
- ✓ پاسخ دهی بهتر نسبت به SSRI ها در افسردگی ماژور شدید.
- ✓ موثر بر همه ابعاد اختلال پانیک (کاهش حملات، کم نمودن اضطراب انتظاری و رفتار اجتنابی بیمار و اختلال پانیک مقاوم به SSRI)
- ✓ داروی موثر در پیشگیری از میگرن، بویژه در افراد دچار افسردگی و یا اختلال خلق
- ✓ جزء داروهای خط اول درمان در دنداشی از نورویاتی دیابتی
- ✓ عدم تداخل بالینی قابل توجه با داروهایی که توسط سیتوکروم P450 متابولیزه می شوند از جمله تاموکسیفن

شرکت داروسازی دانش بنیان

میم دارو

میم دارو
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

داروسازی میم دارو

با دارا بودن

خطوط جامدات (انواع قرص و کپسول)

خط پودر (انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش)

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت، قطره، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com




+982122146014
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

mim
Daroo

میم دارو



تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت داروسازی میم دارو

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه
دانش بنیان میم دارو

✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز

✓ نیروی انسانی با تجربه

✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران

✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014
+982176250962



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com

Help your child breath easier with: **SINKAST[®]** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866



Pharmaceutical Labs Co.

Pyasidin 300[®]


وقتی زانو ها صحبت میکنند!!!

www.razakpharma.com

Relief the Symptoms of Degenerative
Joint Disease and Osteoarthritis



Pharmaceutical Co





Pharmaceutical Labs Co.

LOZAR-H RAZAK

Losartan 50 / Hydrochlorothiazide 12.5

Return to the
Rhythm of life



Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

Category:

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

Description:

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

Clinical Pharmacology:

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

Indications:

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

Contraindications:

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Precautions:

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

Dosage and Administration:

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

How Supplied:

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

Catosin Plus[®] 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Catosin Plus[®] 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



زغال فعال (اکتیوشار کول)

محصول شرکت ترنکا اتریش

بیوکرین®

BIOCARBON®

* درمان غیر اختصاصی اورژانس در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی
* درمان اسهال، سوء هاضمه، کلسترولمیا و کمک به جذب گازهای روده که منجر
به نفخ می شوند.

* داروی کاملا امن در حاملگی (گروه A داروها در حاملگی)

پخش توسط شرکت های پخش البرز، رازی، نخبگان و هلال احمر

شرکت وارد کننده

کیمیا گستر صبا

اصفهان، خیابان کاوه، روبروی ترمینال بابلدشت
طبقه فوقانی داروخانه شبانه روزی حکیم شفا

تلفکس: ۰۳۱-۳۳۳۷۹۲۴۹

اس ام اس: ۰۰۰۲۰۶۰۰۰۶۰۲

Email: info@KimiaGostar.ir

http://www.KimiaGostar.ir

لطفا از این صفحه دیدن فرمایید: www.kimiagostar.ir/biocarbon

F. Trenka

Chem. Pharm. Fabrik

Ges.m.b.H.

Goldeggasse 5, A-1040 Viena, Austria

Tel. (0043-1) 505 03 41-0 Fax (0043-1) 505 03 41-31

Email: office@eucarbon.at

http://www.eucarbon.com



ANGIPARS



حاوی عصاره گیاه *melilotus officinalis*

بسیار موثر در درمان:

- زخم پای بیماران دیابتی
- زخم بستر
- درمان عوارض اسکلرودرمی



آدرس وب سایت: www.nanohayatdarou.com

Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگرم و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تورم، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران در مرحله End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به همودیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتمیما شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین / متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمیلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، ترامتین، تریمتوپریم، وانکومايسین گلیبوسید، فوروزامید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون یا مختل کننده تنظیم خون مانند: تiazیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی توئین، نیکوتینیک اسید، سیمیتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیازید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل و پروبنسید

سیتاگلیپتین:

- سیکلوسپورین
- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.
- سولفونیل اوره ها مانند تولیوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگسمی) موثر باشد.

بسته بندی:

سیتاگلیپتین / متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار (سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید (متفورمین) می باشد که کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین / متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلولهای انسولین ساز لوزالمعده نمی شود بعلاوه منجر به بقای بیشتر این سلولها نیز می گردند.

مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱- Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاگون می تواند بر روی روند گلوکونئوز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونئوز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین / متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.
- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم بیمار تجویز گردد.

شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین / متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin / Metformin



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN
Tel: (+9821) 6117 1510
Fax: (+9821) 6662 0175
E-mail: phtd@tolidaru.ir*


Tolidaru
Pharmaceutical Company

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (PCR، ESR، LDH، CRP، WBC، CT Scan، PO₂) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO₂ با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر[®] PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری کرونا

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی




+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

Treatment of Type 2 Diabetes

Double weapon against diabetes
for maximum effect.

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ببخند سلامتی،
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

www.idpa.org.ir

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.



شرکت های محترم دارویی

فروش انواع ماسک و محلول ضد عفونی با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت

Instagram: azma_bartar

از پیج اینستاگرام ما دیدن فرمائید

جهت سفارش با شماره ۰۹۱۲۲۴۴۳۸۹۸ تماس حاصل نمائید

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر

Health/Beauty

مرجع دارویی انتخاب برتر

مجله تخصصی دارویی و پوست و مو

See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع



<p>دارو دینی و باور دینی غذا</p> <p>ایمبول دارو ترازولون جهت سرد ماهورگی، ایمبول دارو ترازولون از دسته داروهای کورونویروس بوده و در بهبود علائم بسیار موثر عمل می کند و از آنجا که در بیماری سرد ماهورگی ویروس فرسان سرد استمانی علائم فرغانی است و در موردی نمی کند مستند استمنی فرسان کند نشود اما وقت فرغانی استمانی سرد ماهورگی نمی شود و لاا و سردین سرد ماهورگی در حقیقت در اطراف استمانی موجود است و ما بصورت ایمبول دارو ترازولون مستند استمنی سردین استمانی خاصیت شده از سردین داروهای کورونویروس است؛ باعث توانایی سرد شدن تریو بیماری حسود و پند است از داروهای سرد ماهورگی است؛ ما خواگی جانی دارو ترازولون استفاده شود.</p>		<p>دارو دینی و باور دینی غذا</p> <p>قرص گنسیو دین دارو دین پوری استمانی، چند ماهی است که گنسیو جهت جلوگیری از پوری استمانی استفاده میشود در حالیکه مصرف گنسیو نه تنها سبب بهبود استمانی است بلکه در کاهش سرد و کاهش شده و در صورت مصرف ایوب ما و ویتامین B2 با فعال شدن استمانی گنسیو (پروتئین استمانی) با استفاده از ویتامین B2، بازگشای استمانی را فراهم کرده. در نتیجه بسیاری مناسب برای کاهش استمانی ایوب ما می گنسیو بطور موثری به استمانی باشد می شود و از این طریق گنسیو بطور موثری در باکست استمانی اخیر، می شود.</p>
<p>دارو دینی و باور دینی غذا</p>		<p>دارو دینی و باور دینی غذا</p>



سوال اول:

خانم ۵۰ ساله ای با سابقه درد در قسمت مدیال زانو از سه ماه قبل که هنگام راه رفتن و دو زانو نشستن تشدید می شود؛ به درمانگاه مراجعه نموده است. در معاینه مختصری هایپرتروفی سینوویال دارد و در رادیوگرافی ساده، sharpening لبه های استخوان کشکک مشهود است. اقدام بعدی چیست؟

- ۱- انجام CR scan زانو
- ۲- فیزیوتراپی جهت تقویۀ عضلات چهارسر
- ۳- تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئید طولانی اثر
- ۴- آرتروسکوپی

سوال دوم:

بیمار مرد ۳۰ ساله ای است که به گفته اطرافیان از یکپهفته قبل به دنبال حضور در یک تصادف شدید رانندگی که منجر به مرگ چند نفر از بستگان وی شده است؛ دچار بیخوابی، کابوس و بیقراری شده است. در معاینه بیمار شدیداً مضطرب است. اگرچه در هنگام معاینه تمرکز کافی ندارد ولیکن هوشیاری وی مختل نیست. او معتقد است که تصادف رانندگی در اثر توطئه دشمنان او ایجاد شده است و آنها قصد کشتن او را هم دارند و صدای چند نفر را هم می شنود که او را تهدید به قتل می کنند. محتملترین تشخیص کدامست؟

- ۱- PTSD
- ۲- Brief Psychotic Disorder
- ۳- Panic Disorder
- ۴- Delirium

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ج، ۲، ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)




دکتر فاطمه علوی لنگرودی



شرکت های دارویی ممتاز
می توانند جهت معرفی کلیه
ممصولات فود یک شماره از
ماهنامه را همراه با لوگوی
سفارشی به فود افتصاص دهند

برای هرچه بهتر شناخته شدن محصول خود با انتخاب برتر همراه شوید

- ارسال به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور
- ارسال به تمامی پزشکان منتخب با تخصص های مختلف در سراسر کشور
- شرکت در همایش ها و کنگره های پزشکی
- انتخاب برتر کوتاهترین راه برای ارتباط با مخاطب در کمترین زمان ممکن
- پزشکان محترم جهت دریافت ماهنامه نام و شماره نظام خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال نمایند



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

عبیدی

www.doctor-abidi.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیمیا گستر صبا

www.eucarbon.com

لقمان

www.loghman-med.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

نانو حیات

www.nanohayatdarou.com

نیکان فارمد مهر

www.nikanpharma.com

میم دارو

www.mimdaroo.com

یاس دارو

www.yasdarou.co.ir

الحاوی

www.alhavipharma.com

ایران فارمیس

www.iranpharmis.org

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.com

تولید دارو

www.toliddaru.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

دینه

www.dinehiran.ir

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

سینا دارو

www.sinadarou.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

