



RozaVit

Food Supplement

کاهش التهاب و
بهبود درد مفاصل

Maxijeno



Supplement Facts:		Serving size: 2 Tablets
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Glucosamine Hydrochloride	1500 mg	**
Chondroitin Sulphate	800 mg	**
MSM (Methylsulfonylmethane)	750 mg	**

*RDA: Recommended Daily Allowance, **mg**: milligram, **: RDA not established.


روز دارو
تاسیس: ۱۳۴۲
کیفیت تعهد ماست

ارتباط با ما:
وب سایت: <https://rouzdarou.com>
اینستاگرام: [Rozavit.ir](https://www.instagram.com/roza_vit)
تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

صفحہ	صفحہ
دوم جلد	Analgesic
	Noblegin 1
	Cardiology
17	Lozar-H 5
24	Pozzarex 7
9	Ropixon 16
11	Pleron 16
سوم جلد	پشت جلد
	Brilavus 12
	Herbal
	Palminavir 26
	Respiratory system
14	Acnomiss 18
15	Megacort 30
	Endocrine
3	Ziptin 10
36	Empajent 10
28	Metformin 10
22	Sitagliptin 11
	Neurology
	Rizamelt 11
	Leventex 11
	Urology
	Ureka 11
	Food Suppriement
	Maxijeno 1
	Geriviton 5
	Nephraotonic 7
	Cystine B6+Zinc 16
	Maxijeno plus 16
	Liposofer 12

Ziptin[®]
sitagliptin

Zipmet[®]
sitagliptin / metformin



Safe Journey to a Better Balance

R-1120-ZPT-4947-AD

آگاهی از علائم مشترک مبتلایان امیکرون، به تشخیص و درمان هرچه سریع تر بیماری کمک بسزایی میکند، همچنین با شناخت علائم، از شیوع این بیماری جلوگیری میشود. به گزارش اقتصادآنلاین موارد ابتلا به کووید در سراسر دنیا بیش از پیش شده است، زیرا امیکرون قابلیت انتقال پذیری بالایی دارد و به سرعت در کل دنیا پراکنده شده است. طبق گفته پزشکان شما باید علائم امیکرون را بشناسید و از آن اطلاعات کافی داشته باشید تا در صورت ابتلا به آن، سریع تر متوجه شوید. در این قسمت نیز قصد داریم راجع به این موضوع صحبت کنیم.

چرا امیکرون شیوع بالایی دارد؟

طبق گفته پزشکان، هنوز در حال یادگیری اطلاعات زیادی در مورد سویه امیکرون هستیم اما چیزی که خیلی واضح است، این است که این ویروس سرعت انتقال و پراکندگی و تکثیر بسیار بالایی دارد. در نتیجه خیلی راحت تر فرار می کند و دیگران را هم درگیر می کند. سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری ها بر این باور است افرادی که به سویه امیکرون کرونا مبتلا شده اند، به راحتی این ویروس را به دیگران انتقال می دهند؛ حتی اگر واکسینه شده یا بدون علائم باشند.

علائم سرماخوردگی، علامت مشترک مبتلایان اومیکرون

بسیاری از افراد مبتلا به امیکرون علائمی شبیه به سرماخوردگی معمولی دارند. در مطالعه ای در نروژ به این نتیجه رسیدند که افراد مبتلا به امیکرون که واکسینه هم شده بودند، علائم مشابهی داشتند. رایج ترین علائم آن ها شامل سرفه در ۸۳ درصدشان، آبریزش بینی و گرفتگی بینی در ۷۸ درصد، خستگی و سستی بدن در ۷۴ درصد، سوزش گلو در ۷۲ درصد، سر درد ۶۸ درصد، تب در ۵۴ درصد، کاهش حس چشایی در ۲۳ درصد و کاهش حس بویایی در ۱۲ درصد آن ها دیده شده است و هیچ کدام نیاز به بستری شدن پیدا نکردند.

افراد واکسینه نشده هنوز هم به بستری شدن نیاز پیدا می کنند

طبق اطلاعات موجود از سمت کسانی که در مراکز درمانی فعالیت می کنند و در اورژانس ها و بیمارستان ها هستند، اعلام کرده اند که موارد شدید از این بیماری هم وجود دارند که نیاز به بستری شدن دارند و مربوط به افرادی می شود که واکسن تزریق نکرده اند. تست امیکرون جهش ها را شامل می شود و بیشتر از میزان ابتلا به دلتا و آلفا است اما این جهش ها خیلی راحت مورد تست و آزمایش قرار می گیرند. بعضی از تست های آنتی ژن که خیلی سریع انجام می شوند و حساسیت کمتری در تشخیص امیکرون دارند، هم برای آن ها انجام می شود و شاید نتیجه منفی کاذب داشته باشند.

سازمان غذا و داروی جهان قصد دارد که این تست های مختلف را بررسی کند و برند ها و کمپانی های معتبر را اعلام کند اما به طور کل زمانی که به کلینیک یا مرکز تست مراجعه می کنید، بسیار مهم است از فرد مورد نظر پرسید آیا این تست، امیکرون را هم نشان می دهد یا خیر؟

ادامه دارد...

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما هستیم.



ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژربویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



شرکت داروسازی زهرای تبریز - ایران

مدیریت تحول سازمانی


... ادامه

در تعریف دیگری از توسعه سازمانی، توسعه سازمانی یا تحول سازمانی، کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای توسعه برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها، ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان، تعریف شده است. (Cummins, 2009).

۲. انواع مدل های تحول سازمانی

۱،۲. برنامه های مدیریت تحول کامینگز و ورلی

در کتاب توسعه سازمان و تحول نوشته توماس کامینگز و کریستوفر اورلی (۲۰۰۹) مداخلات تحول سازمانی به شرح مدل زیر ارائه شده اند:



ادامه دارد...



دکتر کامران صحت

Nephrotonic®


100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.

Multivitamin for CKD patients

Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12	6 mcg
Vitamin B1	1.5 mg
Vitamin B2	1.7 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin E	50 mg
Vitamin B5	10 mg
Ascorbic acid	60 mg
Biotin	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide)	25 mg
Niacinamide	20 mg
Folic acid	1 mg



شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

برای نخستین بار، میزان هزینه کردن کشورها برای داروهای اساسی اندازه‌گیری شد و نتایج آن نشان دهنده شکاف بزرگی بین کشورهای فقیر و ثروتمند است.

پیام مستقیم و شفاف این مطالعه آن است که 'نیاز ضروری برای تامین مالی بیشتر به منظور برآورده کردن نیازهای سلامت کشورها وجود دارد'.
 آنالیز مورد اشاره توسط Lancet Commission انجام شده است که یک سید شامل ۲۰۱ داروی ضروری را مقیاس مطالعه خود قرار دادند.
 در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط هزینه تامین این سید دارویی بسیار پائین و نزدیک به "۱ تا ۲ دلار" به ازای هر نفر در ماه یا "۱۳ تا ۲۵ دلار" در سال می‌باشد. با وجود هزینه سرانه اندک تامین داروهای ضروری برای مردم، ۲۰٪ کشورها (یکی از هر پنج کشور) حتی از این هم کمتر برای تامین داروهای مردمشان هزینه می‌کنند که نشان‌دهنده بی‌عدالتی‌های بزرگی است.
 یک نگاه به هزینه‌های صرف شده توسط کشورهای گوناگون برای تامین داروهای ضروری، این شکاف نابرابر را در دسترسی مردم کشورها به این داروها نشان می‌دهد.

در سال ۲۰۱۰، میانگین هزینه سرانه صرف شده برای داروهای ضروری در سال، در ۳۲ کشور با درآمد پائین "۸/۸ دلار" بود.
 در ۴۸ کشور واقع در پائین طیف درآمد متوسط هزینه سرانه سالیانه صرف شده برای داروهای ضروری نزدیک به "۳۷ دلار" بود و در ۵۳ کشور واقع در بالای طیف درآمد متوسط این هزینه "۱۰۶ دلار" بود.
 در ۴۸ کشور با درآمد بالا "۴۵۹ دلار" در سال به ازای هر نفر صرف تامین داروهای اساسی می‌شود.
 یکی از کارشناسان این مطالعه می‌گوید، 'اگر کل دنیا را در نظر بگیریم، دنیا ۸ برابر بیشتر از هزینه واقعی سبد داروهای ضروری برای آن هزینه می‌کند!'

دو ماه پیش نیز سازمان ملل متحد گزارش بلندی را منتشر کرد و دولت‌ها را به اقدام برای اطمینان از دسترسی مردم به داروهای فرا خواند.
 گزارش ۸۴ صفحه‌ای Lancet در زمانی منتشر می‌شود که قیمت داروها و سودآوری شرکت‌های دارویی و هزینه‌های تحمیل شده بر سیستم سلامت و بیمه کشورها، در کانون نگاه جامعه قرار دارد.

این گزارش راه حل‌هایی را نیز پیشنهاد کرده است: سامانه‌هایی برای پایش مستمر امکان خرید و قیمت و دسترسی به داروها؛ اجرای سیاست‌های موجود در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی برای اجباری کردن licensing؛ ارزیابی‌های بهتر از فواید و ارزش داروها؛ جدا ساختن هزینه‌های R&D از قیمت داروها؛ و شفافیت بیشتر صنعت دارو.

پیشنهاد‌های دیگر این کمیسیون عبارتند از تجمیع تامین داروها؛ بهبود کیفیت داروها که در کشورهای فقیرتر اغلب پائین‌تر هستند؛ و جلوگیری از مصرف نابجای داروها به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها و اویپویدها.

یکی از راه حل‌های پیشنهادی دیگر این کمیسیون آن است که جامعه بین‌المللی یک مرکز تجمیع از امتیازهای انحصاری داروها patent pool تشکیل بدهد و آن امتیازها (patents) را به شرکت‌های ژنریک‌ساز در کشورهای دیگر اعطا کند.

بسیاری از این توصیه‌ها را بیشتر سازمان بهداشت جهانی نیز ارائه کرده بود.
 بهبود میزان دسترسی و قدرت خرید داروها به مشارکت و عمل چندین گروه از صنعت، دولت، سیستم سلامت، رگولاتورها و بخش حقوقی نیاز دارد.

به هر روی، نزدیک به ۲۰٪ کشورهای جهان پول کافی برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان ندارند.

 **Ropixon**[®]
Rosuvastatin

Panoramic Lipid Control

- Cutting LDL-C in Half¹
- Greater reduction in LDL-C after switching to Rosuvastatin²
- Increasing HDL-C with increasing the dose¹
- More effective at decreasing TG level¹



References:

1. Am J Cardiol. 2003; 92: 152-160.
2. Am Heart J. 2004; 147: 705-712.



Leventex[®]

Levetiracetam 100mg/ml


Oral Solution

- ✓ ایمنی و اثربخشی اثبات شده در کنترل بسیاری از انواع تشنج ها
- ✓ عوارض جانبی اندک و قابل تحمل برای بیمار
- ✓ قابل استفاده برای کودکان و بیماران مبتلا به اختلال بلع
- ✓ شروع بسیار سریع اثر درمانی (seizure-free state) در مقایسه با سایر داروهای ضد صرع رایج حتی با دوز اول
- ✓ فاقد تداخل از نظر متابولیسم کبدی و اتصال پروتئینی با داروهای غذا
- ✓ قابل استفاده در نارسایی کبدی بدون نیاز به تنظیم دوز و در نارسایی کلیوی با تنظیم دوز
- ✓ تایید شده توسط FDA برای مونوتراپی تشنج های با شروع پارشیال در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۱ ماه
- ✓ خط اول درمان میوکلونوس کور تیکال و خط دوم میوکلونوس سگمنتال نخاعی



Ureka[®] ER

Potassium Citrate 10mEq
Extended Release Tablets



- ✓ اثر بخشی بهتر و ایجاد نفخ کمتر نسبت به پتاسیم بیکربنات در اصلاح هایپوسیترا توری
- ✓ بر خلاف قلیایی کننده های ادراری حاوی سدیم در مبتلایان به اسیدوز توبولار کلیوی دیستانال، قادر به اصلاح سطح ادراری سیترات بدون افزایش دفع ادراری کلسیم می باشد.
- ✓ موثر در پیشگیری از تشکیل انواع سنگ های ادراری بویژه اگزالاتی و اوراتی
- ✓ موثر در کاهش چشمگیر ترشح کلسیم و اسید در ادرار و در نتیجه کاهش تحلیل استخوانی
- ✓ کاهش چشمگیر فرایند بزرگ شدن سنگ و در نتیجه عود سنگ های ادراری در کودکان و بزرگسالان پس از Shockwave Lithotripsy (SWL)
- ✓ داروی پیشنهادی طبق گایدلاین European Association of Urology برای درمان: هیپرکلسمی اوری، هیپراگزالوری، ترشح بیش از حد سدیم در ادرار، اسیدوز توبولار کلیوی، سنگ های سیستئینی

قُوْت بَگِير





لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان


Acnomiss®

Clindamycin Phosphate %1.2 , Tretinoin %0.025

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و ترتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا



 kmphealthcaregroup8

 www.kishmedipharm.com



Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد- لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوریه، راش شدید و آلپوسی آره آت





Pharmaceutical Labs Co.

CYSTINE B6+ZINC[®] RAZAK



*Nutritional Supplement
Improve the health of hair and nails*



Pharmaceutical Labs Co.

LOZAR-H RAZAK[®]

Losartan 50 / Hydrochlorothiazide 12.5

Return to the
Rhythm of life

Scan me



Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

Category:

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

Description:

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

Clinical Pharmacology:

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

Indications:

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

Contraindications:

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Precautions:

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

Dosage and Administration:

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

How Supplied:

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

Catosin Plus[®] 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Catosin Plus[®] 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



شرکت داروسازی دانش بنیان

میم دارو

میم دارو
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

داروسازی میم دارو

با دارا بودن

خطوط جامدات (انواع قرص و کپسول)

خط پودر (انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش)

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت، قطره، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com




+982122146014
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

mim
Daroo

میم دارو



تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت داروسازی میم دارو

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه
دانش بنیان میم دارو

✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز

✓ نیروی انسانی با تجربه

✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران

✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014
+982176250962



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com

Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگرم و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تورم، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران در End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به همودیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتمیما شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین / متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمیلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، ترامتین، تریمتوپریم، وانکومايسین گلیبوسید، فوروزامید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی توئین، نیکوتینیک اسید، سیمیتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیازید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل و پروبنسید

سیتاگلیپتین:

- سیکلوسپورین
- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.
- سولفونیل اوره ها مانند تولیوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگسمی) موثر باشد.

بسته بندی:

سیتاگلیپتین/متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار(سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید(متفورمین) می باشد که کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین/متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلولهای انسولین ساز لوزالمعده نمی شود بعلاوه منجر به بقای بیشتر این سلولها نیز می گردند.

مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱- Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاگون می تواند بر روی روند گلوکونوزیز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونوزیز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین/متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.
- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم بیمار تجویز گردد.

شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین/ متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin / Metformin



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN
Tel: (+9821) 6117 1510
Fax: (+9821) 6662 0175
E-mail: phtd@tolidaru.ir*


Tolidaru
Pharmaceutical Company

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (CRP، WBC، CT Scan، PO₂، PCR، ESR، LDH) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO₂ با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر[®] PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری کرونا

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی




+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

Treatment of Type 2 Diabetes

Double weapon against diabetes
for maximum effect.

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ببخند سلامتی،
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

www.idpa.org.ir

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.

Help your child breath easier with: **SINKAST[®]** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

گزینه برتر

سوال اول:

مرد ۲۳ ساله ای با تشخیص لوسمی حاد در بخش بستری است. درجه حرارت بیمار ۵/۳۹ و معاینه فیزیکی کانونی از عفونت را نشان نمی دهد. در آزمایشات بیمار WBC:1200 و Lymph:80% می باشد.

پس از گرفتن نمونه کشت ها کدام اقدام زیر وا پیشنهاد می کنید؟

- ۱- شروع درمان با سفنازیدیم
- ۲- شروع درمان با آمفوتریسین B
- ۳- شروع درمان با آمپی سیلین و جنتامیسین
- ۴- تجویز موقت استامینوفن جهت کنترل درجه حرارت تا آماده شدن پاسخ کشت

سؤال دوم:

خانم ۲۷ ساله پزشک به صورت ناگهانی از دیروز به دنبال طلاق از همسرش دچار حملات شبیه تشنج شده است. در بررسی های انجام شده هیچ دلیل مدیکال یافت نشده است. کدامیک از ویژگیهای زیر به نفع پیش آگهی بد است؟

- ۱- ضریب هوشی بالاتر از متوسط
- ۲- شروع ناگهانی علائم
- ۳- شروع به دنبال طلاق
- ۴- حمله شبیه تشنج

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج.ب.۲.
لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



شرکت های دارویی مطرح
می توانند جهت معرفی کلیه
ممصولات فود یک شماره از
ماهنامه را همراه با لوگوی
سفارشی به فود اقتصام دهند

برای هرچه بهتر شناخته شدن محصول خود با انتخاب برتر همراه شوید

- ارسال به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور
- ارسال به تمامی پزشکان منتخب با تخصص های مختلف در سراسر کشور
- شرکت در همایش ها و کنگره های پزشکی
- انتخاب برتر کوتاهترین راه برای ارتباط با مخاطب در کمترین زمان ممکن
- پزشکان محترم جهت دریافت ماهنامه نام و شماره نظام خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال نمایند

انتخاب
شماره دوازدهم اطلاعات دارویی
شماره دوازدهم - ۲۰۱۵ - سال پانزدهم - شماره اول - ۲۰۱۵

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

Antibiotics
Cardiology
CNS
Endocrine
Food Supplement
Gastroenterology
Gynecology
Infectious
Neurology
Oncology
Respiratory system
Rheumatology

Rizamelt®
Rizatriptan ODT 10 mg

تک‌کاجه

کافور ترپن، ایزوپرن، گوارانی، چمنستر، طرفولون، سورجس، سرخ‌دانه‌ای، کیمیاکاران، مداد

Tadribi Kala Jam Co. | 021-88888888 | 021-88888888

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمان‌زاده، دکتر علی حاجی‌ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب‌آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی‌لنگرودی



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:
بلوار میرداماد،
خیابان شمس تبریزی جنوبی
کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱
تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه‌نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می‌گردد. مسئولیت صحت آگهی‌ها بر عهده آگهی‌دهنده است. جهت جلوگیری از هرگونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه‌نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می‌باشند، می‌توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره پادما همکاری داشته اند

سینا دارو

www.sinadarou.com

عبیدی

www.doctor-abidi.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

لقمان

www.loghman-med.com

میم دارو

www.mimdaroo.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

الحاوی

www.alhavipharma.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.com

تولید دارو

www.tolidardu.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

رازک

www.razakpharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

زهرای

www.zahravi.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

