



RozaVit

Food Supplement

کاهش التهاب و
بهبود درد مفاصل

Maxijeno



Supplement Facts:			Serving size: 2 Tablets
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	
Glucosamine Hydrochloride	1500 mg	**	
Chondroitin Sulphate	800 mg	**	
MSM (Methylsulfonylmethane)	750 mg	**	
*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, **: RDA not established.			


روز دارو 
تاسیس: ۱۳۴۲
کیفیت تعهد ماست

ارتباط با ما:
وب سایت: <https://rouzdarou.com>
اینستاگرام: [Rozavit.ir](https://www.instagram.com/roza_vit)
تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

صفحه		صفحه	
دوم جلد	Analgesic	1	Food Suppriement
	Noblegin	5	Maxijeno
		7	Geriviton
17	Cardiology	16	Nephraotonic
24	Lozar-H	پشت جلد	Cystine B6+Zinc
روی جلد	Pozzarex	12	Maxijeno plus
	Pleron	9	Liposofer
			Novofer
		26	Herbal
	Dermal		Palminavir
14	Acnomiss		Respiratory system
15	Megacort	18	Catosin Plus
		30	Sinkast
	Endocrine	10	Venidil
3	Ziptin		Neurology
36	Empajent	سوم جلد	Esleexal
28	Metformin	11	Epilamid
22	Sitagliptin		Urology
		11	Ureka

Ziptin[®]
Sitagliptin

Zipmet[®]
sitagliptin / metformin



**Safe Journey to
a Better Balance**

بعد از پس روی شغلی، بر نقاط قوت خود تأمل کنید

پس روی شغلی یا وقفه در پیشرفت شغلی، برای همه اتفاق می افتد. ممکن است شما در رقابت با دیگران در به دست آوردن یک شغل برنده نشده باشید، یا اینکه موفق به ارتقا شغلی نشده باشید. اما شکست ها و فرصت های از دست رفته نمی توانند حرفه شما را مختل کنند و حتی گاهی می توانند آن را به جلو سوق دهند. برای اینکه افول و پس روی شغلی را با اعتماد به نفس پشت سر بگذارید، به رنج و ناراحتی حاصل از تأیید نشدن و شکست فکر کنید. پاسخ فیزیولوژیکی که در ذهن ایجاد می شود مشابه درد جسمی است، بنابراین این احساسات را انکار نکنید. سپس یک قدم عقب بردارید و وضعیت را ارزیابی کنید و نسبت به خودتان منصف باشید. آیا اتفاقی افتاده است که بتواند بر شما و مهارت های شما تأثیر بگذارد، یا مانند اغلب اوقات عواملی وجود داشتند که خارج از کنترل شما بودند؟ سپس یک تلاش آگاهانه برای نگاه به آینده داشته باشید. مدتی را صرف فکر کردن در مورد نقاط قوت خود و کاری که دوست دارید انجام دهید کنید و بررسی کنید چگونه می توانید از مهارت های شما استفاده کنید. ممکن است فرصت شغلی بعدی شما در جایی باشد که حتی به آن فکر نکرده باشید.

با خوش بینی، حتی در زمان های دشوار نیز افرادتان را رهبری کنید
شما حتی در شرایط دشوار هم می توانید با خوش بینی افرادتان را رهبری کنید و به تیم و مشتریان خود کمک کنید تا در بحبوحه عدم قطعیت ها، انعطاف پذیر باشند و مقاومت کنند. اولین قدم اینست که برای آنها الگو باشید. سخن گفتن به تنهایی جواب نمی دهد. همچنین، به خاطر داشته باشید که مثبت اندیشی در یک گروه نسبت به تفکر فردی، آسان تر است. بنابراین به کارکنان و افراد تیم خود کمک کنید تا ارتباطات خود را با یکدیگر تقویت کنند. این می تواند به سادگی جشن گرفتن هنگامی که یک تیم یا یک دپارتمان در یک رویداد مهم به موفقیت می رسند، باشد.
ابراز تفکر مثبت به صورت منظم می تواند کمک کننده باشد. با نشان دادن ارتباط واضح بین انرژی مثبت افراد و دستاوردهایشان، انگیزه آنها را حفظ کنید. این موضوع حتی ممکن است تیم های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد تا طرز فکر خود را تعدیل کنند. در این شکی نیست که اکنون اوضاع سخت است. اما به عنوان یک رهبر، شما این فرصت را دارید که دست از مقایسه خود با افراد همترانتان بردارید

یکی از مزایای شبکه های اجتماعی این است که به ما امکان می دهد با دوستان قدیمی و همکاران سابق خود در ارتباط باشیم. اما گاهی اوقات دیدن موفقیت های دیگران می تواند در ما احساس رقابت پذیری یا حتی احساس عقب ماندن از دیگران را ایجاد کند. چند راهکار وجود دارد که می توانید برای مقابله با این احساس ناخوشایند به کار ببرید. ابتدا عوامل محرک خود را ردیابی کنید و چیزهایی که شما را به سمت مقایسه خود با دیگران سوق می دهد، را شناسایی کنید. به عنوان مثال، آیا دوست یا همکار خاصی دارید که با دیدن دستاوردها و موفقیت های او احساس ناامنی می کنید؟ سپس برای افکار خود مجدداً چارچوب ایجاد کنید. به جای این فکر که خود را در رقابت با آن شخص ببینید، به موفقیت های او بدون غرض و از روی انصاف و واقع بینی نگاه کنید. از پیشرفت آنها چه می توانید بیاموزید؟ سپس با انجام کاری که در آن مهارت دارید، با عدم اعتماد به نفس در خود مقابله کنید. این به شما کمک می کند اعتماد به نفس خود را مجدداً به دست آورید و شاید این یک نیروی فزاینده و عزم حرکت شما به سمت دستیابی به اهدافتان باشد. و در نهایت، «بایدها» را کنار بگذارید. بایدها اغلب منجر به ناامنی دائمی می شوند. به جای آن، این احتمال را در نظر بگیرید که همه کارهایی که تاکنون انتخاب کرده اید انجام دهید، همیشه راه درستی بوده است، صرف نظر از اینکه می خواستید کاری را انجام بدهید یا دیگران دارند چه کاری انجام می دهند. شرایط را برای ایجاد دیدگاه مثبت جمعی در تیم خود فراهم کنید و از مزایای آن بهره ببرید. هنگامی که تیم خود از راه دور هدایت می کنید، از ایجاد فرهنگ سالم تیمی غافل نباشید

ادامه دارد...

دکتر پیام دین دوست

GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماری های ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال
۱۳۸۹

از

تا

با شما مییم.

اکنون



ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تهران - ایران

شرکت داروسازی زهراوی

مدیریت تحول سازمانی

بک هارد و هریس در چارچوب مدیریت تغییر خود، تغییر در سازمان را جنبشی برای حرکت از وضعیت حل (A) به سوی آینده (B) تلقی کرده اند و آن را مشتمل بر سه مرحله اساسی دانسته اند: درک اولیه نیاز به اعملی تغییر، اعمالی فرایند تغییر در سازمان، تمرین و انجام کار جدید. (Dawson & vilson, ۲۰۰۳).

رویکرد تغییر برنامه ریزی شده اکنون به طرز تحول سازمان آمیخته شده است و در واقع هسته مرکزی آن را تشکیل می دهد (Burnes, ۲۰۰۴). نظریه های مختلفی در این مورد وجود دارد به عنوان مثال اکرم، تحول را زیر مجموعه ای از تغییر می داند. وی سه رویکرد را در تغییر، تعریف می کند: تحولی، انتقالی و دگرگونی. اما شاید دقیق ترین نظریه ای تفاوت تغییر و تحول این است که تغییر در بخش آشکار سازمان (سازمان رسمی) است و تحول (سازمان رسمی) شامل بخش آشکار سازمان یا زمینه های رسمی آن می شود که عبارتند از: اهداف، تکنولوژی، ساختار خط مشی ها و جزییات عملیات، تولیدات و منابع مالی. بخش غیررسمی سازمان شامل فرضیات و اعتقادات، برداشت ها، ادراکات، احساسات، ارزش ها، روابط غیررسمی گروه می شود. (افجه، ۱۳۸۸: ۱۳۳)

تحول سازمان نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد. اساس آن بینش ها و آگاهی های حاصل از پویایی های گروهی و تئوری و عمل مرتبط با تغییر برنامه ریزی شده، استواراست. حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از تئوری ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسایل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل نماید. تحول سازمان از سازمان ها و هم چنین افرادی که در درون سازمان ها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند. همینطور در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروه ها و سازمان ها به کارکردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد. تغییر برنامه ریزی شده مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت و مجدانه در طی زمان، دارا بودن رویکردی اصولی و هدفدار و دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست. دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاری نظیر روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، نظریه سیستم ها، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و مدیریت بدست می آید. (فرنچ و بل، ۱۳۸۹: ۱۳)

تحول سازمانی فعالیت یا تلاشی بلندمدت است که از سوی مدیریت عالی حمایت و هدایت می شود. این تلاش به منظور اصلاح و بهبود چم انداز فعلی و آی سازمان، توانمند سازی اعضا، یادگیری فرایند حل مساله، از طریق مدیریت فرهنگ سازمان با تاکید خاص بر فرهنگ گروه های کاری رسمی و دیگر اواع گروه ها و به کارگیری نقش مشاور- تسهیل کننده و تئوری و فنون علوم رفتاری و پژوهش در عمل صورت گیرد. (فرنچ و بل، ۱۳۸۹: ۲۹)

ریچارد بکهارد، توسعه سازمانی را یک تلاش برنامه ریزی شده در پهنه سازمان، تحت نظر مدیریت ارشد برای افزایش اثربخشی و درمان سازمان از طریق مداخلات برنامه ریزی شده در فرایندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری می داند. (Beckhard, ۱۹۶۹). در تعریف دیگری از توسعه سازمانی، توسعه سازمانی یا تحول سازمانی، کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای توسعه برنامه ریزی شده و تقویت و تاکید بر استراتژی ها، ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان، تعریف شده است. (Cummings, ۲۰۰۹).

ادامه دارد...



دکتر کامران صحت


Nephrotonic[®]

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



Multivitamin for CKD patients



Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12	6 mcg
Vitamin B1	1.5 mg
Vitamin B2	1.7 mg
Vitamin B6	10 mg
Vitamin E	50 mg
Vitamin B5	10 mg
Ascorbic acid	60 mg
Biotin	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide)	25 mg
Niacinamide	20 mg
Folic acid	1 mg



شرکت داروسازی زهرای تبریز - ایران

متأسفانه تاکنون مشخص شده است عوارض کرونا می تواند بسیار متفاوت باشد و ویروس کرونا از نوک انگشتان پا تا فرق سر، رد پای خود را به جای می گذارد و به راحتی فرد مبتلا را بعد از بهبودی رها نمی کند. بعضی از علائم عوارض کرونا بر پوست و مو به محض ورود ویروس به داخل بدن نمایان می شوند و برخی دیگر دیرتر و حتی بعد از اتمام دوره بیماری بروز می کنند. محققان در حال تحقیق هستند تا منشأ این عوارض را پیدا کنند که چرا بدن بعد از ابتلا به این ویروس چنین واکنش هایی نشان می دهد. آیا واکنش سیستم ایمنی بدن نسبت به عفونت است یا اینکه هورمون ها در آن دخالتی دارند؟

علائم و عوارض کرونا بر پوست و مو

در ادامه برخی از این علائم و عوارض رایج را بیان می کنیم:

۱. برجستگی های کوچک قرمز

برجستگی های کوچک قرمز و یا لک های مسطح متعدد قرمز در نقاط مختلف بدن

۲. از عوارض کرونا قرمز شدن سفیدی چشم ها را می توان نام برد

یکی از عوارض کرونا قرمز شدن سفیدی چشم ها می باشد. زمانی که ویروس وارد چشم می شود ممکن است باعث بروز قرمزی یا دیگر علائم چشمی شود.

۳. ورم های کوچک به رنگ قرمز کبود

ورم های کوچک به رنگ قرمز کبود و دردناک در نواحی روی دست، پاشنه و انگشتان پا که گاهی مانند تاول شده و با خارش همراه هستند.

۴. کپیر

کپیر یا نقاط ملتهبی که دچار خارش می گردند و در اندازه های متفاوتی ایجاد می شوند و گاهی ممکن است ناحیه گسترده ای را در بر بگیرد. کپیرها ممکن است در عرض چند دقیقه یا چند ساعت از بین بروند و در ناحیه دیگری ظاهر شوند. در نهایت پس از ده روز به طور کامل درمان خواهند شد.

۵. تاول های پر از مایع ممکن است از عوارض کرونا بر پوست باشد!

تاول های آبدار تاول های کوچک مملو از مایعات هستند که ممکن است در اوایل بیماری یا در هر زمان، اغلب روی دست ها ظاهر شوند.

۶. کبودی و آبی شدن رنگ پوست

به دلیل انسداد عروق خونی به هنگام فعال شدن سیستم ایمنی در مقابل ویروس احتمال بروز کبودی و آبی شدن رنگ پوست وجود دارد.

۷. ریزش موها ممکن است یکی از عوارض کرونا باشد

ریزش موها به صورت گسترده ای بیماران کرونایی را درگیر کرده است. در این دوران باید ویتامین و آهن مورد نیاز بدن برای گذر از مرحله ریزش مو به درستی تامین شود و تا حد ممکن از اضطراب و استرس در این راستا جلوگیری شود. این حالت برای آقایانی که به طور ژنتیکی و ارثی ریزش مو و کچلی دارند ممکن است آغاز مرحله ناخوشایندی برای پیشرفت این حالت باشد. بهتر است افرادی که طاسی و ریزش موی الگوی مردانه دارند بیشتر از بقیه آقایان از سیستم ایمنی مراقبت نمایند. زیرا این الگو جزو مشکلات خود ایمنی می باشد.

واکنش های پوستی به علت فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی

بعضی از واکنش های پوستی مانند ورم، التهاب و تغییر رنگ پوست بر اثر کرونا به علت فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی خود بدن است نه حضور ویروس. طبق مطالعات انجام شده معمولا افرادی که دچار این ضایعات پوستی شده اند اکثرا همراه با سوزش، خارش و درد بوده است.

ادامه دارد ...

NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids

نووفر®

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال

- بالا ترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره : ۸۸۸۳۴۶۲۴

صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

www.novofer.ir IRC:1601323671161723





Venidil®
Formoterol fumarate 12 mcg

Stopiva®
Tiotropium 18 mcg

Tekavent®
Budesonide 200, 400 mcg

Diventin®
Budesonide/Formoterol fumarate
320/9 mcg

Satika®
Fluticasone propionate/Salmeterol
100/50, 250/50, 500/50 mcg

کپسول های حاوی پودر خشک استنشاقی (DPIs)

مزایای DPI ها نسبت به MDI ها:

- ✓ کار آیی بهتر نسبت به MDI در اغلب گروه های سنی.
- ✓ آموزش آسان تر به بیمار و یادگیری بهتر بیمار.
- ✓ سهولت در استفاده نسبت به MDI از نظر هماهنگ نمودن دم با زمان فشردن اینها لر.
- ✓ عدم نیاز به دم یار.
- ✓ شمارش آسان دوز و کاهش احتمال اشتباه در دریافت دوز تجویز شده.
- ✓ عدم نیاز به تخلیه کردن چند دوز دارو در هوا در زمان اولین نوبت استفاده و یا در مواردی که فواصل استفاده زیاد باشد در مقایسه با MDI
- ✓ فاقد گاز های پروپیلانت که برخی از آنها به لایه ازن آسیب می رسانند.
- ✓ دارای مواد جانبی کمتر نسبت به MDI
- ✓ بی خطر بودن پس ماند دستگاه استفاده شده برای محیط زیست.
- ✓ نداشتن خطر انفجار و مشکلات ناشی از آن در صورت قرار گیری در کنار آتش و یا اجسام داغ.



Epilamid®

Lacosamide 50, 100, 150, 200 mg

- ✓ تایید شده توسط FDA برای مونوتراپی و درمان چند دارویی تشنج‌های با شروع پارشیال، با یا بدون ژنرالیزه شدن، در بزرگسالان و کودکان بزرگتر از ۴ سال
- ✓ موثر در کنترل صرع پارشیال مقاوم به درمان
- ✓ عدم نیاز به کاهش دوز دارو در مبتلایان به اختلال عملکرد کلیوی خفیف تا متوسط ($30\text{mL/min} \leq \text{CLCR}$)
- ✓ آزادسازی ماده موثره بدون وابستگی به pH
- ✓ قابل استفاده در افراد مبتلا به نارسایی شدید کلیه و تحت دیالیز با تنظیم دوز
- ✓ قابل استفاده در اختلال عملکرد خفیف تا متوسط کبدی با تنظیم دوز



قُوت بڭير





لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان



Acnomiss®

Clindamycin Phosphate 1.2% , Tretinoin 0.025%

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و ترتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا





Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد-لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبور، راش شدید و آلپسی آره آت



kmphealthcaregroup8



www.kishmedipharm.com



Pharmaceutical Labs Co.

CYSTINE B6+ZINC[®] RAZAK



*Nutritional Supplement
Improve the health of hair and nails*



Pharmaceutical Labs Co.

LOZAR-H[®] RAZAK

Losartan 50 / Hydrochlorothiazide 12.5

Return to the
Rhythm of life

Scan me



Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone 125 / Salmeterol 25 - Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Category:

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

Description:

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

Clinical Pharmacology:

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

Indications:

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

Contraindications:

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Precautions:

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chickenpox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

Dosage and Administration:

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

How Supplied:

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

Catosin Plus[®] 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Catosin Plus[®] 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



شرکت داروسازی دانش بنیان

میم دارو

mim
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

داروسازی میم دارو

با دارا بودن

خطوط جامدات (انواع قرص و کپسول)

خط پودر (انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش)

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت ، قطره ، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com



+982122146014
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

mim
Daroo

میم دارو

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه پایدار

شرکت داروسازی میم دارو

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه
دانش بنیان میم دارو

- ✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز
- ✓ نیروی انسانی با تجربه
- ✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران
- ✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014
+982176250962



www.mimdaroo.com
info@mimdaroo.com

Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فراورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B ۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فراورده توصیه می شود.

- درضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنافیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگما و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تروما، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به هودیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتمیا شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین / متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمیلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانتیتیدین، تریامترن، تریمتوپریم، وانکومایسین گلیبوریید، فوروزماید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فنوتیازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی تونین، نیکوتینیک اسید، سیمپاتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلامفیکل و پرونیسید

سیتاگلیپتین:

- سیکلوسپورین
- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.
- سولفونیل اوره ها مانند تولبوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگسمی) موثر باشد.

بسته بندی:

سیتاگلیپتین / متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار (سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید (متفورمین) می باشد که کاهنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین / متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلول های انسولین ساز لوزالمعده نمی شوند علاوه بر بقای بیشتر این سلول ها نیز می گردند.

مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینترتین (Incretin) در بدن می شود. اینترتین که به نام ۱- Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاگون می تواند بر روی روند گلوکونئوز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینترتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونئوز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین / متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مصرف بیمار تجویز گردد.

شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین / متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin / Metformin



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN
Tel: (+9821) 6117 1510
Fax: (+9821) 6662 0175
E-mail: phtd@tolidaru.ir*


Tolidaru
Pharmaceutical Company

Pozzarex[®]

Help your patients live **wholeheartedly** with **Pozzarex** (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($\text{GFR} < 60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021) - 44981001-5

(021) - 44986866

پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (CRP، WBC، CT Scan، PO_2 ، PCR، ESR، LDH) کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO_2 با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر® PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری **کرونا**

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی




+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

Treatment of Type 2 Diabetes

**Double weapon against diabetes
for maximum effect.**

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ربخند سلامتی،
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

www.idpa.org.ir

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.

Help your child breath easier with: **SINKAST[®]** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 mililiters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet.**
If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singlair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

سوال اول:

خانم ۵۰ ساله ای با سابقه درد در قسمت مدیال زانو از سه ماه قبل که هنگام راه رفتن و دو زانو نشستن تشدید می شود؛ به درمانگاه مراجعه نموده است. در معاینه مختصری هایپرتروفی سینوویال دارد و در رادیوگرافی ساده، sharpening لبه های استخوان کشکک مشهود است. اقدام بعدی چیست؟

- ۱- انجام CR scan زانو
- ۲- فیزیوتراپی جهت تقویۀ عضلات چهارسر
- ۳- تزریق داخل مفصلی کورتیکواستروئید طولانی اثر
- ۴- آرتروسکوپی

سوال دوم:

بیمار مرد ۳۰ ساله ای است که به گفته اطرافیان از یک هفته قبل به دنبال حضور در یک تصادف شدید رانندگی که منجر به مرگ چند نفر از بستگان وی شده است؛ دچار بیخوابی، کابوس و بیقراری شده است. در معاینه بیمار شدیداً مضطرب است. اگرچه در هنگام معاینه تمرکز کافی ندارد ولیکن هوشیاری وی مختل نیست. او معتقد است که تصادف رانندگی در اثر توطئه دشمنان او ایجاد شده است و آنها قصد کشتن او را هم دارند و صدای چند نفر را هم می شنود که او را تهدید به قتل می کنند. محتملترین تشخیص کدامست؟

- ۱- PTSD
- ۲- Brief Psychotic Disorder
- ۳- Panic Disorder
- ۴- Delirium

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ۱، ۲، ۳.
لطفاً پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



شرکت های دارویی مطرح
می توانند جهت معرفی کلیه
ممصولات خود یک شماره از
ماهانامه را همراه با لوگوی
سفارشی به خود اختصاص دهند

برای هرچه بهتر شناخته شدن محصول خود با انتخاب برتر همراه شوید

- ارسال به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور
- ارسال به تمامی پزشکان منتخب با تخصص های مختلف در سراسر کشور
- شرکت در همایش ها و کنگره های پزشکی
- انتخاب برتر کوتاهترین راه برای ارتباط با مخاطب در کمترین زمان ممکن
- پزشکان محترم جهت دریافت ماهنامه نام و شماره نظام خود را به شماره پیامک ۰۷۴۶۴۴ ۳۰۰۰ ارسال نمایند

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

ANTIBIOTICS
CARDIOLOGY
CNS
ENDOCRINE
FOOD SUPPLEMENT
GASTROENTEROLOGY
GYNECOLOGY
INFECTIOUS
NEUROLOGY
ONCOLOGY
RESPIRATORY SYSTEM
RHEUMATOLOGY

PLERON®
Eplerenone 25, 50 mg

تدفیک دارو و تغذیه: راهنمای کاربردی برای پزشکان و داروسازان. شماره ۲۰۵۸: بهار ۱۳۹۸. شماره ۲۰۵۸: بهار ۱۳۹۸.

تدفیک دارو و تغذیه: راهنمای کاربردی برای پزشکان و داروسازان. شماره ۲۰۵۸: بهار ۱۳۹۸. شماره ۲۰۵۸: بهار ۱۳۹۸.

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح و گرافیک:** امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونی، دکتر مهران زمانزاده،
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده
فاطمه علوی لنگرودی




Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. برای بهترین نظر- پیشنهاد
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.

شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند:

سینا دارو

www.sinadarou.com

عبیدی

www.doctor-abidi.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharma.com

لقمان

www.loghman-med.com

میم دارو

www.mimdaroo.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

توسعه تجارت قطره حیات

Office@tghpharma.com

الحاوی

www.alhavipharma.com

تدبیر کالا جم

www.tadbirkala.com

تولید دارو

www.tolidaru.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

رازک

www.razakpharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

زهرآوی

www.zahravi.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♥ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♥ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♥ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♥ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♥ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♥ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

