



کاهش التهاب و  
بهبود درد مفاصل

**RozaVit**

Food Supplement

# Maxijeno **Plus**

Supplement Facts:		Serving size: 3 Tablets
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Glucosamine Hydrochloride	1500 mg	**
Chondroitin Sulphate	1200 mg	**
MSM(Methylsulfonylmethane)	500 mg	**
Hyaluronic acid	40mg	**

\*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram \*\*; RDA not established



**RozaVit**  
Food Supplement

**ROUZ DAROU**  
Since 1963  
Quality is our Commitment



ارتباط با ما:  
Rozavit.ir  
تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

صفحه		صفحه	
	<b>Cardiology</b>		
سوم جلد	Lozar-H	9	Novofer
24	Pozzarex	12	Liposofer
10	Macitentan	پشت جلد	Pro vitamin
11	Pleron		
	<b>Dermal</b>		<b>Herbal</b>
14	Acnomiss	26	Palminavir
15	Megacort		<b>Respiratory system</b>
16	Collagen Gold	18	Catosin Plus
	<b>Endocrine</b>	30	Sinkast
17	Ziptin		<b>Neurology</b>
36	Empajent	دوم جلد	Thiothixene
28	Metformin		
22	Sitagliptin		<b>Urology</b>
	<b>Food Suppriement</b>	روی جلد	Blatak
1	Maxijeno Plus		
3	Maxijeno		
5	Geriviton		
7	Nephraotonic		



**RozaVit**

Food Supplement

کاهش التهاب و  
بهبود درد مفاصل

# Maxijeno

Supplement Facts:		Serving size: 2 Tablets
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Glucosamine Hydrochloride	1500 mg	**
Chondroitin Sulphate	800 mg	**
MSM (Methylsulfonylmethane)	750 mg	**

\*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, \*\*: RDA not established.



**RozaVit**  
Food Supplement

**ROUZ DAROU**  
Since 1963  
Quality is our Commitment



Rozavit.ir  
تماس: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:

**در وضعیتی که پاندمی، محدودیت ها و تعطیلی های زیادی را به بسیاری از جنبه های زندگی تحمیل کرده است، نحوه تطابق با محیط و گذران وقت به خود شما بستگی دارد.**  
از نظر احساسی خودتان را برای ورود به دوران بازنشستگی آماده کنید

وقتی حرف از بازنشستگی به میان می آید، اغلب ما بیشتر از هر چیز بر امور مالی تمرکز می کنیم و به این فکر می کنیم که چگونه زندگی خود را بدون درآمد ثابت حفظ کنیم؟ اما در نظر گرفتن جنبه احساسی هم به اندازه مسائل مالی مهم است و باید قبل از رسیدن به سن بازنشستگی به آن فکر کنید. چگونه می توانید خود را برای یک انتقال خوشایند به این دوران آماده کنید؟ داشتن روابط نزدیک، ضامن شادی و خوشبختی در این دوران است. بنابراین روی روابط خود با خانواده و دوستان سرمایه گذاری کنید و هنگامی که به پایان دوران کاری خود نزدیک می شوید، شبکه هایی فراتر از دفتر کاری خود بسازید. می توانید از طریق مواردی مانند انجام کارهای داوطلبانه در جامعه، سرگرمی های گروهی، یا راهنمایی و مشاوره دادن به کارآفرینان تازه کار و سایر افراد در زمینه کاری خود شبکه سازی کنید. همچنین می توانید به عنوان مشاور یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها یا سازمان های غیرانتفاعی به صورت پاره وقت یا موقت همکاری کنید. اگرچه ممکن است فکر کردن به این گزینه ها تشویش آور به نظر برسد، اما ارزش این را دارد که برای چگونگی تعامل، برقراری ارتباط و اتصال در هنگام ورود به این فصل جدید زندگی، از قبل برنامه ریزی کنید. امروز و هر روز قدردانی و سپاس گزاری کنید

با وجود اینکه بسیاری از ما در زندگی حرفه ای و شخصی خود موقعیت های متعددی برای قدردانی از دیگران داریم، اما اغلب فرصت تشکر کردن را به خصوص، در محیط کار از دست می دهیم. ابراز سپاس و قدردانی، یک فرصت است که نباید آن را از دست داد. تحقیقات نشان می دهد که قدردانی و سپاسگزاری کردن، در شما احساس و تجربیات مثبت ایجاد می کند و می توانید با شرایط استرس زا کنار آمده و روابط خود را با همکاران تقویت کنید.

ارسال پیام تشکر نیز می تواند تأثیرات قدرتمند و طولانی مدت بر گیرنده پیام داشته باشد و فرد دریافت کننده یک پیام تشکرآمیز، به دلیل توانایی کمک به دیگران احساس با ارزش بودن و انگیزه بیشتر خواهد داشت. بنابراین از همین امروز از همکاران، مربیان، مدیران، خانواده، دوستان یا هر کسی که در مسیر شغلی یا زندگی شخصی به شما کمک کرده است تشکر کنید و منتظر نمانید یک سال بعد دوباره این کار را انجام دهید!

چه مدیرعامل باشید و یا شخصی که در جستجوی اولین شغل خود می باشد، به این فکر باشید که قدردانی و سپاسگزاری را در برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه خود بگنجانید. این کار مسیر سفر حرفه ای یا شخصی شما را، به هر کجا که می روید، کمی روشن تر می کند.

ادامه دارد...

دکتر پیام دین دوست

# GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای  
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



از سال  
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما میم.



## ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company


Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548

**ZAHRAVI**  
PHARMACEUTICAL CO.

شرکت داروسازی زهراوی - تبریز - ایران

۲،۲ مدل تحول سازمانی وانر بورک  
این مدل به شرح زیر می باشد:



نمودار شماره ۲: مدل وانر بورک (Warner Burke.W and Lake.Dale G and Paine.Jil)

رویکرد پذیرنده برای کاهش مانع احساسی و رویکرد تسهیل کننده برای کمک کردن به افراد در مواجه شدن با موقعیت های معین به منظور انجام بهتر کار استفاده می شود. رویارویی و تجویز در موقعیت ایستا و منجمد با ارائه گزینه هایی بسیار مفید می باشد. از اصول، تئوری ها و مدل ها برای فهم پیش بینی محیط فیزیکی، تکنولوژی جدید و توسعه اجتماع به طور چشمگیری استفاده می شود.

۳،۲ مدل تحول سازمانی اکرمین و اندرسن

این نویسندگان تحول سازمانی را در سه سطح طبقه بندی می کنند.

ادامه دارد...



دکتر کامران صحت


# Nephrotonic®

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



## Multivitamin for CKD patients



### Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12 .....	6 mcg
Vitamin B1 .....	1.5 mg
Vitamin B2 .....	1.7 mg
Vitamin B6 .....	10 mg
Vitamin E .....	50 mg
Vitamin B5 .....	10 mg
Ascorbic acid .....	60 mg
Biotin .....	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) .....	25 mg
Niacinamide .....	20 mg
Folic acid .....	1 mg



شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

## رای مثبت کمیته مشاوره‌ای FDA برای داروی دیابت نوع ۲ جدید Novo Nordisk

روز ۱۸ اکتبر، پانل مشاوره‌ای سازمان غذا و داروی آمریکا، به داروی دیابت نوع ۲ تزریقی یک بار در هفته جدید شرکت Novo Nordisk رای مثبت ۱۶-۰ داد و تایید آن را به FDA توصیه کرد. این دارو یک آنالوگ GLP-1 است و با نام علمی semaglutide که شرکت نوو نوردیسک درخواست تایید آن را دسامبر سال گذشته به FDA و EMA هر دو فرستاد. این دارو در کارآزمایی بالینی خود بر روی ۸,۰۰۰ بیمار هم به بهبود کنترل قند خون و هم کاهش وزن خوب انجامید. کارآزمایی Semaglutide در بیماران مصرف‌کننده متفورمین، در مقایسه با (Trulicity Lilly) داده‌های قوی و امیدوارکننده‌ای به دست داده بود. اعلام نظر پانل مشاوره‌ای به ۵/۱٪ افزایش قیمت سهام شرکت Novo انجامید. این دارو هم اکنون در ژاپن نیز منتظر تایید است و خبر مهم‌تر آنکه Novo فرمول خوراکی آن را هم در دست توسعه دارد که الان در کارآزمایی فاز ۳ است.

داروهای آنالوگ GLP-1 گروه شناخته شده‌ای از داروهای دیابت نوع ۲ هستند که توسط سه شرکت در بازار حضور دارند:

Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly

پیش از آنکه لیلی (Dulaglutide Trulicity) را به بازار بدهد، رهبر بازار با فاصله زیاد از دیگران داروی Liraglutide (Victoza) شرکت نوو نوردیسک بود که نزدیک به ۷۰٪ نسخه‌های این اندیکاسیون را در بازار آمریکا به خود اختصاص می‌داد. اما، به بازار آمدن Trulicity که دوز یک بار در هفته در برابر دوز یک بار در روز Victoza دارد، این برتری Novo در بازار را تا اندازه زیادی گرفت. با تایید احتمالی Semaglutide به ویژه آنکه در کارآزمایی سر به سر با Trulicity مقایسه شده است، شرکت Novo می‌تواند بخشی از سهم بازار از دست رفته را از لیلی پس بگیرد. نشست FDA برای بررسی Semaglutide قرار است در تاریخ ۵ دسامبر انجام شود و معمولاً این سازمان از رای کمیته‌های مشاوره‌ای خود تبعیت می‌کند. در هر صورت، قله بعدی که Novo هدف قرار داده است، به تایید رساندن شکل خوراکی این دارو است که البته انتظار نمی‌رود زودتر از سال ۲۰۲۰ به بازار برسد. ولی در صورت موفقیت آن، دوباره Novo بر سکوی رهبری بازار کلاس GLP-1 خواهد ایستاد.

ادامه دارد...



# NOVOFER<sup>®</sup>

Iron Supplement Drops for kids

# نووفر<sup>®</sup>

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال


- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره : ۸۸۸۳۴۶۲۴

صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

www.novofer.ir IRC:1601323671161723





# Macitentan

24<sup>H</sup>  
Once  
Daily



- ✓ مصرف یک بار در روز و بدون نیاز به تیتراسیون دوز
- ✓ نیاز کمتر به پایش آنزیمهای کبدی در مقایسه با بوستتان
- ✓ کاهش خطر پیشرفت بیماری و کاهش نیاز به بستری در مبتلایان به فشار خون بالای شریان ریوی (PAH)
- ✓ احتمال کمتر بروز عوارض جانبی در مقایسه با بوستتان
- ✓ عدم تفاوت قابل توجه کارایی و ایمنی این دارو در سالمندان با بیماران جوان
- ✓ کاهش موارد مرگ و میر بیماران مصرف کننده دارو در مقایسه با پلاسبو
- ✓ نیمه عمر طولانی تر، اثر بخشی پایدار تر (اتصال طولانی مدت تر به گیرنده هدف) و نفوذ بافتی بیشتر در مقایسه با سایر آنتاگونیستهای اندوتلین مورد تایید FDA
- ✓ احتمال کمتر بروز آدم محیطی در مقایسه با بوستتان و امبر یستانان
- ✓ تداخل دارویی کمتر در مقایسه با بوستتان



# PLERON<sup>®</sup>

Eplerenone 25, 50 mg Tablet



- ✓ کاهش مرگ و میر بیماران با علائم نارسایی قلبی دارای  $LVEF \leq 40\%$  پس از انفارکتوس حاد میوکارد
- ✓ آنتاگونیست انتخابی گیرنده آلدوسترون
- ✓ نداشتن عوارض جانبی وابسته به هورمون های جنسی (کاهش لیبیدو و ژنیکوماستی) به علت عدم تاثیر بر گیرنده های آندروژنی و پروژسترونی
- ✓ فرموله شده توسط شرکت سینتون اسپانیا

# قُوْت بَگِير





# لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان

# Acnomiss<sup>®</sup>

Clindamycin Phosphate %1.2 , Tretinoin %0.025

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و ترتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا





# Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد- لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوره، راش شدید و آلپسی آره آت




# COLLAGEN GOLD

Protect and Restore  
Your Beauty from Within

Improves skin firmness and delays skin aging

- ✓ Reduces skin wrinkle depths
- ✓ Eliminates blemishes and inflammation caused by laser and sun
- ✓ Improvement in effects of gels and fillers and other skin cares
- ✓ Cellulite reduction
- ✓ Reduces stretch marks




**2500 mg Marine Collagen**  
(per serving size)

**5000 mg Marine Collagen**  
**80 mg Vitamin C, 50 mg Hyaluronic Acid**



**Ziptin**<sup>®</sup>  
sitagliptin

**Zipmet**<sup>®</sup>  
sitagliptin / metformin



**Safe Journey to  
a Better Balance**

Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

**Category:**

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

**Description:**

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

**Clinical Pharmacology:**

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

**Indications:**

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

**Contraindications:**

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

**Precautions:**

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

**Pregnancy and Lactation:**

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

**Adverse Reactions:**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

**Dosage and Administration:**

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

**How Supplied:**

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

# Catosin Plus<sup>®</sup> 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

# Catosin Plus<sup>®</sup> 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



شرکت داروسازی دانش بنیان

# میم دارو

**میم**  
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

**داروسازی میم دارو**

با دارا بودن

خطوط جامدات (انواع قرص و کپسول)

خط پودر (انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش)

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت، قطره، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



[www.mimdaroo.com](http://www.mimdaroo.com)  
[info@mimdaroo.com](mailto:info@mimdaroo.com)



+982122146014  
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

**mim**  
Daroo

**میم دارو**



تولید قراردادی راهی به سمت توسعه پایدار



**شرکت داروسازی میم دارو**

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی  
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه  
دانش بنیان میم دارو

- ✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز
- ✓ نیروی انسانی با تجربه
- ✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران
- ✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014  
+982176250962



www.mimdaroo.com  
info@mimdaroo.com

# Sitagliptin 25, 50 mg

## Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B ۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنفیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگما و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دبابات اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تروما، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به هودیا لیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسیمیا مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتیمیا شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی:

#### سیتاگلیپتین / متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمپلورید، دیگوکسین، سورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، ترامترن، تریمتوپریم، وانکومایسین گلیبوریید، فوروزاماید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فئوتازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی تونین، نیکوتینیک اسید، سیمپاتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلامفنیکل و پرونیسید

#### سیتاگلیپتین:

##### سیکلوپوزیرین

- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.

- سولفونیل اوره ها مانند تولبوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگلیسمی) موثر باشد.

#### بسته بندی:

سیتاگلیپتین / متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار (سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید (متفورمین) می باشد که کاهشنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

#### موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

#### مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین / متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلول های انسولین ساز لوزالمعده نمی شوند علاوه منجر به بقای بیشتر این سلول ها نیز می گردند.

#### مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱-Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاکون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاکون می تواند بر روی روند گلوکونوزوز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونوزوز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

#### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین / متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

#### سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

##### گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مصرف بیمار تجویز گردد.

#### شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین / متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

#### موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



# *Sitagliptin 25, 50 mg*

## *Sitagliptin / Metformin*



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar  
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN  
Tel: (+9821) 6117 1510  
Fax: (+9821) 6662 0175  
E-mail: [phtd@tolidaru.ir](mailto:phtd@tolidaru.ir)*

  
***Tolidaru***  
*Pharmaceutical Company*

# Pozzarex<sup>®</sup>

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

**Dosage Forms:** Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

## Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

**Dosage:** Adults

## Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

## Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio  $\geq 300$  mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Dosage Modifications

### Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

### Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

## Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

## Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ( $GFR < 60$  ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)

## Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.



# Pozzarex®


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25  
mg

50  
mg



PURSINA  
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

# پالمینا ویر

## بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (PCR، ESR، LDH، CRP، WBC، CT Scan، PO<sub>2</sub>) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با  $P \text{ value} \leq 0.001$  و شاخصهای WBC و PO<sub>2</sub> با  $P \text{ value} \leq 0.05$  تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

### محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

### مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

### موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

### نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

# پالمیناویر<sup>®</sup> PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات  
بیماری کرونا

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان  
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات  
تنفسی



+98 21 66577724-26



[www.palminavir.yasdaru.co.ir](http://www.palminavir.yasdaru.co.ir)



[info@yasdaru.co.ir](mailto:info@yasdaru.co.ir)



# METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

## Treatment of Type 2 Diabetes

Double weapon against diabetes  
for maximum effect.

سازمان مردم نهاد  
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ببخند سلامتی،  
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

[www.idpa.org.ir](http://www.idpa.org.ir)

# Help your child breathe easier with: **SINKAST<sup>®</sup>** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

## How to use?

### For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

## When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

## Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

## Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



# Sinkast



**14**  
Sachets


Montelukast (as Sodium) 4 mg



■ Help  
■ Your  
■ Child  
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



(021)-44981001-5

(021)-44986866

## سوال اول:

مرد جوانی به خاطر خارش و سوزش در ناحیه کشاله ران مراجعه نموده است. در شرح حال معلوم می گردد که این علایم از یکهفته قبل پیدا شده است که در ابتدا محدود بوده و کم کم پیشرفت کرده است. در معاینه ضایعه به صورت پچ های اریتماتو پوسته دار می باشد. کدام تشخیص کمتر مطرح می گردد؟

۱-اریتراسما

۲-انتر تریگو

۳-درماتوفیتوزیس

۴-پسوریازیس

## سوال دوم:

خانم جوانی به دلیل تب بالا و تاول هایی که به صورت حاد در دهان، ملتحمه و ژنیتالیا ظاهر شده است؛ مراجعه نموده است. در معاینه بر روی لب های بیمار، دلمه های خونی و بر روی تنه وی ماکول های پورپوریک به صورت منتشر دیده می شود. شایع ترین علت این بیماری کدام است؟

۱-بدخیمی داخلی

۲-عفونت هرپس سیمپلکس

۳-عفونت مایکو پلاسما پنومونیه

۴-دارو ها

## شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج۱، ج۲، ب.  
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی





شرکت های دارویی مطرح  
می توانند جهت معرفی کلیه  
ممصولات فود یک شماره از  
ماهنامه را همراه با لوگوی  
سفارشی به فود اقتصاص دهند

# برای هرچه بهتر شناخته شدن محصول خود با انتخاب برتر همراه شوید

- ارسال به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور
- ارسال به تمامی پزشکان منتخب با تخصص های مختلف در سراسر کشور
- شرکت در همایش ها و کنگره های پزشکی
- انتخاب برتر کوتاهترین راه برای ارتباط با مخاطب در کمترین زمان ممکن
- پزشکان محترم جهت دریافت ماهنامه نام و شماره نظام خود را به شماره پیامک ۰۷۴۶۴۴۰۰۳۰ ارسال نمایند



**انتخاب ویژه سایر اطلاعات دارویی**  
شماره دوست و ده - ۲۰ - صفحه - سال نوزدهم - نیمه اول اردیبهشت ۱۴۰۱

**Pharmaceuticals & Nutraceuticals**

Antibiotics  
Cardiology  
CNS  
Endocrine  
Food Supplement  
Gastroenterology  
Gynecology  
Infectious  
Neurology  
Oncology  
Respiratory system  
Rheumatology

**Blatek®**  
Bethanecol chloride 10mg

تک تک به تکلیف بهتر مثله در قدر ادعای آسیب نه انجمنی برای مثله هیو نونک  
فکلی استغاده در کاشن مرفی انی کوشن ز کتور کتور ویزو اسید  
تایید شده توسط FDA کولر درمان احتباس ادراری غیر استمداوی بعد از امان و با جراحی  
تایید شده توسط FDA کولر درمان احتباس ادراری ناشی از آنژیس نوروزیک مثله

Tekajee  
Tehran Kala Jam Co.  
@entk\_bartar  
www.entkhab-e-bartar.ir

- **صاحب امتیاز:** کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- **مدیر اجرایی:** مهندس امیرحسین محمدی
- **مدیر بازرگانی:** فرحناز خدمتی
- **مدیر مالی و اداری:** هانیه حق بین
- **طراح و گرافیک:** امیر روشنی

### • همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیاه، دکتر مهران زمان زاده،  
دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت،  
دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده  
فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد.  
مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است.  
جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را  
قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید.  
پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام  
پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند.  
پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره  
پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد  
و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد.  
پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری  
با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



  
**Instagram**  
entk\_bartar  
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

# شرکت هایی که در این شماره پادما همکاری داشته اند

سینا دارو

[www.sinadarou.com](http://www.sinadarou.com)

عبیدی

[www.doctor-abidi.com](http://www.doctor-abidi.com)

کوبل دارو

[www.cobeldarou.com](http://www.cobeldarou.com)

کیش مدیفارم

[www.kishmedipharm.com](http://www.kishmedipharm.com)

لقمان

[www.loghman-med.com](http://www.loghman-med.com)

میم دارو

[www.mimdaroo.com](http://www.mimdaroo.com)

یاس دارو

[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)

توسعه تجارت قطره حیات

[Office@tghpharma.com](mailto:Office@tghpharma.com)

الهاوی

[www.alhavipharma.com](http://www.alhavipharma.com)

تدبیر کالا جم

[www.tadbirkala.com](http://www.tadbirkala.com)

تولید دارو

[www.tolidardu.ir](http://www.tolidardu.ir)

پورسینا

[www.pursinapharma.com](http://www.pursinapharma.com)

پارس دارو

[www.parsdarou.ir](http://www.parsdarou.ir)

رازک

[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

روز دارو

[www.rouzdarou.com](http://www.rouzdarou.com)

زهرابی

[www.zahravi.com](http://www.zahravi.com)

# THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT  
WORKS IN MULTIPLE WAYS

## امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

