

COLLAGEN GOLD

Protect and Restore
Your Beauty from Within

Improves skin firmness and delays skin aging

- ✓ Reduces skin wrinkle depths
- ✓ Eliminates blemishes and inflammation caused by laser and sun
- ✓ Improvement in effects of gels and fillers and other skin cares
- ✓ Cellulite reduction
- ✓ Reduces stretch marks



2500 mg Marine Collagen
(per serving size)

5000 mg Marine Collagen
80 mg Vitamin C, 50 mg Hyaluronic Acid

صفحه		صفحه	
	Cardiology		Food Suppriment
پشت جلد	Brilavus	دو جلد	Pyasidin300
سه جلد	Lozar-h	3	Roza Vit
25	Pozzarex	5	Cyctine b6 zinc
	Dermal	7	Zinc Plus
1	Gollagen gold	9	Renal aid
20	Acnomiss	10	Sideral Gocce
21	Megacort	11	Ginkgo Biloba
	Erectile	13	Liposofer
روی جلد	Viagra	17	Pedilact
	Endocrine		Herbal
36	Empajent	27	Palminavir
28	Metformin		Respiratory System
23	Sitagliptin	15	Sinkast
		19	Catosin Plus

Sense of Beauty & Power




Muscle Building



Slower Digesting Protein & Satiety



Between Meals or Before Bed



Casein Protein + Multivitamin & Minerals

Casein Benefits:

- ✓ Muscle growth¹
- ✓ Decreased hunger^{2,3}

References:

- 1- Wilborn CD, Taylor LW, Outlaw J, Williams L, Campbell B, Foster CA, Smith-Ryan A, Urbina S, Hayward S. The Effects of Pre- and Post-Exercise Whey vs. Casein Protein Consumption on Body Composition and Performance Measures in Collegiate Female Athletes. J Sports Sci Med. 2013 Mar 1;12(1):74-9. PMID: 24149728; PMCID: PMC3761774.
- 2- Allenas Rde C, Bressan J, Paiva AC. Effects of protein quality on appetite and energy metabolism in normal weight subjects. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2010 Feb;54(1):45-51. doi: 10.1590/s0004-2730201000100008. PMID: 20414547.
- 3- Abou-Samra R, Keersmaekers L, Brienza D, Mukherjee R, Macé K. Effect of different protein sources on satiation and short-term satiety when consumed as a starter. Nutr J. 2011 Dec 23;10:139. doi: 10.1186/1475-2891-10-139. PMID: 22196620; PMCID: PMC3295702.



وقتی آینده نامعلوم است به کارکنان کمک کنید هر روز بر روی کارهای خوب تمرکز کنند.

یکی از بزرگترین چالش‌های مدیریت افراد، هدایت آنها در موقعیت‌هایی است که آینده نامشخص و نامعلوم است. در این شرایط ممکن است تغییراتی در بازار وجود داشته باشد یا اینکه مشخص نباشد افراد تیمتان چگونه باید با استراتژی‌های شرکت سازگاری پیدا کنند. عدم داشتن اهداف آشکار و روشن و روش رسیدن به آنها، واقعا می‌تواند آزار دهنده باشد. شما می‌توانید به تیمتان بگویید: بر روی کار خود تمرکز کنید و کار خود را به خوبی انجام دهید. اینگونه به افراد تیم خود کمک کنید. بنابراین با وجود اینکه آنها ممکن است ندانند در آینده چه چیزی روی می‌دهد، اما مسئولیتهای خود را می‌دانند. انجام روزمره کارهای خوب می‌تواند این احساس را در تیم شما ایجاد کند که در مسیر و جهت درستی قرار دارند، بنابراین از بار احساس ناخوشایند آنها کاسته می‌شود. شما همچنین باید فضای ارتباطاتی بازی را برای تیم خود ایجاد کنید، وجود چنین فضایی می‌تواند در افراد ثبات احساسی ایجاد کند.

هنگامی که اطلاعات جدیدی وجود دارد، می‌توانید آنچه که در حال وقوع است را به اشتراک بگذارید. اجازه دهید تیم شما بدانند که می‌توانند در مورد احساساتشان و همینطور در مورد شما نیز (تا جایی که سازنده است) صادق باشند. شما الگو و راهنمای کارکنان هستید، بنابراین آرامش داشته باشید و از واکنش‌های استرس‌زا که کمکی به بهبود شرایط موجود نمی‌کنند، اجتناب کنید.

سال‌هاست که در زندگی و کسب و کار مشکلات را خوب می‌فهمیم ولی در راه حل به بیراهه می‌رویم. یکی از بیراهه‌ها، علاقه شدید ما به روشهای سلیبی است. باید بپذیریم انسان بدنبال منافع است و فرار از ضرر در اولویت دوم اوست. یعنی اگر می‌خواهیم افرادی را به کار درستی وا داریم بهتر است آنها را تشویق به انجام آن کار کنیم تا اینکه بابت کار غلط تنبیهش کنیم.

این روزها داروخانه‌ها از فروش دارو منفعت مناسبی نمی‌برند، به یک دلیل خیلی ساده: قیمت دارو و مارژین‌ها بر اساس نرخ دلار یارانه‌ای و ارزان است در حالیکه هزینه جاری داروخانه‌ها بر اساس نرخ آزاد (حدود سه برابر) انجام می‌شود. طبیعی است در چنین شرایطی داروخانه‌دار به فروش لوازم آرایشی یا شاید در آینده به مواد خوراکی معمولی (البته چنین پدیده‌ای الان در بعضی از داروخانه‌های زنجیره‌ای کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود و امر عجیبی نیست) روی بیاورد. احتمالا مسوولین مشکلی با فروش لوازم آرایشی ندارند و نکته آنها مغفول شدن دارو و خدمات دارو در داروخانه است.

باید بپذیریم نمی‌توان با عتاب و خطاب آدمها را به کار درست تشویق کرد. باید پایه درآمدهای داروخانه را بر اساس مشاوره‌های دارویی که به مردم می‌دهند، درست کنید. در آن صورت انرژی همه به جای اعمال زور و دعوا صرف تعریف و اجرای خدمات بهتر می‌شود.

Cystine B6 Zinc Supplement

سیستین ب ۶ زینک مکمل

ال - سیستین: این ترکیب از اجزای ضروری در ساختار مو (۱۸٪)، ناخن (۱۴٪) و پوست (۲-۴٪) می‌باشد. ال - سیستین به کراتین مو و ناخن متصل می‌شود. این اتصال سبب تسریع تکثیر این سلول‌ها شده و تاثیر مثبتی بر رشد مو و ناخن دارد.

ویتامین ب ۶: این ترکیب به اتصال ال - سیستین به ناحیه دارای کراتین کمک می‌نماید.

ال - آرژنین: این ترکیب یک آمینو اسید است که با غلظت بالا در فولیکول‌های فعال مو یافت می‌شود. ال - آرژنین در کنار ال - سیستین باعث تکمیل اثر آن می‌گردد.

زینک: این ترکیب برای تشکیل کراتین مو مورد نیاز است. علاوه بر آن آنزیم‌هایی که باعث ریزش مو می‌شوند را مهار می‌کند.



شرکت داروسازی راموفارمین

بازاریابی پلی بین مشتری و تولیدکننده

بین دنیای مشتریان و دنیای تولیدکنندگان یک فاصله‌ای وجود دارد. اهداف مشتریان تامین نیازهای آنها است و اهداف سازمان‌ها تهیه کالا یا خدماتی است که ارزش آنها را فراهم کند. برای اینکه هدف هر دو قسمت هم سو شود، نیاز به واسطه‌ای به نام بازاریابی وجود دارد.

بازاریابی فرایندی است که با شناسایی و درک نیازها و خواسته‌های مشتری و سپس برآورده ساختن آنها آغاز می‌شود. یک طرح بازاریابی موثر علاوه بر این که راه‌حلی برای نیازهای مشتریان ارائه می‌دهد، باعث سودآوری شرکت نیز می‌شود.

تعاریف زیادی در بخش‌های فروش و بازاریابی صنعت داروسازی به عنوان یک فوق تخصص در بازاریابی وجود دارد. برخی از جنبه‌ها به توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای بازار مربوط می‌شود. می‌توان گفت این جنبه بیشتر به فرایند تحقیقات بازار اشاره دارد.

جنبه‌ی دیگر بازاریابی دارویی در ایجاد ارتباطات دربارهی روش‌های درمانی خاص و محصولات متمرکز است که می‌توان منظور از این بخش را با عنوان شغلی مدرپ بیان کرد. این کار تبلیغات داروها را هم از نظر جنبه‌های بالینی و هم از نظر بحث‌های مالی و سهم بازار مورد بررسی قرار می‌دهد.

نکته مهم در مورد بازاریابی دارویی این است که آنچه در اوج هرم بازاریابی دارویی وجود دارد و موثرترین نقش را در بازاریابی ایفا می‌کند، بیمار است. این ویژگی‌های بیمار است که تعیین می‌کند کدام دارو فروخته شود و تولید کدام داروها و محصولات پزشکی ارجحیت بیشتری دارد، در سال‌های گذشته شغل داروسازی یکی از چند شغل پر درآمد بوده و معمولاً داروسازان از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند. اما با افزایش روز افزون فارغ‌التحصیلان این رشته بر بازاریابی صنعت دارو تاثیر گذاشته است و این امکان برای هر فارغ‌التحصیل که داروخانه شخصی خود را راه اندازی کند با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه رو است. در این میان افزایش تولید داروهای داخلی و همچنین واردات بازار دارو را به شدت رقابتی کرده است، پر واضح است که در چنین شرایطی باید دست به دامان بازاریابی دارویی شد و بر یادگیری اصول مارکتینگ دارویی بیش همان‌طور که در تعریف بازاریابی گفتیم، بازاریابی به عنوان واسطه‌ای است که نیاز مشتری را تشخیص می‌دهد و آن را به سازمان‌ها برای تولید محصول یا خدمات خاصی ارائه می‌دهد. برای این که بازاریاب بتواند بهترین راه‌حل ممکن را برای یک نیاز تشخیص دهد، نیاز است که یک سری مولفه‌هایی تنظیم کند تا به کمک آن بتواند به یک پاسخ دقیقی برسد.

برای مثال فرض کنید شما تحقیقات بازار خود را برای تولید یک دارو شروع کرده‌اید. برای اینکه بتوانید اولویت‌بندی مناسبی از بهترین داروها داشته باشید، باید یک سری ویژگی‌ها را برای خودتان مشخص کنید و طبق آن رتبه‌بندی انجام دهید.



دکتر کامران صحت

Zinc Plus[®]



Beautiful Skin

- ✓ جبران کمبود روی در بدن
- ✓ تامین ویتامین های گروه B
- ✓ حفظ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی و رشد عمومی بدن



Zahraui
B-Complex



Healthy Hair

60

Soft gelatin capsules

Each capsule contains:

Zinc		5 mg
Vitamin B1		1.3 mg
Vitamin B2		1.5 mg
Vitamin B3		9 mg
Vitamin B5		6 mg
Vitamin B6		1.6 mg
Vitamin B12		3 µg
Biotin		60 µg
Folic Acid		200 µg



Strong Nails

5mg
Zinc

Zahraui Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548



تهران - تبریز - ایران

شرکت داروسازی زهرای

این سرزمین روایتی را شکسته‌اند. هیچ یک از این شرکت‌ها نیز قرار نیست تنها به تک اندیکاسیون کنونی‌اشان محدود بمانند و همگی در فکر گسترش به انواع دیگری از سرطان‌ها و بیماری‌های ایمنی هستند.

اما، باز هم خرید به دو برابر market cap زیاده روی به نظر می‌رسد. آنچه از سمت Celgene می‌توان با اطمینان تحلیل کرد آن است که این شرکت نقدینگی بالایی دارد؛ بالاتر از آنچه برای بازار منطقی و درست باشد. یک نگاه کلی و ساده به نسبت دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری آنها در سه سال متوالی این را نشان می‌دهد:

$$2014 = 46\%$$

$$2015 = 47\%$$

$$2016 = 36\%$$

این نسبت به طور متوسط ۴ برابری، برای هر شرکتی بیش از اندازه است و انتقاد بازار و سهام‌داران را در پی دارد که چگونه مدیریت شرکت نمی‌تواند از این میزان دارایی استفاده کند.

در حقیقت، از زاویه تحلیلی یک آنالیست این میزان دارایی می‌تواند نشانه‌ای از بن بست فکری مدیران شرکت برای آینده باشد مگر دلیل محکمی برای نگرانی این حجم نقدینگی داشته باشند (میزان نقدی شرکت نیز بالا است).

همچنین، فاصله بین حاشیه سود ناخالص این شرکت با حاشیه سود عملیاتی‌اش بالا است که دلیل آن تمرکز هزینه‌های شرکت بر R&D بوده که البته موفقیت زیادی هم نداشته است. متوسط حاشیه سود خالص Celgene در چند سال گذشته ۹۵٪ بوده است که حتی از داروئی‌هایی مانند Gilead بالاتر قرار می‌گیرد اما با سودآوری کمتر به دلیل سود عملیاتی پایین‌ترش و این خود یک دلیل دیگر است که Celgene باید با خرید شرکت‌ها و تقویت پایپلاین و مالکیت محصولاتی که نزدیک‌تر به بازار باشند، بتواند حاشیه سود عملیاتی خود را بهبود ببخشد.

به هر روی، در یکی از مطالب اخیر اشاره کردیم که با تصویب قانون مالیاتی جدید آمریکا و افزایش ناگهانی حاشیه سود شرکت‌ها، باید منتظر موج جدیدی از M&A باشیم.

اعلام خبر این خرید با اینکه هنوز انجام نشده است، ارزش سهام Juno را نزدیک به ۵۵٪ به بالا شلیک کرد و ارزش بازار آن را به نزدیک ۸ میلیارد دلار رساند. قیمت سهام Celgene نیز ۲/۲٪ پایین رفت که واکنشی طبیعی از بازار است.

اگر مالکیت ده درصدی Celgene در شرکت هدف را به یاد داشته باشیم می‌بینیم که در نهایت کاهش قیمت سهام Celgene با این میزان افزایش در سهام شرکت Juno جبران شده است.

موج مثبت این خبر قیمت سهام شرکت‌های دیگر که در حال توسعه CAR-T هستند را نیز به بالا راند که می‌توان به اینها اشاره کرد:

- Collectis,
- Bellicum Pharmaceuticals,
- Adaptimmune,
- Crispr Therapeutics,
- Editas Medicine

چندی پیش که شرکت Celgene خبر داد قصد دارد شرکت Impact Biomedicines را به قیمت ۷ میلیارد دلار بخرد.

خبر خرید دوم این شرکت نیز در بازار پیچیده است. هدف جدید Juno Therapeutics است؛ همان شرکتی که نخستین بار توسعه روش درمانی CAR-T Cell را آغاز کرد اما نتوانست نخستین شرکتی باشد که آن را به بازار می‌رساند. گفته می‌شود قیمت خرید جدید ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود که البته برای جیب شرکتی مانند Cel-gene با کوهی از نقدینگی که در اختیار دارد، پرداخت این رقم هنگامت هم راحت است. این خبر هیجانی در بازار و میان آنالیست‌ها به راه انداخت و واکنش‌های مثبت و منفی زیادی در پی داشته است.

برای ورود به این مبحث ابتدا، چارچوبی را ترسیم می‌کنیم از شرایطی که این دو شرکت در آن قرار دارند.

شرکت Juno پیشروی مسیر CAR-T بود لیکن، با شکست در یکی از کارآزمایی‌های کلیدی‌اش و مرگ ۵ نفر از بیماران در اثر نوروتوکسیسیته و توقف کارآزمایی توسط FDA، راه را برای رقیبان پشت سرش باز کرد تا پیش بیفتند؛ یعنی Novartis که نخستین داروی این گروه نوین را به تایید رساند و شرکت Kite که توسط Gilead خریده شد و دومین شرکتی شد که یک داروی CAR-T را به بازار رساند.

پس، Juno که آسیب زیادی را در راه توسعه این دارو تحمل کرده است و مقام‌های اول و دوم را دو دستی تقدیم دیگران نموده است جایی برای تعلق و اشتباه بیشتر ندارد.

همچنین، شرکتی در اندازه Juno می‌داند در میدان بازی غول‌هایی مانند Gilead و Novartis امکان رقابت و بقا ندارد. در نتیجه، تنها راه پیش روی این شرکت پذیرش M&A از یکی از بزرگان بازار است و منطقی است که این خریدار Celgene باشد.

چون شرکت Celgene نزدیک به ۱۰٪ از کل سهام شرکت Juno را در اختیار دارد و در توسعه درمان CAR-T این شرکت همکاری داشته است و در واقع، چند سال است که برای این M&A برنامه ریزی کرده و منتظر است و با مالکیت یک بلوک سهام ده درصدی راه نزدیک‌تری از بقیه به این هدف دارد. از سوی دیگر، Celgene به طور جدی نیاز به بازسازی و کامل کردن pipeline خود دارد. این شرکت از دو جهت زیر فشار جدی نیاز به محصولات جدید قرار دارد:


۱. منبع درآمد این شرکت وابستگی زیادی به تنها یک دارو دارد یعنی Revlimid و در سال گذشته نیز بیشتر افزایش فروش این دارو ناشی از بالا رفتن قیمت آن بود.
۲. در ماه اکتبر پیش، یکی از امیدهای pipeline این شرکت در کارآزمایی‌اش شکست خورد و توسعه داروی بیماری کرون آن متوقف شد.

می‌بینیم که Celgene نیاز سریع به ترمیم و تنوع سازی در پایپلاین خود دارد و با خبر دو خرید اخیر، این پیام را برای بازار و سهام‌دارانش مخابره کرده است که در اجرای این استراتژی هم جدی است و هم آماده به واخرجی.

تا دو روز پیش ارزش بازار شرکت Juno پیرامون ۵/۳ میلیارد دلار بود. در نتیجه، یک پیشنهاد خرید ۱۱ میلیارد دلاری، تعجب هر آنالیستی را به همراه خواهد داشت.

بازار M&A پرداخت تا حد اکثر ۵۰٪ اضافی برای یک خرید را می‌تواند بفهمد و بپذیرد اما، بیش از ۱۰۰٪ دشواری می‌توان هضم کرد.


آیا Celgene می‌خواهد راه را بر وسوسه شرکت‌های دیگر برای خرید Juno ببندد که چنین مانع بلندی را بر پا کرده تا کسی هوس پریدن از روی آن را نکند؟ این امکان دور از ذهن نیست به ویژه آنکه دو داروی CAR-T دیگر تایید شده‌اند و خط ورود به



Keep Pace With
All Changes

Come along with

RozaVit



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, **mg**: milligram, **µg**: micrograms





SiderAL[®] GOCCE Int.

Sucrosomial structure

Neutral taste

Without teeth staining

**Improved tolerability and
bioavailability**

Gluten free



Tadbir Kala Jam Co.



+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir



Ginkgo Biloba

Prevention of age-related memory problems

Improvement of sexual dysfunctions

Reduction of PMS symptoms

Effective treatment for types of headaches

Better circulation and heart health

Inflammation control in various conditions



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco

www.tadbirkala.ir



شیرینی یک قطره





لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آنمی ناشی از آن در کودکان

Help your child breath easier with: **SINKAST[®]** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

Category:

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

Description:

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

Clinical Pharmacology:

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

Indications:

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

Contraindications:

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

Precautions:

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

Pregnancy and Lactation:

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Adverse Reactions:

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

Dosage and Administration:

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

How Supplied:

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

Catosin Plus[®] 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

Catosin Plus[®] 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25





Acnomiss[®]

Clindamycin Phosphate %1.2 , Tretinoin %0.025

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و تریتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا



Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد- لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورو درماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوره، راش شدید و آلپسی آره آت



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B ۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا رفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنفیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتو پوستی اگزما و سندرم استوین جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تروما، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به همودیالیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هایپوکسمی مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه از ترمیا شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را در دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

سیتاگلیپتین/متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمپلورید، دیگوکسین، مورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتمیدین، ترامترن، تریمتوپریم، وانکومایسین گلیبوری، فوروزاماید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فیتوآزین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی توئین، نیکوتینیک اسید، سیمپاتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلرامفنیکل و پروپنسید

سیتاگلیپتین:

- سیکلوسپورین
- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.
- سولفونیل اوره ها مانند تولبوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگسمی) موثر باشد.

در بسته بندی:

سیتاگلیپتین/متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار(سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید(متفورمین) می باشد که کاهشده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین/متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلول های انسولین ساز لوزالمعده نمی شوند علاوه منجر به بقای بیشتر این سلول ها نیز می گردند.

مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱-Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاکون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاکون می تواند بر روی روند گلوکونوژنز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونوژنز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین/متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

سیتاگلیپتین: بزرگسالان:

۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز
- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز
- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز
- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.
- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مبرم بیمار تجویز گردد.

شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین/متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



Sitagliptin 25, 50 mg

Sitagliptin / Metformin



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN
Tel: (+9821) 6117 1510
Fax: (+9821) 6662 0175
E-mail: phtd@tolidaru.ir*


Tolidaru
Pharmaceutical Company

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex[®]


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

پالمینا ویر

بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (CRP، WBC، CT Scan، PO₂، PCR، ESR، LDH) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با $P \text{ value} \leq 0.001$ و شاخصهای WBC و PO₂ با $P \text{ value} \leq 0.05$ تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

پالمیناویر[®] PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات
بیماری **کرونا**

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات
تنفسی




+98 21 66577724-26



www.palminavir.yasdaru.co.ir



info@yasdaru.co.ir



METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» Two Components in one tablet

Treatment of Type 2 Diabetes

**Double weapon against diabetes
for maximum effect.**

سازمان مردم نهاد
مؤسسه حمایت از

بیماران نقص ایمنی

شماره ثبت ۴۵۳۰۵



ببخند سلامتی،
ارمغان همیاری با بیماران



شماره حساب: ۲۰۱۰۰۲۰۰۵۷۳۶۰۲

شماره کارت: ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۵۱۵۹۲۰۵

شماره تماس: ۰۹۹۱۹۰۰۴۳۲۶

آدرس: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب بیمارستان مرکز طبی کودکان ساختمان شماره ۳ طبقه ۵

www.idpa.org.ir

بیماری های نقص ایمنی اولیه، اختلالات ارثی هستند که به دلیل ضعف در عملکرد دستگاه ایمنی بدن انسان ایجاد می شوند.

با توجه به اینکه هزینه درمان بیماران نقص ایمنی بسیار زیاد است و در بعضی موارد نیاز به انجام پیوند سلولهای بنیادی، که خود مستلزم هزینه بسیار می باشد برای بیماران وجود دارد بنابراین مؤسسه حمایت از بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی با هدف پشتیبانی همه جانبه و مستمر از بیماران مبتلا به نقص ایمنی، در زمینه های پیشگیری تشخیص و درمان و مراقبتهای پس از آن و حمایتهای اجتماعی از آنان فعالیت خود را آغاز کرد.

ROYAN

International Hybrid Twin Congress
Reproductive Biomedicine & Stem Cells
7 - 9 September, 2022 Tehran - Iran



بیست و سومین کنگره بین المللی رویان

پزشکی تولیدمثل - سلول های بنیادی ۱۶-۱۸ شهریورماه ۱۴۰۱ - تهران

دبیرخانه: بزرگراه رسالت، انتهای خیابان بنی هاشم شمالی، کوی حافظ، کوچه رویان، پلاک ۱۲+۱
معاونت آموزشی، پژوهشگاه رویان | تلفن: ۲۳۵۶۲۷۵۶ | تلفکس: ۲۳۵۶۲۱۷۸

www.royancongress.com



ACECR



انجمن تخصصی سلول های بنیادی ایران

ACTOVER GROUP

Atipharmed

cinnafact

Cinnal-f

MERCK





هفتمین کنفرانس بین المللی زنان، زایمان، ناباروری و بهداشت روانی

7th International Conference on Obstetrics, Infertility and Mental health

محورهای همایش:

زنان: روانشناسی زن، پرستاری زنان و زایمان، زنان، تغذیه و سلامت، زنان و حقوق شهروندی، زنان و سیاست‌های رفاهی، زنان و تعادل کار و خانواده

ناباروری: مشاوره، تغذیه و ورزش، پیشگیری از ناباروری، سلامت باروری مردان و زنان، سبک‌های بنیادی و تولیدمثل، سلامت روان جوانان و زوجین، نقش طب مکمل در ناباروری، سلامت جنسی، رفتارهای جنسی روانی،

بهداشت روانی: روانشناسی مثبت، روانشناسی بالینی، آسیب‌شناسی روانی، روانشناسی سلامت، روانشناسی عمومی، روانشناسی پزشکی، رسانه‌ها و سلامت روان، بهداشت روانی و ازدواج، راه‌های ارتقاء بهداشت روان و سایر زمینه‌های مرتبط...

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱
ثبت نام کامل (پرداخت هزینه): ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱
برگزاری کنفرانس: ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱



تلفن: ۰۲۱۷۵۰۳۸۳۳۸

NO 9, Pekini st, Tbilisi, Georgia

info@wmconf.ir

ایران: تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گل‌دیس

Tel: +12246333470

www.wmconf.ir

سوال اول:

بیمار مرد ۷۰ ساله ای است که به علت لتارژی به اورژانس بیمارستان آورده شده است. در تاریخچه بیماری نکته خاصی وجود ندارد. در معاینه بالینی نیز نکته خاصی مشخص نشد. در آزمایشات بیمار سدیم بیمار ۱۱۶ mEq/L گزارش شده است. همه موارد هایپوناترمی بیمار را توجیه میکند به جز:

- الف) نارسایی غده فوق کلیه
- ب) مصرف بی رویه دیورتیک
- ج) دیابت بیمزه
- د) سندرم ترشح نابجای هورمون ADH

سوال دوم:

پسر ۱۴ ساله ای متعاقب با اولین حمله تب روماتیسمی به دلیل کاردیت در بخش بستری است. در معاینه بیمار همه چیز به جز مورد زیر قابل انتظار است:

- الف) سوفل نارسایی میترا
- ب) سوفل تنگی میترا
- ج) صدای سوم S3
- د) فریکشن راب پریکارد

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲. ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



شرکت های دارویی ممتاز
می توانند جهت معرفی کلیه
ممصولات خود یک شماره از
ماهنامه را همراه با لوگوی
سفارشی به خود اختصاص دهند

برای هرچه بهتر شناخته شدن محصول خود با انتخاب برتر همراه شوید

- ارسال به داروخانه ها و بیمارستان های سراسر کشور
- ارسال به تمامی پزشکان منتخب با تخصص های مختلف در سراسر کشور
- شرکت در همایش ها و کنگره های پزشکی
- انتخاب برتر کوتاهترین راه برای ارتباط با مخاطب در کمترین زمان ممکن
- پزشکان محترم جهت دریافت ماهنامه نام و شماره نظام خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال نمایند

انتخاب ویژه نامہ اطلاعات دارویی
شماره دوست و نژاد - ۴۰۰ صفحه - سال نوزدهم - ایسه دوم تیرماه ۱۴۰۱

Pharmaceuticals & Nutraceuticals

- Antibiotics
- Cardiology
- CNS
- Endocrine
- Food Supplement
- Gastroenterology
- Gynecology
- Infectious
- Neurology
- Oncology
- Respiratory system
- Rheumatology

نتیجہ نامہ مهم دارو

Marham Daru Co. **Viagra®=SDF®**

- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاریان مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیلا، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

زیست تخمیر

www.zisttakhmir.com

سینادارو

www.sinadarou.com

کوئل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

یاس دارو

www.yasdaru.co.ir

بنیان سلامت کسری

www.bskco.ir

پورسینا

www.pursinapharma.com

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

تولید دارو

www.toliddaru.ir

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♥ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♥ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♥ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♥ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♥ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♥ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

