


Keep Pace With  
All Changes

Come along with

**RozaVit**

Food Supplement



# Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

\*RDA: Recommended Daily Allowance, **mg**: milligram, **µg**: micrograms



**RozaVit**  
Food Supplement

**ROUZ DAROU**  
Since:1963  
Quality is our **Commitment**



Rozavit.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:

صفحه		صفحه	
	<b>Cardiology</b>		
سوم جلد	Lozar-H	7	Nephraotonic
24	Pozzarex	29	Novofer
11	Repizapin	12	Liposofer
		13	Pedilact
	<b>Dermal</b>	پشت جلد	Pro Vitamin
14	Acnomiss	9	Cystine B6 Zinc
15	Megacort	دوم جلد	Pyasidin300
16	Collagen Gold		
			<b>Herbal</b>
	<b>Endocrine</b>	26	Palminavir
17	Ziptin		
36	Empajent		<b>Respiratory system</b>
28	Metformin	18	Catosin Plus
22	Sitagliptin	30	Sinkast
		روی جلد	Satika
	<b>Food Suppriement</b>		
1	Renal aid	10	<b>Neurology</b>
3	Maxijeno Plus		Lexopram
5	Geriviton		



**RozaVit**

Food Supplement

کاهش التهاب و  
بهبود درد مفاصل

# Maxijeno

Supplement Facts:		Serving size: 2 Tablets
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Glucosamine Hydrochloride	1500 mg	**
Chondroitin Sulphate	800 mg	**
MSM (Methylsulfonylmethane)	750 mg	**

\*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, \*\*: RDA not established.



**RozaVit**  
Food Supplement

**ROUZ DAROU**  
Since 1963  
Quality is our Commitment



Rozavit.ir  
تماس: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:

## مهمترین چالش طبابت در ایران

طبابت به عنوان مقدس ترین حرفه تلقی می شود، زیرا پزشکان، امین مردم و بیماران هستند و شاید، نقطه تمایز حرفه پزشکی با سایر حرفه ها و مشاغل، در همین نکته قرار دارد.

در سال های خیلی دور، زمانی که پول نقد دست مردم کمتر دیده می شد و از کارتخوان خبری نبود، مردم برای جبران زحمت پزشک، هدایایی به جای پول می دادند که اغلب پزشکان نیز با روی گشاده آنها را می پذیرفتند. البته این شرایط، اغلب در روستاها و شهرهای خیلی کوچک مرسوم بود. اما هرچه بود، مردم از طبیب راضی بودند و طبیب هم از اینکه مردم از او راضی بودند، خوشحال بود.

حالا شرایط فرق کرده، علم پزشکی پیشرفت کرده و تعداد پزشکان و تخصص ها زیاد شده است. قبلا، این طور نبود که برای هر عضو بدن یک تخصص وجود داشته باشد و اغلب پزشکان در سطح پزشک عمومی خدمات ارائه می دادند و بعضا در شهرها، جراحان هم بودند. اما، امروزه با پیشرفت و توسعه علم پزشکی، شاهد انواع تخصص های پزشکی هستیم و همین مسئله باعث شده، تعداد مطب ها افزایش یابد و پزشکان مجبور شوند با یکدیگر رقابت داشته باشند.

در این بین، پزشکان عمومی را باید از مظلوم ترین گروه های پزشکی در کشور دانست که به رغم نقش ارزنده ای که در تامین سلامت مردم بر عهده دارند، اما آنطور که باید در برنامه های سلامت کشور، مورد توجه قرار نگرفته اند. بطوریکه برنامه پزشک خانواده که می بایست به واسطه پزشکان عمومی اجرا شود، هنوز با چالش ها و مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند که باعث شده این برنامه از قالب پایلوت خارج نشود. در نتیجه، پزشکان عمومی معطل

تصمیم گیری های متولیان سلامت برای تعیین تکلیف برنامه پزشک خانواده هستند.

مظلوم ترین گروه پزشکی

پزشکان عمومی، چون بعد از ۷ سال تحصیل دانشگاهی، نه درآمدی دارند و نه شغلی که بخواهند امرار معاش کنند. در نتیجه، مجبورند که حرفه طبابت را کنار بگذارند و سراغ شغل دیگری بروند. این موضوع، به مملکت آسیب می زند. چون تقسیم کار به درستی انجام نشده است. در حالی که در خیلی از مراکز و روستاها و شهرهای دور افتاده به پزشک نیاز داریم، اما از پزشکان عمومی استفاده نمی شود. در سایر کشورها، پزشکان عمومی در مدارس نیز حضور دارند. اما، متاسفانه ما حتی در مراکز بهداشت روستایی و شهرهای کوچک، به طور دائم پزشک نداریم.

کدام پزشکان بیشتر دیده می شوند

آن دسته از پزشکانی که تبلیغ می کنند و بیشتر در رسانه ملی حضور دارند. در حالی که پزشکان خیلی با سواد و مجرب داریم که نمی خواهند به تلویزیون بروند، اما به لحاظ تبحر و علم پزشکی، بهتر از آن پزشکانی هستند که مدام جلوی چشم مردم هستند.

وسایل ارتباط جمعی، نقش مهمی در چهره برخی پزشکان دارد.

### راهکار بازگشت به جایگاه واقعی جامعه پزشکی

تنها مسیر بازگشت جامعه پزشکی به جایگاه واقعی خودش را، قطع رابطه مالی پزشک و بیمار است و: باید این رابطه مالی و پولی بین پزشک و بیمار قطع شود و بیمه ها، پرداختی به پزشکان را متقبل شوند. اما، در کشور ما نمی توان امیدوار بود که چنین اتفاقی بیافتد، چون خیلی از مسائل وجود دارد که اجازه نمی دهد این اتفاق شکل بگیرد و این رابطه مالی بین پزشک و بیمار قطع شود.

# GERIVITON®

Multivitamin Mineral + Ginseng

مواد اولیه از شرکت دارویی معتبر کاتالنت ایتالیا

مکمل تغذیه ای  
۳۰ عدد کپسول نرم ژلاتینی

- ✓ افزایش تمرکز و بهبود حافظه
- ✓ رفع خستگی، بیخوابی و افسردگی
- ✓ کاهش استرس های فکری و جسمی
- ✓ سلامت پوست، مو و ناخن
- ✓ تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماریهای ویروسی آنفلوانزا، کرونا و ...



سال  
۱۳۸۹

از

تا

اکنون

با شما میم.



## ترکیبات تشکیل دهنده کپسول نرم ژلاتینی ژریویتون مولتی ویتامین مینرال + جینسینگ

عصاره استاندارد شده جینسنگ با غلظت بالا	۴۰ میلی گرم
دی متیل آمینو اتاتل بی تارترات	۲۶ میلی گرم
ویتامین A	۴۰۰ واحد
ویتامین B1	۲ میلی گرم
ویتامین B2	۲ میلی گرم
ویتامین B6	۱ میلی گرم
ویتامین B12	۱ میکرو گرم
ویتامین C	۶۰ میلی گرم
ویتامین D	۴۰۰ واحد
ویتامین E	۱۰ میلی گرم
نیکوتینامید (PP)	۱۵ میلی گرم
کلسیم پانتوتنات	۱۰ میلی گرم
روتین (Rutin)	۲۰ میلی گرم
آهن	۱۰ میلی گرم
کلسیم	۹۰/۳ میلی گرم
فسفر	۷۰ میلی گرم
فلوئور	۰/۲ میلی گرم
مس	۱ میلی گرم
پتاسیم	۸ میلی گرم
منگنز	۱ میلی گرم
منیزیم	۱۰ میلی گرم
روی	۱ میلی گرم

Zahravi Pharmaceutical Company

Tel & Fax: (+98) 2144993193

WhatsApp: (+98) 9026080548

**ZAHRAVI**  
PHARMACEUTICAL CO.

شرکت داروسازی زهراوی - تبریز - ایران

## ۴،۲. الگوی لوین

این الگو توسط کرت لوین، روانشناس اجتماعی بر اساس تحقیقات وسیعی که در مورد تغییر و تحول در افراد و گروه‌ها انجام شده بود، ارائه شد. این الگو تغییرات و تحولات در رفتار را تحت تاثیر دو نیرو در یک فرایند سه مرحله‌ای توسییم می‌کند. لوین اظهار می‌دارد که در سازمان‌ها دو نیرو وجود دارد که افراد و گروه‌ها بر اساس تحرکات این دو نیرو، تغییر یافته یا در حالت گذشته باقی می‌مانند. این دو نیرو عبارتند از: «نیروهای فظ وضعیت موجود یا مقاومت» و «نیروهای تغییر یا فشار». تقابل این دو نیرو، نمایانگر تغییر و تحول در سازمان‌ها می‌باشند. لوین با اشاره به این دو نیرو، در جهت افزایش و تقویت نیروهای تغییر و یا کاهش و تضعیف نیروهای مقاومت، فرایند سه مرحله‌ای زیر را بیان می‌دارد. مرحله اول: «خروج از انجماد» و یا به عبارتی «فعال کردن»، مرحله‌ای است که در آن فرد یا گروه برای تغییر و تحول آماده می‌گردد که هدف آن «انگیزش» است. در این مرحله، انسانها ضرورت ایجاد تغییر و تحول در وضع موجود را احساس می‌کنند. دارای سه روش می‌باشد. یکی اینکه نیروهای تغییر، تقویت شوند، یعنی همانهایی که موجب تغییر رفتار فرد می‌شوند، کاهش یابند و راه سوم این است که دو روش یاد شده به صورت تلفیقی به کار گروه یا سازمان می‌گردند، روش دیگر این است که نیروهای مقاومت که مانع تغییر هستند، حذف می‌شوند. راه حل یا روش اول یعنی افزایش و تقویت نیروهای تغییر و فشار به طور مجزا کمتر توجیه شود، چون این مساله در سازمان، از طرفی تنش و اضطراب و از سوی دیگر موجبات مقاوت در مقابل تغییر و عوارض مربوطه را فراهم می‌کند، به این سبب راه حل دوم و شوم یعنی کاهش نیروهای مقاومت و روش تلفیقی، روش‌های موثرتر و مناسب‌تر نسبت به روش اول می‌باشند.

مرحله دوم: تغییر و به عبارتی حرکت، مرحله‌ای است که در آن با استفاده از شیوه‌های صحیح و مناسب، فرد و گروه آماده شده برای تغییر و تحول، در زمینه‌های مربوط متغیر و متحول گردد و الگوها و نگرش‌ها و رفتارهای جدید را می‌آموزند و آنها را در عمل به کار می‌برند.

مرحله سوم: انجماد مجدد و به تعبیری تثبیت مجدد، مرحله‌ای است که توسط آن رفتار فرد، گروه و سازمان نظم یافته و تغییرات و تحولات انجام شده، تثبیت و استحکام مجدد می‌یابد. این مرحله اگر واقع نشود و در پی دو مرحله قبل اتفاق نیفتد، تغییر انجام شده، ثبات نخواهد داشت و تغییرات دیگری را رقم خواهد زد. بنابراین این مرحله از اهمیت ویژه‌ای در فرایند سه مرحله‌ای لوین برخوردار است. مساله مهم‌تر در این مرحله این است که رفتار نوین به مرور زمان افول نکند که در جت ممانعت از بروز چنین واقعه‌ای، باید «برنامه تقویت» را به صورتی اثربخش به اجرا درآورد.

ادامه دارد...



دکتر کامران صحت


# Nephrotonic®

100 F.C. Tablets

هدیه ما برای سلامت کیفیت است.



## Multivitamin for CKD patients



### Each F.C. Tablet contains:

Vitamin B12 .....	6 mcg
Vitamin B1 .....	1.5 mg
Vitamin B2 .....	1.7 mg
Vitamin B6 .....	10 mg
Vitamin E .....	50 mg
Vitamin B5 .....	10 mg
Ascorbic acid .....	60 mg
Biotin .....	300 mcg
Zinc (as Zinc Oxide) .....	25 mg
Niacinamide .....	20 mg
Folic acid .....	1 mg



شرکت داروسازی زهراوی تبریز - ایران

## هدف بعدی صنعت داروئی برای درمان چاقی چیست؟



در سمت دیگر این مسابقه، شرکت Lilly هیچ محصول چاقی در مرحله بالینی ندارد و توسعه محصولی با مکانیسم تحریک GFRAL هم سو و متناسب با pipeline دیابت این شرکت است.

راس سوم این بخش شرکت J&J است که با این استراتژی قصد دارد از محصولات مهارکننده SGLT2 خود فراتر برود.

با وجود آنکه مکانیسم GFRAL برای کنترل اشتها اختصاصی به نظر می‌رسد لیکن، می‌تواند فرصت‌های زیادی را نیز برای توسعه درمان‌های ترکیبی پیش روی صنعت بگذارد. زیرا، پیدا کردن دارو برای این گیرنده می‌تواند مکمل داروهای زیادی باشد که از راه مکانیسم‌های دیگر توده بدنی را تنظیم می‌کنند؛ مکانیسم‌هایی مانند افزایش مصرف انرژی، افزایش ترشح گلوکز، تشدید دفع چربی و کاهش سرعت تخلیه معده.

حتی با چنین مکانیسمی می‌توان به افق‌های دورتری نیز نگاه کرد که حوزه‌های نوظهور مورد توجه زیست‌شناسی هستند از قبیل قهوه‌ای کردن بافت‌های چربی و یا سیگنال‌های باکتریال ارسالی از microbiome.



# Cystine B6 Zinc Supplement

## سیستین ب ۶ زینک مکمل

ال - سیستین: این ترکیب از اجزای ضروری در ساختار مو (۱۸%)، ناخن (۱۴%) و پوست (۲-۴%) می‌باشد. ال - سیستین به کراتین مو و ناخن متصل می‌شود. این اتصال سبب تسریع تکثیر این سلول‌ها شده و تاثیر مثبتی بر رشد مو و ناخن دارد.

ویتامین ب ۶: این ترکیب به اتصال ال - سیستین به ناحیه دارای کراتین کمک می‌نماید.

ال - آرژنین: این ترکیب یک آمینو اسید است که با غلظت بالا در فولیکول‌های فعال مو یافت می‌شود. ال - آرژنین در کنار ال - سیستین باعث تکمیل اثر آن می‌گردد.

زینک: این ترکیب برای تشکیل کراتین مو مورد نیاز است. علاوه بر آن آنزیم‌هایی که باعث ریزش مو می‌شوند را مهار می‌کند.



شرکت داروسازی راموفارمین



# Xentra<sup>®</sup>

## Tetrabenazine 25mg



- ✓ تأیید شده توسط FDA برای درمان سندرم Tourette
- ✓ خواب آلودگی کمتر نسبت به بسیاری از داروهای ضد سایکوز نسل اول
- ✓ اولین داروی تأیید شده توسط FDA برای درمان کره
- ✓ داروی موثر در درمان بسیاری از انواع دیستونی
- ✓ داروی موثر در کره سیدنهام
- ✓ از داروهای ضد سایکوز نسل اول با کمترین احتمال افزایش وزن
- ✓ فاقد اثرات ناخواسته چشمی ناشی از داروهای ضد سایکوز نسل اول
- ✓ بروز کمتر موارد طولانی شدن فاصله Q-T نسبت به تیوریدازین
- ✓ یکی از داروهای قابل استفاده در درمان دیسکیزی تاخیری




# PLERON<sup>®</sup>

## Eplerenone 25, 50 mg Tablet



- ✓ کاهش مرگ و میر بیماران با علائم نارسایی قلبی دارای  $LVEF \leq 40\%$  پس از انفارکتوس حاد میوکارد
- ✓ آنتاگونیست انتخابی گیرنده آلدوسترون
- ✓ نداشتن عوارض جانبی وابسته به هورمون های جنسی (کاهش لیبیدو و ژنیکوماستی) به علت عدم تاثیر بر گیرنده های آندروژنی و پروژسترونی
- ✓ عدم افزایش  $HbA_{1c}$  برخلاف اسپیرونولاکتون
- ✓ بروز هیپرکالمی کمتر در مقایسه با اسپیرونولاکتون
- ✓ فرموله شده توسط شرکت سینتون اسپانیا
- ✓ داروی ارجمند در مقایسه با آمیلوراید و تریامترن در فشار خون بالای مقاوم به درمان

# شیرینی یک قطره



لیپوزوفر® | قطره آهن لیپوزومال

جهت پیشگیری از فقر آهن و آئمی ناشی از آن در کودکان




Liposofer

# خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان



# Acnomiss®

Clindamycin Phosphate %1.2 , Tretinoin %0.025

ژل موضعی، ترکیبی از دو داروی کلیندامایسین فسفات ۱٫۲٪ و ترتینوئین ۰٫۰۲۵٪

- قابل استفاده در درمان آکنه های التهابی و غیر التهابی
- شروع اثر سریع تر نسبت به تک درمانی
- تحمل پذیری بالا



# Megacort

Mometasone Furoate 0.1%

کورتیکواستروئید موضعی (کرم-پماد- لوسیون)

- تسکین التهاب و خارش ناشی از درماتوز مانند درماتیت تماسی، درماتیت ناشی از آلرژی، انواع اگزما، نورودرماتیت موضعی
- تسکین واکنش های ناشی از گزش حشرات و بندپایان
- تسکین سوختگی درجه ۱ و ۲، آفتاب سوختگی
- درمان کمکی و یا جایگزین در پسوریازیس، درماتیت سبوریه، راش شدید و آلپسی آره آت




# COLLAGEN GOLD

Protect and Restore  
Your Beauty from Within

Improves skin firmness and delays skin aging

- ✓ Reduces skin wrinkle depths
- ✓ Eliminates blemishes and inflammation caused by laser and sun
- ✓ Improvement in effects of gels and fillers and other skin cares
- ✓ Cellulite reduction
- ✓ Reduces stretch marks




**2500 mg Marine Collagen**  
(per serving size)

**5000 mg Marine Collagen**  
**80 mg Vitamin C, 50 mg Hyaluronic Acid**



**Ziptin**<sup>®</sup>  
sitagliptin

**Zipmet**<sup>®</sup>  
sitagliptin / metformin



## Safe Journey to a Better Balance

R-1120-ZPT-4947-AD

Inhalation Spray

Catosin Plus® 250

Catosin Plus® 125



Inhaler

Catosin Plus®

Fluticasone125 / Salmeterol 25 - Fluticasone250 / Salmeterol 25

**Category:**

Corticosteroid, Anti-inflammatory, Bronchodilator (beta2 - agonist)

**Description:**

Catosin Plus® 125 & 250 is a metered dose Inhaler for oral inhalation. Each puff delivers 125 or 250 mcg of Fluticasone propionate and 25 mcg Salmeterol as xinafoate and Ozone friendly propellant, HFA 134a.

**Clinical Pharmacology:**

Fluticasone propionate controls the rate of protein synthesis: depresses the migration of polymorphonuclear leukocytes, fibroblasts, reverses capillary permeability and lysosomal stabilization at the cellular level to prevent or control inflammation.

Salmeterol is a long acting highly selective beta2 agonist, which relax bronchial smooth muscles thereby relieving bronchospasm.

**Indications:**

Catosin Plus® 125 & 250 Inhaler is a combination "preventer" medication for treating reversible obstructive airways disease, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This combination therapy is used for long-term asthma management in patients aged 12 years and older.

**Contraindications:**

This product is contraindicated in primary treatment of status asthmaticus or acute episodes of asthma requiring intensive measure or in individuals who have shown hypersensitivity to any of the ingredients of this preparation.

**Precautions:**

Use with caution in patients with tuberculosis, fungal, bacterial, viral, parasitic infection, or ocular herpes simplex. More serious or even fatal course of chicken-pox or measles can occur in susceptible patients. Use with caution in patients with cardiovascular or central nervous system disorders because of beta adrenergic stimulation. This product may slow down the growth rate in children and will need regular monitoring. It may also cause decreased bone mineral density if used for long periods.

**Pregnancy and Lactation:**

(Pregnancy category: C)

There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Use only when clearly needed and when the potential benefits outweigh the unknown potential hazards to the fetus. Because of a potential for serious effects in nursing infants a decision should be made whether to discontinue nursing or discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

**Adverse Reactions:**

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Common side effects are like headache, cold, thrush in the mouth and throat, aching, swollen joints and muscle pain and muscle cramps. Uncommon side effects are like hyperglycemia, cataract, tachycardia, tremor, chest pain and disturbed sleep.

**Dosage and Administration:**

Your doctor will prescribe 1 of 2 different strengths of Catosin Plus® 125 or 250 for patients 12 years and older depending on the severity of condition: 2 inhalations twice daily (morning and evening approximately 12 hours apart). The recommended starting dosage is based on the patient's current asthma therapy.

**How Supplied:**

Sina Darou Catosin Plus® 125 & 250 Inhalers are supplied as aluminum canisters with plastic actuators and protective caps. Storage: Store below 30°C. Protect from frost, direct sunlight and heat. Keep out of the reach of children.



Inhalation Spray

# Catosin Plus<sup>®</sup> 250

Fluticasone 250 / Salmeterol 25

# Catosin Plus<sup>®</sup> 125

Fluticasone 125 / Salmeterol 25



شرکت داروسازی دانش بنیان

# میم دارو

**میم**  
Daroo

تولید قراردادی راهی به سمت توسعه ی پایدار



شرکت

**داروسازی میم دارو**

با دارا بودن

خطوط جامدات ( انواع قرص و کپسول )

خط پودر ( انواع پودر های ورزشی، انواع ساشه قلمی و چهار گوش )

خط محلول های خوراکی و طبیعی (انواع شربت ، قطره ، اسپری بینی، دهانی و بخور)



و به زودی خطوط تولید نیمه جامدات و خطوط تولید قرص های جوشان

آماده ی عقد قرارداد همکاری در حوزه ی تولید قراردادی



[www.mimdaroo.com](http://www.mimdaroo.com)  
[info@mimdaroo.com](mailto:info@mimdaroo.com)



+982122146014  
+982176250962

شرکت داروسازی دانش بنیان

**mim**  
Daroo

**میم دارو**



تولید قراردادی راهی به سمت توسعه پایدار



**شرکت داروسازی میم دارو**

مشاور و مجری امین شما در حوزه تولید قراردادی  
انواع محصولات و مکمل های غذایی و طبیعی

مزایای تولید قراردادی در کارخانه  
دانش بنیان میم دارو

✓ تجهیزات و ماشین آلات به روز

✓ نیروی انسانی با تجربه

✓ دسترسی آسان به کارخانه در تهران

✓ کیفیت و سرعت در ارائه خدمات



+982122146014  
+982176250962



www.mimdaroo.com  
info@mimdaroo.com

# Sitagliptin 25, 50 mg

## Sitagliptin 50 / Metformin 500

- عملکرد کلیه در بیماران کلیوی، بخصوص سالمندان، در طول درمان با این دارو، باید متناوباً مورد ارزیابی قرار گیرد و به محض بدتر شدن، مصرف دارو قطع گردد.

- اندازه گیری سالیانه پارامترهای هماتولوژیکی به مصرف کننده های این فرآورده توصیه می شود.

- هر ۲ تا ۳ سال یک بار اندازه گیری سطح ویتامین B ۱۲ در خون، به مصرف کنندگان این فرآورده توصیه می شود.

- در ضمن درمان با این دارو از مصرف الکل خودداری گردد.

- قبل از انجام هر گونه عمل جراحی به جز مواردی که محدودیت خوردن و آشامیدن در آنها مطرح نیست مصرف این دارو باید موقتاً قطع شود و تا وقتی که مصرف مایعات در بیمار شروع نشده و سطح عملکرد کلیه بالا نرفته، دوباره آغاز نشود.

- در مصرف همزمان این دارو با انسولین برای جلوگیری از افت قند باید دوز مصرفی انسولین را کم یا تنظیم کرد.

- سیتاگلیپتین موجود در این محصول ممکن است منجر به بروز واکنشهای حساسیتی شدید از جمله آنفیلاکسی، آنژیوادم و شرایط اکسفولیاتیو پوستی ازگما و سندرم استیون جانسون گردد. در این شرایط مصرف این دارو را قطع کرده و درمان دیگری را برای کنترل دیابت اتخاذ کنید.

- زمانی که برای بیمار مصرف کننده این محصول شرایطی مانند تب، تروما، عفونت یا عمل جراحی پیش بیاید موقتاً کنترل قند باید با انسولین انجام شود و پس از بهبود شرایط مجدداً مصرف این دارو آغاز گردد.

در بیماران کلیوی با اختلال عملکرد متوسط تا شدید کلیه مانند بیماران End Stage Renal Disease (ESRD) نیازمند به هودیا لیز، کاهش دوز مصرفی این دارو توصیه می شود.

- اگر بیمار در ضمن مصرف این دارو دچار شوک، ناتوانی حاد قلبی، انفارکتوس حاد میوکاردیال و سایر شرایط ناشی از هاپتوکسیمای مرتبط با لاکتیک اسیدوز و همچنین کاهش عملکرد کلیه ازوتیمیا شد، مصرف دارو باید موقتاً قطع گردد.

- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

- از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

### تداخلات دارویی:

#### سیتاگلیپتین / متفورمین:

داروهای کاتیونیک مانند: آمپلورید، دیگوکسین، سورفین، پروکائین آمید، کوئینیدین، کوئینین، رانیتیدین، ترامترن، تریمتوپریم، وانکومایسین گلیبوریید، فوروزاماید، نیفدیپین و دیگر داروهای پایین آورنده قند خون با مختل کننده تنظیم خون مانند: تیاژیدها، دیورتیکها، کورتیکوستروئیدها، فئوتازین ها، محصولات تیروئید، استروژن ها، داروهای خوراکی ضد بارداری، فنی تونین، نیکوتینیک اسید، سیمپاتومیمتیک ها، داروهای بلوکه کننده کانال کلسیم و ایزونیاژید سالیسیلاتها، سولفونامیدها، کلامفیکل و پرونیسید

#### سیتاگلیپتین:

##### سیکلوپسورین

- دیگوکسین: تداخل جزئی است و نیاز به تنظیم دوز مصرفی دیگوکسین نیست.

- سولفونیل اوره ها مانند تولبوتامید: انتخاب دوز کمتر سولفونیل اوره می تواند در کاهش خطر بروز افت قند خون (هایپوگلیسمی) موثر باشد.

#### بسته بندی:

سیتاگلیپتین/متفورمین: در بسته های ۲۰ عددی به شکل قرص های روکش دار حاوی ۵۰ میلی گرم سیتاگلیپتین و ۵۰۰ میلی گرم متفورمین موجود است.

سیتاگلیپتین: در بسته های ۲۰ عددی در قالب قرص هایی با دوزهای ۲۵ و ۵۰ میلی گرم موجود است.

این دارو مهار کننده دی پپتیل پپتیداز چهار (سیتاگلیپتین) یا بدون یک بی گوانید (متفورمین) می باشد که کاهشنده قند خون در بیماران مبتلا به دیابت تیپ ۲ می باشد.

#### موارد مصرف دارو:

درمان دیابت ملیتوس تیپ ۲ بزرگسالان

#### مزایای استفاده از دارو:

سیتاگلیپتین/متفورمین یک داروی ترکیبی می باشد که سیتاگلیپتین و متفورمین را در قالب یک قرص در خود جای داده است. این محصول گامی نو در جهت کاهش تعداد قرص مصرفی می باشد.

سیتاگلیپتین با گذشت زمان موجب تحلیل سلول های انسولین ساز لوزالمعده نمی شوند علاوه منجر به بقای بیشتر این سلول ها نیز می گردند.

#### مکانیسم اثر:

سیتاگلیپتین: این دارو با مهار آنزیم دی پپتیل پپتیداز چهار مانع از تجزیه اینکرتین (Incretin) در بدن می شود. اینکرتین که به نام ۱-Glucagon-like peptide شناخته می شود فاکتوری است که می تواند با کنترل ترشح انسولین و کاهش ترشح گلوکاجون بر روی هموستاز گلوکز موثر باشد. کاهش ترشح گلوکاجون می تواند بر روی روند گلوکونوزوز در کبد نیز موثر باشد، به همین دلیل سیتاگلیپتین با مهار این جریان فیزیولوژیک بدن، به شکل موثری قند خون را کاهش می دهد. با توجه به ترشح هورمون اینکرتین در پاسخ به حضور غذا در دستگاه گوارش، سیتاگلیپتین با مهار تجزیه این هورمون، هنگام غذا خوردن یا در ساعات اولیه بعد از آن، اثرگذار خواهد بود.

متفورمین: متفورمین با کاهش جذب گلوکز در سطح روده، کاهش گلوکونوزوز، همچنین افزایش حساسیت سلولها به انسولین و در نتیجه افزایش برداشت گلوکز از خون، قند خون را کاهش می دهد.

#### مقدار و نحوه صحیح مصرف دارو:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند اما مقدار مصرف معمول دارو به شرح ذیل است:

سیتاگلیپتین/متفورمین: روزانه دو قرص در دو نوبت همراه با غذا مصرف شود. در صورت فراموش کردن یک نوبت از مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن را مصرف کنید، اما اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از مصرف آن و یا از دو برابر کردن مقدار مصرف بعدی خودداری نمایید.

#### سیتاگلیپتین: بزرگسالان: ۱۰۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال متوسط در عملکرد کلیه: ۵۰ میلی گرم یکبار در روز

- بیماران با اختلال شدید در عملکرد کلیه: ۲۵ میلی گرم یکبار در روز

- در درمان همزمان با سولفونیل اوره برای جلوگیری از افت قند خون، بایستی مقدار مصرف سولفونیل اوره را کاهش داد.

- این دارو را می توان همراه با غذا یا بدون غذا مصرف نمود.

#### مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

##### گروه بارداری: B

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری انجام نشده است. بنابراین سلامت و ایمنی مصرف این دارو در زنان باردار مشخص نیست. لذا توصیه می گردد که این دارو در دوران بارداری فقط در صورت نیاز مصرف بیمار تجویز گردد.

#### شیردهی:

میزان ترشح سیتاگلیپتین/متفورمین و یا سیتاگلیپتین در شیر مادر شناخته شده نیست بنابراین توصیه می شود زنان شیرده با احتیاط و زیر نظر پزشک این دارو را مصرف کنند.

#### موارد احتیاط:

- پس از شروع درمان با این دارو باید بیمار از لحاظ بروز علائم پانکراتیت مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت بروز پانکراتیت مصرف دارو موقتاً قطع گردد.

- در لاکتیک اسیدوز، باید از مصرف داروی حاوی متفورمین خودداری نمایند.



# *Sitagliptin 25, 50 mg*

## *Sitagliptin / Metformin*



- Helps to make your body more sensitive to the insulin that you naturally produce
- Decreasing the amount of sugar that liver produces and the intestine absorb
- Increasing insulin release

*Beginning of Saveh Road, Yadegar  
Ave. Tehran 13716 16314, IRAN  
Tel: (+9821) 6117 1510  
Fax: (+9821) 6662 0175  
E-mail: [phtd@tolidaru.ir](mailto:phtd@tolidaru.ir)*

  
***Tolidaru***  
*Pharmaceutical Company*

# Pozzarex<sup>®</sup>

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

**Dosage Forms:** Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

## Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10 -15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

**Dosage:** Adults

## Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):

25 mg PO qDay initially

## Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio  $\geq 300$  mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

## Dosage Modifications

### Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

### Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

## Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

## Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ( $GFR < 60$  ml/min/1.73 m<sup>2</sup>)

## Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.



# Pozzarex<sup>®</sup>


Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25  
mg

50  
mg



PURSINA  
پورسینا



(021)-44981001-5

(021)-44986866

# پالمینا ویر

## بهبود دهنده شاخصهای التهابی کرونا

تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، در بیمارستان گنجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، براساس معیارهای ورود به مطالعه، شامل شاخصهای کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخصهای پاراکلینیکی (PCR، ESR، LDH، CRP، WBC، CT Scan، PO<sub>2</sub>) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمینا ویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان ۱۴ روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با داروی پالمینا ویر بودند، شاخصهای بالینی و پاراکلینیکی CRP، ESR و LDH با  $P \text{ value} \leq 0.001$  و شاخصهای WBC و PO<sub>2</sub> با  $P \text{ value} \leq 0.05$  تغییرات بسیار جالب توجه نسبت به گروه کنترل داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.

### محتویات

پالمینا ویر دارویی است که از عصاره فرآوری شده برگ نخل خرما تهیه شده و حاوی ترکیبات پلی فنولیک و پلی ساکارییدی است.

### مقدار و نحوه مصرف دارو

بزرگسالان بالای ۱۲ سال: روزی ۳ تا ۵ بار (برحسب شدت بیماری) و هر بار ۵ سیسی از دارو را در ۳۰ سی سی آب حل کرده میل نمایند.

### موارد منع مصرف

- کودکان زیر ۱۲ سال
- خانمهای باردار و یا شیرده

### نکات قابل توجه

- حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید.
- دارو به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف گردد.
- پس از بهبودی کامل، باقیمانده دارو دور ریخته شود.

# پالمیناویر<sup>®</sup> PALMINAVIR

بهبود دهنده التهابات  
بیماری کرونا

دوباره دور هم جمع خواهیم شد.



کمک به درمان  
ویروس کرونا



ایمنی بدن



بهبود التهابات  
تنفسی



+98 21 66577724-26



[www.palminavir.yasdaru.co.ir](http://www.palminavir.yasdaru.co.ir)



[info@yasdaru.co.ir](mailto:info@yasdaru.co.ir)



# METFORMIN GLIBENCLAMIDE

500/5 mg



»» **Two Components in one tablet**

## **Treatment of Type 2 Diabetes**

**Double weapon against diabetes  
for maximum effect.**

# NOVOFER®

Iron Supplement Drops for kids

# نووفر®

قطره مکمل آهن اطفال




قطره خوراکی مکمل آهن نووفر برای اطفال

- بالاترین جذب اثر آهن عنصری
- مزه قابل پذیرش برای اطفال
- عدم سیاه کردن دندان
- بدون ایجاد طعم فلزی در دهان
- بدون عوارض گوارشی
- فرمولاسیون فاقد ترکیبات شیمیایی، الکل، گلوتن و لاکتوز

تلفن مشاوره : ۸۸۸۳۴۶۲۴

صاحب پروانه تولید شرکت: TGH PHARMA

www.novofer.ir IRC:1601323671161723



# Help your child breathe easier with: **SINKAST<sup>®</sup>** (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

## How to use?

### For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

## When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

## Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

## Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



# Sinkast



**14**  
Sachets


Montelukast (as Sodium) 4 mg



■ Help  
■ Your  
■ Child  
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



**PURSINA**  
بيورسينا

(021)-44981001-5

(021)-44986866

### سوال اول:

بیمار مرد ۲۸ ساله ای است که به دلیل درد شدید قفسه سینه به شما مراجعه نموده است. درد در حالت خوابیده شدت می یابد.  
در معاینه ضربان قلب ۱۱۰ ضربان در دقیقه و فشار خون ۱۲۰/۷۰ میلیمتر جیوه و درجه حرارت ۳۹.۵ درجه می باشد.  
در سمع قلب صداها مختصری کاهش یافته و در سیستول و دیاستول صدای اضافه شنیده می شود. ریه ها پاک هستند.  
کدام اقدام درمانی توصیه می شود؟

- ۱- تجویز هپارین
- ۲- تجویز استرپتوکیناز وریدی
- ۳- تجویز آسپرین با دوز بالا
- ۴- تجویز پردنیزولون

### سوال دوم:

آقای ۴۰ ساله ای به دلیل کاهش سطح هوشیاری از روز گذشته، به اورژانس آورده شده است. به گفته همراهان، وی مورد شناخته شده سیروز کبدی از ۶ سال قبل می باشد و تحت درمان با اسپرینولاکتون بوده است.  
در معاینه بیمار در حالت stupor است.  
همچنین shifting dullness مثبت است.  
درجه حرارت ۳۸ درجه و ضربان قلب وی ۹۵ بار در دقیقه می باشد.  
مناسبتین اقدام بعدی چیست؟

- ۱- کنترل تستهای کبدی
- ۲- انجام سرنوگرافی شکم
- ۳- آسپیراسیون تشخیصی مایع آسیت
- ۴- انجام اسکن ایزوتوپ کبد و طحال

### شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲ ب.  
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد.)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی



entk\_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

# entk\_bartar


کانون تبلیغاتی انتخاب برتر  
Health/Beauty  
مرجع دارویی انتخاب برتر  
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو  
See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع





- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح و گرافیک: امیر روشنی

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیبا، دکتر مهران زمان زاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیده فاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram  
entk\_bartar  
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴

## شرکت‌هایی که در این شماره پادما همکاری داشته‌اند

سینا دارو

[www.sinadarou.com](http://www.sinadarou.com)

عبیدی

[www.doctor-abidi.com](http://www.doctor-abidi.com)

کوبل دارو

[www.cobeldarou.com](http://www.cobeldarou.com)

کیش مدیفارم

[www.kishmedipharm.com](http://www.kishmedipharm.com)

لقمان

[www.loghman-med.com](http://www.loghman-med.com)

میم دارو

[www.mimdaroo.com](http://www.mimdaroo.com)

یاس دارو

[www.yasdaru.co.ir](http://www.yasdaru.co.ir)

توسعه تجارت قطره حیات

[Office@tghpharma.com](mailto:Office@tghpharma.com)

زیست تخمیر

[www.zisttakhmir.ir](http://www.zisttakhmir.ir)

مرهم دارو

[www.marhamdaru.com](http://www.marhamdaru.com)

الحاوی

[www.alhavipharma.com](http://www.alhavipharma.com)

تدبیر کالا جم

[www.tadbirkala.com](http://www.tadbirkala.com)

تولید دارو

[www.toliddaru.ir](http://www.toliddaru.ir)

پورسینا

[www.pursinapharma.com](http://www.pursinapharma.com)

پارس دارو

[www.parsdarou.ir](http://www.parsdarou.ir)

رازک

[www.razakpharma.com](http://www.razakpharma.com)

روز دارو

[www.rouzdarou.com](http://www.rouzdarou.com)

زهرآوی

[www.zahravi.com](http://www.zahravi.com)

بنیان سلامت کسری

[www.bskco.ir](http://www.bskco.ir)

شرکت داروسازی راموفارمین

[www.ramopharmin.com](http://www.ramopharmin.com)

# THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT  
WORKS IN MULTIPLE WAYS

## امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♥ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♥ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♥ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♥ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♥ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♥ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

