



Rangina[®] 500

RANOLAZINE EXTENDED RELEASE TABLET

رانژینا[®] ۵۰۰

قرص پیوسته رهش رانولازین

♥ درمان آنژین مزمن

♥ اثر ضد آنژینال و ضد ایسکمیک بدون تغییر پارامترهای همودینامیک

♥ موثر بر کاهش HbA1C در بیماران دیابتی



ARYA DARU
آریا دارو



CALL TO FIND OUT MORE
www.aryadaru.com
021 88548062-6

صفحہ		صفحہ	
24	Anesthetics	22	Gastrology
	Hisulin		Mebendazole
	Cardiology	14	Refluzol
1	Rangina		Herbal
پشت جلد	Arbikor	17	Avipect
سہ جلد	Pyasidin		Neurology
11	Indalex	5	Emdifen
13	Delcor	23	Chlordiazepoxide
15	Bisoprolol		NSAID
29	Pozzarex	روی جلد	Ibuprofen
	Dental		Gynecology
30	Hexomex	7	Fertigest
	Erectile		Psychology
3	SDF	9	Escitover
	Endocrine		Respiratory System
26	Metformin	19	Sinkast
36	Empajent		
	Food Suppriment		
دو جلد	L-Arginine		
21	Pedilact		
27	Vitamin C		
33	Renal aid		



نوع بسته بندی جدید محصولات شرکت مرهم دارو

MARHAM DARU CO.

برای اولین بار دارای QR کد روی بلیستر و جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۸ عددی



سینی شامل ۶۶ جعبه قرص ۸ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۶۶ جعبه = ۱۹۸ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۳۰ عددی



سینی شامل ۵۲ جعبه کپسول ۳۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۳۰ عددی



سینی شامل ۵۲ جعبه کپسول ۳۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه




با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۱۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه



دیابت عصبی چیست؟

ادامه از شماره قبل

بیماران دیابتی مبتلا به قند خون عصبی باید به دنبال روش‌هایی برای کنترل استرس و حذف تنش از زندگی‌شان باشند. مشاوره دیابت و مشاوره تلفنی روانشناس یا روانپزشک می‌تواند تا حد زیادی به حل این مشکل کمک کند.

علائم دیابت عصبی چیست؟

وقتی بحث از علائم دیابت عصبی است، منظورمان بیشتر همان علائم فیزیکی استرس است که عبارت‌اند از:

سردرد/ درد یا تنش عضلانی/ مشکلات خواب، زیاد یا کم خوابیدن/ احساس عمومی بیماری/ خستگی هرچند علائم دیابت عصبی یعنی تاثیر استرس بر قند خون در افراد دیابتی کمی متفاوت است. در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ استرس باعث افزایش قند خون یا هایپرگلیسمی می‌شود که علائم زیر را دارد:

تشنگی شدید/ دهان خشک/ ضعف/ سردرد/ تکرر ادرار/ تاری دید/ حالت تهوع/ گیجی/ تنگی نفس. دیابت عصبی (یعنی تاثیر استرس بر قند خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ می‌تواند هم باعث افزایش قند خون شود که علائم بالا را ایجاد می‌کند و همچنین می‌تواند منجر به افت قند خون یا هایپوگلیسمی شود که علائم زیر را ایجاد می‌کند: گرسنگی/ تحریک پذیری/ مشکل در تمرکز/ خستگی/ تعریق گیجی

هنگامی که این اتفاق می‌افتد، سطح قند خون نامتعادل شده و می‌تواند به سطوح خطرناکی برسد، به خصوص اگر اقدامی انجام نشود. تاثیر استرس روی دیابت نوع ۱ این پاسخ به استرس در افراد مبتلا به دیابت نوع یک می‌تواند کمک متفاوت باشد، آنها می‌توانند افزایش یا کاهش در قند خون را تجربه کنند. افزایش قند خون در زمان عصبی شدن در این افراد همانند مبتلایان به دیابت نوع ۲ است. اما کاهش قند خون در اثر سندروم خستگی آدرنال اتفاق می‌افتد که به نوبه‌ی خود در اثر استرس مزمن و طولانی‌مدت ایجاد می‌شود. در این حالت استرس طولانی‌مدت باعث تخلیه کورتیزول از غدد آدرنال می‌شود و در نتیجه سطح کورتیزول در خون کاهش پیدا می‌کند. در افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، تولید ناکافی هورمون‌هایی مانند کورتیزول می‌تواند باعث ایجاد بی‌تعادلی در هورمون‌هایی شود که برای تنظیم سطح قند خون ترشح می‌شوند. آیا فشار عصبی باعث بالا رفتن قند خون می‌شود؟ وقتی بدن در شرایط استرس‌زا و تنش قرار می‌گیرد، هورمون‌هایی مثل کورتیزول و آدرنالین ترشح می‌کند. ترشح این هورمون‌ها در واقع فرایند طبیعی است که بدن در واکنش به استرس وارد شده تولید می‌کند، اما حاصل این تنش وارد شده به فرد، بالا رفتن فشار خون، افزایش قند خون و ضربان قلب فرد است. حال فرض کنید که بدن به صورت مداوم در شرایط تنش‌زا و استرسی قرار بگیرد. در صورتی که در بلندمدت این اتفاق تکرار شود باید منتظر مشکلات زیر بود: بالا رفتن فشار خون/ اضطراب مزمن/ بیماری‌های قلبی/ اسهال/ مشکلات خواب/ سردرد. در واقع، استرس عامل اصلی افزایش گلوکز خون محسوب می‌گردد. هرچند که این مشکل در افراد سالم موقتی است و بعد از رفع استرس، میزان قند خون پایین می‌آید، اما اگر بیماران دیابتی با شرایط استرسی مواجه شوند اوضاع خطرناک خواهد شد، چراکه ممکن است کنترل قند خونشان دچار مشکل شود. احتمال تاثیر گذاری دیابت عصبی ناشی از استرس روی کلیه‌ها و غدد فوق کلیوی هم در بیماران دیابتی بالا است. بنابراین،

Emdifen®

Acetaminophen 325mg / Caffeine 40mg / Ibuprofen 200mg

(OTC)

- Analgesic and antipyretic
- For relief of mild to moderate pains of:
 - Headache (tension & migraine)
 - Skeleto-mascular
 - Arthritis
 - Toothache
 - Dysmenorrhea



شرکت مرهم دارو
MARHAM DARU CO.

به یک مربی بزرگ از راه دور تبدیل شوید

با تغییرات دور کاری، نیاز به مدیران و رهبران برای تمرین مربیگری مجازی ایجاد شده است. ایجاد یک رابطه موثر با یک مربی زمانی که در همان مکان نیستید، مراقبت بیشتری را می طلبد. در اینجا در این باره نکته هایی ارائه می شود:

- ابتدا روی اعتماد تمرکز کنید. البته، اعتماد برای ایجاد و پایداری هر رابطه ای، یک اصل اساسی و پایه ای است و حتی در دنیای مجازی نیاز به هدفمندی بیشتری دارد. در مورد چگونگی تبدیل رابطه مجازی به فضایی امن برای هر دوی شما، با هم صحبت کنید، از جمله توافق بر سر محرمانه بودن از نظر مواردی که ضبط یا به اشتراک گذاشته می شود، و یا اینکه به هر قولی که می دهید عمل کنید.
- مشاور شما نمی تواند برای یادآوری ها یا پیگیری پیشنهادات شما، به دفتر شما مراجعه کند، بنابراین با پیگیری های به موقع و وقت شناسی، اعتماد او را جلب کنید.
- مرزها و قوانین تعامل را مشخص و روشن کنید.
- علاوه بر تصمیم گیری در مورد راه های ارتباطی (که ممکن است با زمانی که حضوری ملاقات می کردید متفاوت باشد)، در مورد راه های ترجیحی خود برای ارتباط از راه دور صحبت کنید. ممکن است ترکیبی از گزینه های همزمان مانند پلتفرم های مبتنی بر ویدئو، سیستم های منورینگ داخلی، تماس های تلفنی و همچنین گزینه های که همزمان در یک وقت ها دو نفر در ارتباط نیستند، مانند ایمیل، پیام رسانی و پلت فرم های رسانه های اجتماعی مانند لینکدین را انتخاب کنید.
- در نهایت، تا جایی که امکان دارد، با مربی خود همکاری کنید. فرصت های کار با یکدیگر در پروژه ها در محیط راه دور به اندازه ارتباط واقعی و حضوری، آشکار نخواهد بود، بنابراین خودتان به دنبال این فرصت ها باشید و آنها را جستجو کنید. این به شما فرصتی می دهد تا مربی خود را مربیگری کنید و نقاط قوت و ضعف او را در عمل ببینید.

کارکنان خود را توانمند کنید تا به دنبال علایق خارج از محل کار باشند

با افزایش روزافزون افرادی که دست از کار می کشند، رهبران شرکت ها باید راه های جدیدی برای حفظ کارکنان بیابند. یکی از راه های شناخته شده برای تشویق ماندگاری، حمایت از کارکنان در تعقیب علایق خود، خارج از محل کار است. این به این معنی است که به آنها برای تعیین ساعات کاری خود انعطاف پذیری و اجازه واضح برای انجام این کار بدهید. حتی می توانید به آنها برای این کار مرخصی اختصاص دهید، تا بیشتر علایق بیرونی خود را کشف کنند. سپس با مثال رهبری کنید. علایق خود را با آنها به اشتراک بگذارید و توضیح دهید که چگونه آنها به شما انرژی می دهند تا بهترین کار را انجام دهید. کارکنان را تشویق کنید تا علایق خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. می توانید جلسات هفتگی یا ماهانه را با هدف بیان شده در مورد پروژه ها، رشد و یادگیری خارج از محل کار تشکیل دهید تا همکاران بتوانند نگاهی اجمالی به زندگی یکدیگر داشته باشند.

در نقش جدیدتان عقاید و ایده های خود را بیان کنید

بیان کردن ایده ها و عقیده ها در محل کار فواید زیادی دارد: شما دیده می شوید و نفوذ و اعتبار خود را افزایش می دهید. اما وقتی در یک سازمان، تازه وارد هستید، تشخیص اینکه چه زمانی و چگونه می توانید صدای خود را به گوش دیگران برسانید، دشوار است. برای اینکه عقاید و ایده های خود را راحت تر بیان کنید، از قبل خود را آماده کنید.

- به این فکر کنید که چه کسی باید ایده یا نظر شما را بشنود و چرا. افکار خود را از طریق سایر اعضای تیم، هم ردیفان یا مربیانی که مدت طولانی تری در سازمان بوده اند به اجرا نزدیک کنید و تا قبل از مطرح کردن ایده خود در یک جلسه یا نزد رئیس تان، دیدگاه آنها را به دست آورید. در مرحله بعد، بهترین زمان و مکان را برای مطرح کردن ایده خود به دقت انتخاب کنید. آیا باید در یک جلسه صحبت کنید یا به جای آن یک جلسه انفرادی داشته باشید؟ آیا ایمیل راه بهتری است؟
- هنگامی که صحبت می کنید، پیشنهادات خود را به صورت استراتژیک تنظیم کنید. آیا به همه چیزهایی که اشتباه است اشاره می کنید یا راه هایی هم برای بهبود فرآیند یا سیستم پیشنهاد می کنید؟
- از همه مهمتر، متواضع باشید. هر ایده ای که دارید نمی تواند ایده خوبی باشد، به خصوص زمانی که به تازگی در یک شرکت جدید شروع به کار کرده اید. آماده و مایل به شنیدن «نه» باشید.

دکتر پیام دین دوست

Fertigest®

Progesterone Suppositories
200mg & 400mg

فرتیژست®

شیاف پروژسترون
۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم

- قابلیت استفاده به صورت رکتال و واژینال
- دارای پایه چرب و سهولت مصرف



موثر در درمان:

- سندرم پیش از قاعدگی
- افسردگی پس از زایمان
- خونریزی غیر طبیعی رحم
- نگهداری بارداری در زمان استفاده از ART
- جلوگیری از هایپرپلازی اندومتر در دارودرمانی با استروژن
- آمنوره ثانویه
- جلوگیری از سقط خودبخودی جنین



Scan me



Aburaihan
Pharmaceutical Co.



Aburaihan
Femaland

www.aburaihan.com www.femaland.com



استروئید چیست؟

ادامه از شماره قبل

داروهای مشابه غیر استروئید چیست؟ داروهای غیر استروئیدی، داروهایی هستند که التهاب، درد و تب را کاهش می‌دهند. این داروها از پر مصرف‌ترین داروهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای درمان بیماری‌های مختلف توصیه می‌شوند. مکانیسم این داروها با داروهای استروئیدی متفاوت است و یکی از این تفاوتها این است که این گونه داروها حاوی کورتون نیستند. از این نوع داروها میتوان به آسپرین، ایبوپروفن، ایندومتاسین، نپروکسن و... اشاره کرد.

عوارض استروئید در زنان

استفاده خودسرانه از داروهای مختلف ممکن است عوارض جبران ناپذیری داشته باشد. داروهای استروئیدی همانند همه داروها دارای عوارضی هستند که این عوارض در زنان ممکن است شدیدتر باشد. اما پاسخ به این پرسش که عوارض استروئید چیست؟ این است که قطعاً بر اساس فیزیولوژی بدن هر انسان ممکن است این عوارض متفاوت باشد اما عوارضی که تاکنون در زنان مشاهده شده است شامل بزرگ شدن بیش از حد کلیتورس، کلفتی صدا، ناباروری، قاعدگی نامنظم، تغییر فرم صورت و رشد مو در صورت است.

جمع بندی پایانی

ظاهر زیبا در عصر حاضر بسیار بیش از پیش مورد توجه عموم قرار گرفته است. حساسیت این موضوع در زنان خیلی بیشتر از مردان است؛ به همین دلیل برای برخورداری از تناسب اندام زیبا به مصرف استروئید روی می‌آورند و حتی ممکن است این موضوع را با کسی مطرح نکنند. استفاده از داروهای استروئیدی ممکن است اعتیادآور نیز میباشد که رهایی از آن نیز بسیار دشوار است و در این مسیر بدن نیز تحت تأثیر قرار میگیرد که جبران این عوارض گاهی امکان پذیر نیست.

دسته دوم از استروئیدها، شامل استروئیدهای خوراکی هستند که عبارتند از فلوکسی مسترون، استانازول (استانزولول)، اوکساندرولون، متان دیتون و اوکسی متولون که معمولاً به شکل قرص یا انواع داروهای مختلف و شربت به مصرف می‌رسند. به این ترتیب در بدن اثر کرده و سبب عضله سازی و افزایش حجم بدن می‌شوند.


کرم استروئید

یکی از راه‌های مصرف استروئید استعمال آن به صورت موضعی می‌باشد که در انواع کرم و پماد در دسترس است. کورتیکواستروئیدهای موضعی کرمهای استروئیدی هستند که بر روی پوست مالش داده می‌شوند. استروئیدهای موضعی به فرم کرم، پماد، لوسیون و ژل به کاهش التهاب پوست کمک می‌کنند. یکی از بیماریهایی که استروئیدهای موضعی برای درمان آن تجویز میشود، اگزما میباشد. اگزما یک اصطلاح عمومی برای بیماریهای مختلف پوستی که ناشی از واکنش ایمنی به یک محرک باشند، است. برای رفع التهاب و سوزش در افرادی که دچار اگزما شده‌اند، کرم موضعی استروئید پیشنهاد می‌شود. فرم داروی موضعی استروئید را با مشورت پزشک انتخاب کنید. بد نیست بدانید استروئیدهای موضعی روی پوست نازک (نسبت به پوست ضخیم) راحت‌تر نفوذ می‌کنند. در اغلب موارد میزان مصرف آن در کمترین دوز موثر تجویز می‌شود. استروئیدهای موضعی روی پوست های مرطوب جذب بهتری نسبت به پوست‌های خشک دارند.

غیر استروئید چیست؟

همانطور که گفته شد استروئید موضعی در کاهش التهاب و استروئید خوراکی در تقویت توان بدن موثر است اما ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که استروئید چیست؟ تفاوت آن با

FLY AWAY FROM DEPRESSION



 **ESCITOVER**
ESCITALOPRAM F.C. tablets 10, 20mg

✕ مهارکننده پرقدرت بازجذب سروتونین

✕ دارای تاییدیه برای درمان اختلال افسردگی ماژور در افراد ۱۲ سال به بالا

✕ کمترین میزان تداخلات به علت مهار ناچیز آنزیم های کبدی

✕ اثربخشی خیلی خوب در کنار عوارض جانبی محدود و قابل تحمل

ACTOVERCO

Together for a healthier future

No 58, 8th St. Kooye Nasr (Gisha St.), Tehran IR Iran Postal Code: 1446863914, Telefax: +98 (21) 41 63 70 00
ACT.MKT.CNS.01.1401.1136

www.actoverco.com

(قرص ایندپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکت‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱,۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.



این‌دالکس[®] ۱.۵

این‌دپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو
پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



[pars_darou](https://www.instagram.com/pars_darou)



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

entk_bartar 9+



92 Posts 11K Followers 59 Following

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation

entk_bartar

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع





LET THE BEAT GO ON

DELCOR[®] Tablet

Bisoprolol Fumarate

- Beta - 1 selective agonist.
- Used to treat hypertension and heart failure.



Scan Me:



VOC: 021 - 910 102 12
☎ 021 - 44 53 70 24
☎ 021 - 44 56 70 23
www.razakpharma.com
© razakpharma

Razak

Pharmaceutical Labs Co.

Refluzol[®]

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6




@tekajeco

www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir



شربت گیاهی

● تسکین دهنده سرفه خلط آور گیاهی
برطرف کننده التهاب مجاری تنفسی

تهیه شده از عصاره آویشن و ختمی



QMS

ISO 9001:2015
ISO 19002:2014
ITALIA ISO 15004:2012

مستأجره پزشکی
مسئله های بهداشتی
02161018

دینه
dinehiran

Avipect®



Help your child breath easier with:

SINKAST[®] (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2.**
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5

(021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



* درمان کرمک ، کرمهای شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار

* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتریویاز و تریکوریاز

* عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب

Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com



Xypident®

(Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin®

(Human Insulin)

RECOMBINANT DNA ORIGIN

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

**منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138**



www.loghmanpharma.com

Metformin 500


Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وقت ویتامین C



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵
www.mehrdarou.com

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Protect Heart from Adversity

Pozzarex[®]

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866



سلامتی را با رایحه خوش تجربه کنید



- ضد عفونی کننده دهان
- تقویت کننده مینای دندان
- پیشگیری از پوسیدگی دندان
- ایجاد تازگی و طعم خوشایند در دهان
- تنوع در طعم و رایحه



مگافن®

مگافن® ۳۲۵

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم



انواع مختلف درد

• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم

مگافن®



با مگافن
دلیلی برای تحمل درد نیست

مگافن® ۵۰۰



انواع مختلف درد

• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

سوال اول:

بیمار پسر ۱۵ ساله ای است با درد شبانه در زانوی راست مراجعه نموده است. در بررسی رادیولوژی یک، منطقه‌ای گرد و شفاف و با کلسیفیکاسیون مرکزی با قطر کمتر از ۲ سانتی متر در قسمت پروگزیمال استخوان تیبیا مشاهده شد. در بررسی هیستوپاتولوژیکی ترابیکول‌های استخوانی نامنظم درهم تنیده شده با حاشیه استئوبلاستی برجسته احاطه شده‌اند؛ دیده می‌شود. کدام تشخیص مطرح می‌شود؟

- ۱- استئوبلاستوما
- ۲- استئوئید استئوما
- ۳- استئوما
- ۴- استئوکندروما

سوال دوم:

کودک ۳ ساله ای را به دلیل پلاک‌های خارش دار اریتماتو همراه با تشدید خطوط پوستی در نواحی گردن و چین‌های آنتی کوبیتال نزد شما آورده‌اند. وی سابقه پلاک‌های قرمز رنگ مترشح روی گونه‌ها و چانه بدون درگیری نواحی اطراف دهان و بینی را نیز در دوران شیرخوارگی داشته است. کدام تشخیص محتمل‌تر است؟

- ۱- درماتیت آتوپیک
- ۲- درماتیت سبورئیک
- ۳- ضاغمای سکه ای
- ۴- پسوریازیس فلکسورال

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه‌ارسانی جواب گزینه برتر ج، ۲، ب.
لطفاً پاسخ‌های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی




Keep Pace With
All Changes

Come along with

RozaVit

Food Supplement



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	Vitamin B5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, µg: micrograms



RozaVit
Food Supplement

ROUZ DAROU
Since: 1963
Quality is our **Commitment**



Rozavit.ir
تماس: ۰۲۱-۸۲۷۱۱

ارتباط با ما:



- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیربازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیرمالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیلا، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگاهی ها بر عهده آگاهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadaru.com

اکتوور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

