



Rangina[®] 500

RANOLAZINE EXTENDED RELEASE TABLET

رانژینا[®] ۵۰۰

قرص پیوسته رهش رانولازین

♥ درمان آنژین مزمن

♥ اثر ضد آنژینال و ضد ایسکمیک بدون تغییر پارامترهای همودینامیک

♥ موثر بر کاهش HbA1C در بیماران دیابتی



ARYA DARU
آریا دارو



CALL TO FIND OUT MORE
www.aryadaru.com
021 88548062-6

صفحہ		صفحہ	
24	Anesthetics		
	Hisulin	دو جلد	Food Suppriment
	Cardiology	21	L-Arginine
1	Rangina	27	Pedilact
پشت جلد	Arbikor	33	Vitamin C
سہ جلد	Pyasidin		Renal aid
11	Indalex	22	Gastrology
13	Delcor		Mebendazole
15	Bisoprolol	14	Refluzol
29	Pozzarex		Herbal
	Dental	17	C-Lax Plus
30	Hexomex		Neurology
	Dermal	3	Gabapentin
روی جلد	Masport	23	Chlordiazepoxide
	Erectile		Gynecology
5	SDF	7	Fertigest
	Endocrine		Psychology
26	Metformin	9	Escitover
36	Empajent		Respiratory System
		19	Sinkast



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۲۰ عددی



سینی شامل ۶۴ جعبه کپسول ۲۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۶۴ جعبه = ۱۹۲ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه کپسول ۳۰ عددی



سینی شامل ۵۲ جعبه کپسول ۳۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۵۲ جعبه = ۱۵۶ جعبه



با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۱۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه




با اسکن QR اطلاعات را ملاحظه فرمایید



جعبه قرص ۱۰۰ عددی



سینی شامل ۴۸ جعبه قرص ۱۰۰ عددی



کارتن پلاست شامل سه سینی ۴۸ جعبه = ۱۴۴ جعبه

مدیریت نمودن مدیرانی که دچار فرسودگی شغلی شده اند


بیش از ۵۰ درصد از مدیران گزارش می دهند که احساس خستگی و فرسودگی شغلی می کنند. همه گیری و پیامدهای آن نیز، سه نشانه فرسودگی شغلی را در کارکنان و مدیران تشدید کرده است: خستگی، بدبینی، و فقدان موفقیت‌های حرفه‌ای.

اگر یک مدیر خط اول را مدیریت می کنید، چگونه می توانید به موضوع فرسودگی شغلی او رسیدگی کنید؟

۱. کار آنها را به معنای بزرگتر گره بزنید. در مورد آنچه که برای آنها اهمیت بیشتری دارد صحبت کنید و وظایف و کارهایشان را به آن انگیزه ها متصل کنید.
۲. بر یادگیری و توسعه تمرکز کنید. پروژه های جدید و هیجان انگیز به آنها محول کنید، در مورد آنچه برای دستیابی به اهدافشان نیاز است گفتگو کنید و در مورد مسیرهای شغلی بالقوه در شرکت شفاف باشید.
۳. به حمایت از کار منعطف ادامه دهید تا به مدیران در برنامه‌هایشان احساس توانمندی بدهد و به کاهش احساس خستگی یا عدم استقلال کمک کند.
۴. در نهایت، یک محیط امن از نظر روانی ایجاد کنید که این کارمندان در آن محیط، احساس راحتی کنند و بتوانند در مورد فرسودگی شغلی خود صحبت کنند. همچنین آنها را تشویق کنید تا اقدامات مراقبتی از خود را که می تواند به بهبود آنها کمک کند، انجام دهند.



Viagra[®] = SDF[®]



MARHAM DARU



SDF[®] Tablets

A phosphodiesterase 5 (PDE 5) inhibitor,
For Treatment of:

- Erectile Dysfunction (ED)
- Pulmonary arterial hypertension (PAH)



SDF[®] 100 & 50

Fertigest®

Progesterone Suppositories
200mg & 400mg

فرتیژست®

شیاف پروژسترون
۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم

- قابلیت استفاده به صورت رکتال و واژینال
- دارای پایه چرب و سهولت مصرف



موثر در درمان:

- سندرم پیش از قاعدگی
- افسردگی پس از زایمان
- خونریزی غیر طبیعی رحم
- نگهداری بارداری در زمان استفاده از ART
- جلوگیری از هایپرپلازی اندومتر در دارودرمانی با استروژن
- آمنوره ثانویه
- جلوگیری از سقط خودبخودی جنین



Scan me



Aburaihan
Pharmaceutical Co.



Aburaihan
Femaland

www.aburaihan.com www.femaland.com

گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت صنعت داروسازی ایران




مرکز پژوهش‌ها در ادامه از قدیمی بودن ساختمانهای کارخانجات داروسازی، عدم انطباق تعداد اقلام تولیدی با فضای فیزیکی و تجهیزاتی موجود، قدیمی و مستهلک بودن ماشین آلات، تداوم تولید دارو با فرمولاسیونهای قدیمی در حالی که برخی از آنها از لیست تولیدات صنایع داروسازی دنیا حذف شده‌اند، قدیمی بودن تکنولوژیهای ساخت و تهیه داروها، مدرن نبودن متدهای کنترل اقلام دارویی، تهیه مواد اولیه و بسته‌بندی از منابع با کیفیت پایین به دلیل ارزانی آنها، عدم رعایت شرایط نگهداری داروها نزد توزیع کننده، داروخانه و مصرف کننده، نبود ابتکار و نوآوری و به وجود آمدن مقاومتهای میکروبی به دلیل تجویز و مصرف غیرمنطقی داروها به عنوان عمده‌ترین مشکلات صنعت داروسازی در ایران نام برده و افزود: یکی از مشکلات دیگر مراکز تک نسخه‌ای هستند که در حال حاضر نه تنها وظیفه اصلی خود را انجام نمی‌دهند، بلکه از هیچ ضابطه قانونی تبعیت نکرده و دارو را بدون رعایت تشریفات قانونی وارد کشور می‌کنند و اقدام آنان باعث شده تا سازندگان داروهای خارجی از ارسال دارو به نمایندگان رسمی خود در ایران خودداری نموده و با گرفتن پول نقد، دارو را در اختیار مراکز تک نسخه‌ای قرار می‌دهند و برای تبلیغ داروها و تجویز داروهای گرانقیمت با (برخی از) پزشکان ارتباط غیر حرفه‌ای برقرار نموده و آنها را تشویق به تجویز غیرمنطقی داروها می‌کنند.

این گزارش در پایان خواستار تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجرایی قاطع جهت برخورد با مرتکبین جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی، بازنگری و تعدیل در سود داروهای وارداتی و الزام واحدهای وارد کننده دارو به اخذ نمایندگی کارخانجات تولیدکننده دارو در دنیا به منظور کاهش قیمت داروهای وارداتی شده است.

بر اساس اعلام واحد اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی که بنا به درخواست رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تهیه کرده است، ضمن انتقاد از بالا بودن سرسام آور سهم هزینه مراقبتهای سرپایی بهداشتی و درمانی در ایران در مقایسه با مراقبتهای بستری افزود: در کشورهای توسعه یافته مراقبتهای سرپایی بهداشتی و درمانی ۳۰ درصد و در کشور ما ۶۰ درصد از کل هزینه‌های مراقبت سلامت را به خود اختصاص می‌دهند و وزن بالای هزینه مراقبت سرپایی بهداشتی - درمانی، جایگاه دارو را در نظام مراقبتهای سلامت کشور برجسته کرده است.

این گزارش با اشاره به تاسیس نخستین کارخانه داروسازی به سبک جدید (حدود ۱۰۰ سال پیش) در تهران افزود: در حال حاضر میانگین عمر ساختمانی و ماشین‌آلات کارخانجات داروسازی کشور در حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می‌باشد و در مجموع می‌توان گفت که کارخانجات داروسازی ایران از لحاظ فیزیکی و سخت افزاری دارای (GMP (Good Manufacturing Practice متوسط متمایل به ضعیف بوده ولی به لحاظ پرسنلی و تجربه دارای GMP متوسط رو به رشد می‌باشد. GMP به معنای تولید خوب یک محصول (با در نظر گرفتن مجموعه چندین شاخص از جمله شاخص‌های انسانی، مدیریتی و فنی در مراحل تولید) می‌باشد. این گزارش با اشاره به نتیجه بازدید کارشناسان سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال ۱۳۸۱ از ۱۵ کارخانه داروسازی ایران آمده است: در این بازدید وضعیت کارخانجات داروسازی ایران هم از نظر سخت‌افزاری و هم از لحاظ نرم افزاری مورد ایراد قرار گرفته‌اند که ایرادات سخت افزاری بیشتر و عمدتاً شامل نامناسب بودن فضاهای فیزیکی و عدم جداسازی مناسب بخشها از یکدیگر بوده است.

FLY AWAY FROM DEPRESSION



 **ESCITOVER**
ESCITALOPRAM F.C. tablets 10, 20mg

✕ مهارکننده پرقدرت بازجذب سروتونین

✕ دارای تاییدیه برای درمان اختلال افسردگی ماژور در افراد ۱۲ سال به بالا

✕ کمترین میزان تداخلات به علت مهار ناچیز آنزیم های کبدی

✕ اثربخشی خیلی خوب در کنار عوارض جانبی محدود و قابل تحمل

ACTOVERCO

Together for a healthier future

No 58, 8th St. Kooye Nasr (Gisha St.), Tehran IR Iran Postal Code: 1446863914, Telefax: +98 (21) 41 63 70 00
ACT.MKT.CNS.01.1401.1136

www.actoverco.com

(قرص ایندپامید آهسته رهش ۱/۵ میلی گرم)

اطلاعات دارویی ایندالکس®:

داروی ایندالکس متعلق به گروهی از داروها به نام دیورتیک است که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شود. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکت‌های مغزی، حملات قلبی و مشکلات کلیوی کمک می‌کند. این دارو همچنین برای کاهش مایعات اضافی در بدن (ورم) ناشی از نارسایی قلبی استفاده می‌شود.

مکانیسم اثر داروی ایندالکس®:

اثر دیورتیک داروی ایندالکس مانند دیورتیک‌های تیازیدی افزایش ترشح سدیم، کلر و آب از طریق تداخل در جابجایی یون سدیم از بخش پروگزیمال توبول‌های دیستال می‌باشد.

فارماکوکینتیک دارو ایندالکس®:

این دارو به سهولت و به طور کامل از طریق مسیر گوارشی جذب می‌گردد. حدود ۷۷٪ دوز تجویزی از طریق ادرار دفع می‌گردد (که ۷٪ آن به صورت تغییر نیافته) و ۲۳٪ دوز باقی مانده از طریق مدفوع دفع می‌شود.

مقدار و روش مصرف داروی ایندالکس®:

- ادم: شروع با دز ۳mg روزانه و در صورت عدم مشاهده پاسخ مناسب پس از یک هفته میتوان دوز را به ۵mg در روز تغییر داد.
- فشار خون بالا: شروع دوز با ۱,۵mg روزانه در صورت نیاز، افزایش دوز هر چهار هفته یکبار تا رسیدن به دوز ۵mg در روز.

مزایای ایندالکس®:

- اثرات ضد فشار خونی بیشتر (قوی تری) دارد و فشار خون سیستولیک را ۵۴٪ بیشتر کاهش می‌دهد.
- عوارض متابولیک کمتر نسبت به هیدروکلرتیازید
- در نارسایی کلیوی قابل استفاده می‌باشد.
- طول اثر بیشتر (۲۴ ساعت دوام یک عدد قرص در بدن می‌باشد)
- برای نارسایی‌های قلبی بهترین انتخاب است.
- در طولانی مدت مرگ و میر در بیماران قلبی و دیابتی کاهش می‌یابد.



ایندالکس[®] ۱.۵

ایندپامید ۱.۵ میلی گرم



For a Normal Heart,
Healthy Life

نسل جدید دارو های کنترل فشار خون

پارس دارو

پیشرو و متمایز



parsdarou.ir



[pars_darou](https://www.instagram.com/pars_darou)



صدای مشتری: ۰۲۱-۷۴۳۷۳

entk_bartar 9+



92 Posts

11K Followers

59 Following

entk_bartar

کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
Health/Beauty
مرجع دارویی انتخاب برتر
مجله تخصصی دارویی و پوست و مو
See Translation

Edit Profile

Promotions

Insights

Contact



New



خدمات ویژه



سوختگی



صرع





LET THE BEAT GO ON

DELCOR[®] Tablet

Bisoprolol Fumarate

- Beta - 1 selective agonist.
- Used to treat hypertension and heart failure.



Scan Me:



VOC: 021 - 910 102 12
☎ 021 - 44 53 70 24
☎ 021 - 44 56 70 23
www.razakpharma.com
© razakpharma

Razak

Pharmaceutical Labs Co.

Refluzol[®]

Esomeprazole



- FDA approved for reflux disease in neonates under 1 month
- Effective control of GERD in infants
- First-line treatment in PUD patients
- No incident of tachyphylaxis in chronic use
- Suitable dosage form for use in children
- Convenient dose adjustment



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6




@tekajeco

www.tadbirkala.ir

Bisoprolol

Bisoprolol Fumarate



- Once daily dosing
- Selective affinity for Beta1 receptors
- Lowering the mortality rate in heart failure patients
- Higher efficacy in lowering mortality rates compared to Metoprolol
- Lowering the mortality rate in patients with decreased ejection fraction
- Higher efficacy in atrial fibrillation rhythm control compared to Carvedilol



Tadbir Kala Jam Co.

+9821 88668700-6



@tekajeco



www.tadbirkala.ir


کپسول سی لاکس پلاس®

ملین و مسهل گیاهی



C-Lax Plus[®]

Herbal Laxative-Purgative



Each Capsule contains

Cassia acutifolia & Cassia angustifolia
ext. & leaf 300mg

(Standardized by 20mg Anthracene
derivatives as sennoside B)



Help your child breath easier with:

SINKAST[®] (MONTELUKAST)

Selective Cysteinyl Leukotriene Type 1 (CysLT1) Receptor Antagonist

How to use?

For children 6 months to 5 years of age:

The recommended dose is one sachet of Sinkast 4 mg granules to be taken by mouth each evening.

Sprinkle or stir the granules into a small cup with 1 teaspoon (5 milliliters) of baby formula or breast milk (cool or at room temperature) or into a small cup with 1 spoonful of cold soft food (yogurt, rice, applesauce, carrots or ice cream).

- **Do not mix the granules with warm food or liquid.**
- **Children must take the granules within 15 minutes of opening the sachet. If the sachet has been open for more than 15 minutes, throw the contents away and use a new sachet.**
- **Do not keep granules or a granule/food mixture to give later.**

When to use?

- Sinkast is usually given once each day, this is usually in the evening
- Sinkast can be taken with or without food

Uses:

- Help to stop your child from having asthma attacks.
- Treat perennial allergic rhinitis or indoor allergies in children **as young as six months old** and seasonal allergic rhinitis or outdoor allergies in children **over age 2**.
- Control all of your child's allergy symptoms, including sneezing, stuffy nose, runny nose, and itchy nose.

Considerations:

- **Sinkast** is effective in treating both asthma and allergic rhinitis and can reduce total medication use among children with asthma and allergic rhinitis.
- The safety profile of **Sinkast** did not change with long-term use.
- **Sinkast** has the advantage of being able to be administered orally whereas intranasal steroids may not be practical for small children.
- Studies have shown that **Montelukast oral granules** does not affect the growth rate of pediatric patients.



Sinkast




14
Sachets

Montelukast (as Sodium) 4 mg

■ Help
■ Your
■ Child
■ Breathe

■ Comparable safety and efficacy profile to Singulair

Manufactured in Iran for the first time



PURSINA
بيورسينا



(021)-44981001-5


(021)-44986866



خنده ای از ته دل

قطره خوراکی پدی لاکت®

جهت رفع کولیک و رفلاکس در نوزادان





مهر دارو
مهر سلامتی

قرص مبندازول ۱۰۰



* درمان کرمک ، کرمهای شلاقی، نواری ، گرد و قلابدار

* درمان انتخابی آسکاریازیس، کاپیلاریازیس، انتروبیاز و تریکوریاز

* عوارض جانبی مختصر به دلیل جذب محدود در روده



موثرترین داروی
آرامبخش و ضد اضطراب



Chlordiazepoxide 5

www.mehrdarou.com



Xypident®

(Lidocaine/Epinephrine)



Hisulin®

(Human Insulin)

RECOMBINANT DNA ORIGIN

لقمان

شرکت دارویی و بهداشتی (سهامی عام)

حکمت سلامتی



تندیس سیمین دومین و سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

کسب نشان برتر نهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری سال ۱۴۰۱

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) با بیش از پنجاه سال سابقه درخشان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات دارویی در کشور می‌باشد. محصولات این شرکت شامل بیش از ۱۳۰ قلم در اشکال مختلف دارویی از قبیل قرص، کپسول، ویال، کارتریج، شربت، سوسپانسیون، ساشه، پماد و... در گروه‌های آنتی‌بیوتیک (ماکرولید، سفالوسپورین، پنی سیلین و پنمها) و نیز غیرآنتی‌بیوتیک می‌باشد.

**منتظر دیدار شما در هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) هستیم. ۱۸ الی ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
مصلی امام خمینی (ره)، سالن F، غرفه F/138**



www.loghmanpharma.com

Metformin 500


Diabetes care,
today more than ever



Mehr Darou
Pharmaceutical co.
Tehran - Iran



مهر دارو
مهر سلامتی



به وقت ویتامین C



بدون شکر

مناسب برای بیماران دیابتی



تلفن: ۰۲۱-۴۴۵۴۳۳۲۰-۵
www.mehrdarou.com

Pozzarex[®]

Help your patients live wholeheartedly with Pozzarex (Losartan Potassium)

Dosage Forms: Scored Film Coated Tablet, Oral, as potassium: 25mg, 50mg

Advantages:

- Reduces arterial blood pressure by 10-15%
- Provides additional arterial anti-atherosclerotic and anti-platelet benefits
- Prevent mortality
- Prevent nephropathies
- Normalizes albuminuria
- Superior to Atenolol in the primary prevention of adverse cardiovascular events

Dosage: Adults

Hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Patients with possible intravascular depletion or receiving diuretics (eg, on diuretic therapy):
25 mg PO qDay initially

Hypertension with Left Ventricular Hypertrophy

Indicated to reduce risk of stroke in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Nephropathy in Type 2 Diabetes

Indicated for diabetic nephropathy with an elevated serum creatinine and proteinuria (urinary albumin to creatinine ratio ≥ 300 mg/g) in patients with type 2 diabetes and a history of hypertension

- 50 mg PO qDay initially; may increase to up to 100 mg/day

Dosage Modifications

Renal impairment

Mild, moderate, or severe: No dosage adjustment necessary, except if the patient is volume depleted

Hepatic impairment

Mild-to-moderate: 25 mg PO qDay initially

Administration

Administer without regard to meals; however, administer consistently with respect to food intake at about the same time every day

Contraindications

- Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients
- 2nd and 3rd trimester of pregnancy
- Severe hepatic impairment
- The concomitant use of Losartan Potassium with aliskiren-containing products is contraindicated in patients with diabetes mellitus or renal impairment ($GFR < 60$ ml/min/1.73 m²)

Side effects

Dizziness, Upper respiratory tract infection, Angioedema, Hepatitis, Hyperkalemia, Hyponatremia, Thrombocytopenia, Vasculitis, Headache, Back pain, Diarrhea, Fatigue, Nasal congestion, Dry cough, Insomnia, Leg pain, Muscle cramps or pain, Sinus problems.

Pozzarex[®]

Experience Calmness, And Assurance, With Controlled **Blood Pressure**

Losartan Potassium / 25,50 mg

100 Scored F.C Tablets

25
mg

50
mg



PURSINA
پورسینا

(021)-44981001-5

(021)-44986866



سلامتی را با رایحه خوش تجربه کنید



- ضد عفونی کننده دهان
- تقویت کننده مینای دندان
- پیشگیری از پوسیدگی دندان
- ایجاد تازگی و طعم خوشایند در دهان
- تنوع در طعم و رایحه



مگافن®

مگافن® ۳۲۵

KMP
KISHMEDIPHARM
Caring your health
شرکت داروسازی کیش مدیفارم



• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم

مگافن®



با مگافن
دلیلی برای تحمل درد نیست

مگافن® ۵۰۰



• تسکین تب و دردهای خفیف تا متوسط

• ترکیبات:
استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

سوال اول:

بیمار مرد ۷۰ ساله ای است که به علت لتارژی به اورژانس بیمارستان آورده شده است. در تاریخچه بیماری نکته خاصی وجود ندارد. در معاینه بالینی نیز نکته خاصی مشخص نشد. در آزمایشات بیمار سدیم بیمار ۱۱۶ mEq/L گزارش شده است. همه موارد هایپوناترمی بیمار را توجیه میکند به جز:

- (الف) نارسایی غده فوق کلیه
- (ب) مصرف بی رویه دیورتیک
- (ج) دیابت بیمزه
- (د) سندرم ترشح نابجای هورمون ADH

سوال دوم:

پسر ۱۴ ساله ای متعاقب با اولین حمله تب روماتیسمی به دلیل کاردیت در بخش بستری است. در معاینه بیمار همه چیز به جز مورد زیر قابل انتظار است:

- (الف) سوفل نارسایی میترا
- (ب) سوفل تنگی میترا
- (ج) صدای سوم S3
- (د) فریکشن راب پریکارد

شرح مسابقه گزینه برتر و جوایز آن:

نمونه ارسالی جواب گزینه برتر ج، ۲. ب.
لطفا پاسخ های صحیح را به شماره ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ پیامک فرمایید.

(به دو نفر از برندگان محترم، شش ماه اشتراک رایگان مجله اختصاص داده خواهد شد)



دکتر فاطمه علوی لنگرودی




Keep Pace With
All Changes

Come along with

RozaVit

Food Supplement



Renal aid

Multivitamin & Zinc for *Kidney Patients*

Supplement Facts:			Serving size: 1 Tablet		
Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*	Nutritional Information	Av. Per Serving	%RDA*
Vitamin B1	1.5 mg	125	Biotin	300 µg	1000
Vitamin B2	1.7 mg	130.76	Nicotinamide	20 mg	125
Vitamin B6	10 mg	769.23	VitaminB5	10 mg	200
Vitamin B12	6 µg	250	Zinc	25 mg	227.27
Vitamin E,	50 mg	333.33	Folic acid	500 µg	125
Vitamin C	60 mg	66.66			

*RDA: Recommended Daily Allowance, mg: milligram, µg: micrograms





- صاحب امتیاز: کانون تبلیغاتی انتخاب برتر
- دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- شماره پروانه: ۲۰۵۸
- مدیر اجرایی: مهندس امیرحسین محمدی
- مدیر بازرگانی: فرحناز خدمتی
- مدیر مالی و اداری: هانیه حق بین
- طراح گرافیک: علیرضا دریغ

• همکاران مجله:

دکتر فریبا رضایی، دکتر ایرج خسرونیان، دکتر مهران زمانزاده، دکتر علی حاجی ملکی، دکتر علی حیدری، دکتر کامران صحت، دکتر کامران وهاب آقایی، دکتر محسن پرورش، دکتر سیدفاطمه علوی لنگرودی

ویژه نامه دارویی انتخاب برتر صرفاً جهت جامعه پزشکی ارسال می گردد. مسئولیت صحت آگهی ها بر عهده آگهی دهنده است. جهت جلوگیری از هر گونه خطای احتمالی اطلاعات ارائه شده را قبل از به کارگیری با رجوع به منابع و کتب پزشکی تایید نمایید. پزشکان محترم جهت دریافت ویژه نامه دارویی، نام - شماره نظام پزشکی و آدرس خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایند. پزشکان محترم، نظرات- پیشنهادات و انتقادات خود را به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۴۶۴۴ ارسال فرمایید. برای بهترین نظر- پیشنهاد و انتقاد جوایزی از سوی انتخاب برتر در نظر گرفته خواهد شد. پزشکان محترمی که علاقه مند به درج مطلب علمی در صفحه گردآوری با نام خود می باشند، می توانند با دفتر مجله تماس حاصل فرمایند.



Instagram
entk_bartar
ما را دنبال کنید

نشانی دفتر بازرگانی:

بلوار میرداماد،

خیابان شمس تبریزی جنوبی

کوچه رامین، پلاک ۱۶، واحد ۱

تلفن: ۰۹۳۳-۲۰۸۲۵۰۷-۲۶۴۰۳۹۹۴-۲۶۴۰۳۱۵۴



شرکت هایی که در این شماره با ما همکاری داشته اند

راموفارمین

www.ramopharmin.com

رازک

www.razakpharma.com

زهرای

www.zahravi.com

کوبل دارو

www.cobeldarou.com

کیش مدیفارم

www.kishmedipharm.com

لقمان

www.loghmanpharma.com

مرهم دارو

www.marhamdarou.com

مصون دارو

www.masoondarou.com

ابوریحان

www.aburaihan.com

آریا دارو

www.fa.aryadaru.com

اکتوور

www.actoverco.com

پورسینا

www.pursinapharma.com

پارس دارو

www.parsdarou.ir

تدبیر کالای جم

www.tadbirkala.ir

داروسازی عبیدی

www.abidipharma.com

روز دارو

www.rouzdarou.com

THE FINEST IN HEART

IT'S TIME FOR A MEDICATION THAT
WORKS IN MULTIPLE WAYS

امپاجنت

امپاگلیفلوزین / لیناگلیپتین

- ♡ موثر در درمان دیابت نوع ۲ با مهار علل متعدد ایجاد کننده بیماری
- ♡ پیشگیری قابل توجه از مرگ و میر قلبی و عروقی در بیماران دیابتی
- ♡ کاهش عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت
- ♡ پیشگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در بیماران دیابتی
- ♡ افزایش پذیرش درمان در بیماران
- ♡ مصرف یک بار در روز ، بدون ارتباط با زمان مصرف غذا

